



602771D

BARTH, J. \*

c







MUSKELLEHRE.



J o s e p h B a r t h ' s

weiland k. k. österreichischen Rathes, wirklichen Leibaugenarztes Sr. Majestät  
des Kaisers, emeritirten Professors der höhern Anatomie, Physiologie und der  
Augenkrankheiten etc.

# M U S K E L L E H R E

n a c h

den zwey Hauptverhältnissen, ihrer Lage und  
Verbindung untereinander, wie auch nach ihren  
allgemeinen und besondern Verrichtungen.

---

Z w e y t e A u f l a g e .

Mit 53 nach der Natur auf das genaueste entworfenen Kupfertafeln.

---

W i e n 1 8 1 9 ,

bey Mich. Lechner, Universitäts-Buchhändler.

1891

THE JOURNAL OF THE

ROYAL SOCIETY OF MEDICINE

312460



1891

1891



## A n d e n L e s e r.

**D**er fehnige Theil eines Muskels ist, durch feinere, und lichter gehaltene Scafrung von dem fleischigen unterschieden.

Die punktirten Linien in den Umrisszeichnungen bedeuten theils die Gränzen der fleischigen und fehnigen Muskeltheile, theils die Anfänge oder Ende der Muskel, oft auch Schnitte und andere Abbildungen, welche aus der Vergleichung der Umrisszeichnungen mit den Schattirten leicht zu errathen sind.

Oft sind die Knochen, welche gewisse Muskeltheile bedecken, weggeschnitten vorgestellt, und dieser Schnitt ist durch eine scharfe Linie angezeigt, wie in Tab. II. Fig. V. Tab. III. Fig. II. Tab. XVI. Fig. I. II. Tab. XVII. Fig. IV. IX. X. Tab. XXIII. Fig. I. Tab. XXV. Fig. I. Tab. XXIX. Fig. IV.

Oft verstecket in Muskel einige seiner Ursprünge oder Ende; und dann sind sie, von dem übrigen Theile des Muskels abgeschnitten, in einer Nebenfigur gezeichnet, wie in Tab. IX. Fig. II. Tab. XIX. Fig. VII. X. Tab. XX. Fig. IV. VII. Tab. XXIV. Fig. III.

Die Bestimmungen: *vormwärts*, *rückwärts*, *seitwärts*, *oberwärts*, *unterwärts*, welche man jedesmal vor der Benennung des Muskels findet, beziehen sich auf die Seite, von welcher der Muskel in der Figur erscheint. Bey den Muskeln der obern Gliedmassen gilt nur diese Anmerkung von der Stellung derselben in den Syntaxfiguren, nicht aber, von derjenigen in welcher man sie sich, bey Beschreibung des Muskels, denkt, nämlich die flachen Hände gegen die Schenkel gekehret.

Die äusseren oder inneren Zwischenknochenmuskel der Hand an den vordern Rändern der Finger werden in den Syntaxfiguren *interossei priores*, und die an den hintern Rändern *interossei posteriores* genannt; so wie die Zwischenknochenmuskel des Fusses an den inneren Rändern der Zehen *interossei primi*, und die an den äusseren Rändern *interossei secundi* heißen.

In den Syntaxfiguren bezieht sich oft der Name eines Muskels nur auf einen Theil desselben.

In der Beschreibung ist die Rede immer von den Muskeln einer Seite; und deswegen sind die ungepaarten Muskel besonders angemerkt.

Von

#### IV.

---

Von dem Ursprunge, oder Ende manches Muskels sind im Texte oft drey, oder vier verschiedene Theile angegeben; da hingegen die Citation, weil mancher Theil von dem Muskel selbst bedeckt wird, nur auf zwey, oder drey deutet, wie z. B. Tab. II. Fig. VII. (9 --- 11).

Die mit der Feder gemachten schiefen Striche im Texte zeigen Fehler an, die folgendermassen zu verbessern sind:

Tab. XI. Zeile 14. statt Ringfingers, lis: Ringfingers.

Tab. XVI. — 12. lis: (f). und in eine &c.

Tab. XVIII. — 38. statt (i) lis: (1)

— — — 49. statt *Trachelmastoideus*, lis: *Trachelomastoideus*.

Tab. XXIX. — 32. lis: wirkt, wie der Zwillingsmuskel.

Tab. XXXI. — 40. statt langen Ausstreckers, lis: langen Biegers.

— — — 42. statt Fig. VI.. lis: Fig. V.

Tab. XXXII. nach Zeile 27. lis: Er strecket den Fuss aus, und wendet den Plattfuss rück- und einwärts.

---



## VON DEN MUSKELN UEBERHAUPT.

Die Muskellehre, lateinisch *Myologia*, (von dem griechischen *μῦς*, Muskel, und *λογος*, Rede) ist der Theil der Zergliederungskunst, in welchem von den Muskeln des menschlichen Körpers gehandelt wird.

Muskel, oder Mäuslein (*Musculi*), heisst man, im ausgedehnten Verstande, alle Theile unsers Körpers, durch deren Wirkung andere Körpertheile unmittelbar bewegt werden. Im engen Verstande werden aber nur die Theile mit dem Namen Muskel belegt, deren Wirkung, um andere Theile zu bewegen, entweder auf immer, oder doch auf eine gewisse Zeit von unserem Willen abhängt, und, diesem zu Folge, erweckt, vermehrt, vermindert, oder auch gänzlich unterlassen werden kann; und nur diese willkührliche Muskel werden in der Muskellehre beschrieben.

Es findet zwischen den Muskeln, in Rücksicht ihrer Gestalt, ihres Baues, der Lage der sie zusammensetzenden Theile, der Bewegungen die sie hervorbringen, und ihres Laufes, ein mannigfaltiger Unterschied statt.

In Rücksicht der Gestalt sind die Muskel breit, schmal, rund, sägeförmig, ringförmig, dreyeckicht, viereckicht, rautenförmig u. s. w. Und in eben dieser Rücksicht pflegt man sie in den Kopf (*Caput*), in den Bauch (*Venter*), und in den Schwanz (*Cauda*) abzutheilen. Die Ursache dieser Abtheilung war die Aehnlichkeit mit einer enthäuteten Maus, welche die Zergliederer älterer Zeiten an einigen Muskeln fanden. Da sich aber diese Abtheilung nicht auf alle Muskel unsers Körpers anwenden läßt, indem sehr viele nicht die geringste Aehnlichkeit mit einer enthäuteten Maus haben; so unterscheidet man an jedem Muskel überhaupt, die ringförmigen ausgenommen, nur drey Theile, einen mittleren, und zwey Endtheile. Den mittleren Theil nennt man den Körper (*Corpus*); den einen Endtheil, welcher an einen Körpertheil angewachsen ist, der entweder niemals, oder doch sehr selten in gewöhnlichen Fällen, durch die Wirkung dieses Muskels bewegt wird, bezeichnet man mit dem Namen Ursprung (*Origo*): der andere Endtheil hingegen, welcher an einem Körpertheil fest sitzt, den wir am gewöhnlichsten durch diesen Muskel bewegen, wird das Ende (*Finis*) genannt.

Wenn ein Muskel zwey, oder drey Ursprünge an verschiedenen Orten hat, die, nachdem sie eine beträchtliche Länge von einander abgesondert waren, sich endlich mit einander vereinigen; so nennt man ihn, nach der Zahl seiner Ursprünge, zweyköpfig (*biceps*) a), oder dreyköpfig (*triceps*) b).

In

a) Tab. IV. Fig. 1.

b) Tab. IV. Fig. III, IV. V.



## VI.

In Rücksicht der Bauart, bestehet ein Muskel entweder nur allein aus fleischigen Theilen, oder aus fleischigen und sehnigen Theilen zugleich.

Der fleischige Theil, oder das Fleisch des Muskels (*Caro musculi*), macht gemeiniglich den Körper des Muskels aus, und es besitzt, nach Verschiedenheit des Leichnames, und selbst nach Verschiedenheit der Muskel in einem und demselben Leichname, eine bald mehr, bald minder, gesättigte rothe Farbe.

Der fleischige Theil ist aus mehrern oder wenigern, aus größern oder kleinern, weichen Bündeln zusammengesetzt, je nachdem der Muskel größer, oder kleiner ist.

Diese Bündel, welche man Fleischbündel (*Fasciculi*, s. *Lacerti musculares*) nennt, lassen sich, bey genauerer Untersuchung, in viele Fasern zertheilen, die man Fleischfasern, Muskelfasern (*Fibræ carneæ*, *Fibræ musculares*) benennt. Die Fleischfasern, welche die Fleischbündel ausmachen, sind eben so, wie die Fleischbündel selbst, durch ein fadiges Gewebe mit einander verbunden.

Der sehnige Theil (*Tendo*, von *tendere* spannen) macht gemeiniglich einen oder beyde Endtheile eines Muskels aus. Er unterscheidet sich von dem fleischigen Theil, durch seinen Glanz, durch seine weißlichte Farbe, und durch seine beträchtliche Festigkeit. Er bestehet, wie der fleischige, aus Bündeln, welche ebenfalls aus Fasern zusammengesetzt sind. Die sehnigen Bündel (*Fasciculi tendinei*) und die sehnigen Fasern (*Fibræ tendineæ*) sind aber viel härter, und hängen viel fester, durch ein sehr kurzes fadiges Gewebe, an einander, als die Fleischbündel.

Wenn der sehnige Theil eines Muskels schmal und rundlicht, oder etwas flach, und einer Schnur, oder einem Bande, ähnlich ist; so nennt man ihn eine Flechse, Sehne, oder Spannader (*Tendo*): breitet er sich hingegen in eine beträchtliche Oberfläche aus, und stellet mehr eine sehnige Haut, als eine Schnur, vor; so heisset er sehnige Ausbreitung (*Aponeurosis*).

In Rücksicht der verschiedenen Lage des fleischigen, und des sehnigen Theiles, und der Verbindung, die diese Theile unter sich haben, erhalten die Muskel verschiedene Benennungen.

Wenn die Bündel eines Muskels, der Länge nach, parallel laufen; so nennt man ihn einen geradlinigten Muskel (*Rectilineus*) c): laufen die Bündel eines Muskels in verschiedener Richtung; so heisset er ein zusammengesetzter Muskel (*Musculus compositus*) d): breiten sie sich aber in ihrem Laufe

strah-

c) Tab. I. Fig. III. IV.

d) Tab. II. Fig. II. III.



strahlenförmig aus; so wird er strahlig (*Musculus radiatus*) e) genannt. Unter einem gefiederten Muskel (*pennatus*) f) versteht man denjenigen, dessen Sehne die Fleischfasern eben so aufnimmt, wie der Kiel einer Schreibfeder den Bart: Erstreckt sich aber die Sehne an der Seite eines Muskels, entweder durch seine ganze Länge, oder doch durch den größten Theil derselben, und nimmt sie nur die Fleischfasern von einer Seite auf die vorhergehende Art auf, so nennt man diesen Muskel einen halbgefiederten (*Musculus semipennatus*) g). Wenn sich der fleischige Theil eines Muskels in eine Sehne endet, aus welcher wieder ein zweyter fleischiger Theil entsteht; so erhält dieser Muskel den Namen eines zweybäuchigen (*Biventer* s. *Digastricus*) h). Die Muskel hingegen, in welchen die Fleischbündel durch kurze sehnige Fasern in ihrem Laufe unterbrochen, und gleichsam in Absätze zerschnitten werden, heißen durchschnittene, oder gestreifte oder beschriebene Muskel (*Intersecti*, *Inscripti*) i) diese Sehnen aber sehnige Inschriften oder Streifen (*Inscriptiones*, *Intersectiones tendineæ*) k).

Die Muskel erhalten auch, nach Verschiedenheit der Bewegungen, die, durch ihre Wirkung, in unsern Körpertheilen hervorgebracht werden, verschiedene Benennungen. Sie werden, nachdem sie einen oder den andern Theil bewegen, Aufheber (*Levatores*), Abzieher (*Abductores*), Zuzieher (*Adductores*), Ausstreckter (*Extensores*), Bieger (*Flexores*), Schließmuskel (*Sphincteres*) u. s. w. genannt.

Endlich werden die Muskel auch, nach Verschiedenheit ihres Laufes, mit dem Beynamen gerade (*recti*), schiefe (*obliqui*), queere (*transversi*), umschlungene (*circumflexi*), aufsteigende (*ascendentes*), absteigende (*descendentes*), u. s. f. belegt.

Die Wirkung der Muskel bestehet, in der Zusammenziehung, und Verkürzung ihres fleischigen Theiles, der in diesem Zeitpunkt anschwillt, und härter wird. Durch diese Zusammenziehung und Verkürzung der Muskel, werden die Theile unsers Körpers entweder bewegt, oder in einer gewissen Stellung erhalten.

Wenn zwey auf einen und denselben Körpertheil wirkende Muskel so gelagert sind, daß einer eine Bewegung hervorbringt, die der Bewegung des andern gerade entgegengesetzt ist; so wird ein jeder von diesen beyden, beziehungsweise auf den andern, ein gegenwirkender Muskel (*Musculus*

antag-

e) Tab. II. Fig. IV. V.

f) Tab. VIII. Fig. V.

g) Tab. IX. Fig. V.

h) Tab. XVII. Fig. VII. VIII.

i) Tab. XVI. Fig. IV.

k) Tab. XVI. Fig. IV. d.



*antagonista*) genannt. Wenn hingegen mehrere Muskel einen Theil unsers Körpers auf eine und dieselbe Art bewegen; so erhalten sie den Namen gleichwirkende Muskel (*Musculi congeneres*).

Die Muskel bringen durch ihre Wirkung, nach Verschiedenheit ihrer Gestalt, ihres Laufes, der Art und des Grades ihrer Zusammenziehung, und ihrer Verbindung mit den benachbarten Theilen, verschiedene Bewegungen hervor.

Kreisförmige Muskel ziehen sich in ihrem ganzen Umfange zusammen, und verengern oder schliessen hiedurch die Oefnungen, um welche sie liegen. Muskel, die, in gerader Richtung, zu einem Körpertheil laufen, ziehen den beweglicheren von den zwey Theilen, an die sie angewachsen sind, gerade gegen den mehr widerstehenden. Beschreibt ein Muskel aber durch seinen Lauf eine krumme Linie; so bemüht er sich durch seine Zusammenziehung gerade zu werden, woraus, nach Verschiedenheit der Theile, über welchen, oder unter welchen er die krumme Linie beschreibt, verschiedene Bewegungen erfolgen. Befinden sich über oder unter einem krummlaufenden Muskel weiche, oder nachgiebige Körpertheile; so werden diese, durch die Wirkung des Muskels, gegen die Grundlinie seiner Krümmung bewegt. Lauft aber ein Muskel über harte, und widerstehende Theile, in krummer Richtung; so wird der Theil, der durch die Wirkung dieses Muskels bewegt wird, gegen den Punkt gezogen, um welchen sich der Muskel in seinem Laufe, wie um eine Rolle, krümmt.

Nach Verschiedenheit der Zusammenziehungsart, erfolgt ebenfalls eine verschiedene Bewegung. Ein Muskel kann sich in allen seinen Theilen zugleich zusammenziehen; oder die Zusammenziehung kann auch nur in einzelnen Bündeln allein geschehen. Im ersten Falle wird der beweglichere gegen den mehrwiderstehenden gerade gezogen; im zweyten Falle aber ist jeder allein wirkende Theil des Muskels, als ein besonderer Muskel, anzusehen; und die Bewegung die seine Wirkung hervorbringt, geschieht nur nach der Richtung des sich zusammenziehenden Muskeltheiles, und nicht, wie im ersten Falle, nach der Richtung des ganzen Muskels.

Nach Verschiedenheit des Grades, kann sich ein Muskel bald schwächer bald stärker, zusammenziehen. Im ersteren Falle bewegt er nur die nachgiebigeren, im zweyten aber auch die mehr widerstehenden Theile.

Endlich verursachen auch die Muskel, nach Verschiedenheit ihrer Befestigung und Verbindung an den benachbarten Theilen, eine Verschiedenheit in der Bewegung. Wenn beyde Endtheile eines Muskels an unbewegliche Theile des Körpers angewachsen sind; so wirkt der Muskel auf die nachgiebigen benachbarten Theile, mit welchem er in  
seinem



seinem Laufe verbunden ist. Ist ein End' an einen unbeweglichen, das andere an einen beweglichen, Theil angeheftet; so wird der letztere gegen den ersteren gezogen; und aus dieser Ursache wird auch das Ende des Muskels, welches an einen unbeweglichen Theil angewachsen ist, der feste Punkt (*Punctum fixum*); das andere Ende aber, welches an dem beweglichen Theile festitzt; der bewegliche Punkt (*Punctum mobile*) genannt. Sind beyde Ende an bewegliche Theile befestigt; so werden, durch die Wirkung des Muskels, beyde Theile gegeneinander bewegt: wird aber einer von diesen beyden beweglichen Theilen; während der Wirkung des Muskels, durch andere Kräfte festgehalten, und folglich zum festen Punkt gemacht; so wird der andere bewegliche Theil gegen diesen gezogen: und da von beyden beweglichen Theilen bald der eine, bald der andere, in verschiedenen Fällen; kann festgehalten werden; so kann auch, wechselweise, bald das eine, bald das andere Ende des Muskels der feste, oder der bewegliche Punkt seyn.

Um die Bewegungen zu erleichtern, welche die Muskel durch ihre Wirkung hervorbringen, befinden sich bey den Sehnen, die sich um einen harten Körper krümmen, häutige Säckchen; die sich sowohl an den harten Körper, als auch an die Sehne, soweit sich diese Theile berühren, genau anschließen. Diese Säckchen, die man Schleimbeutel (*Bursæ mucosæ*) nennt, enthalten eine schlüpfrigmachende Feuchtigkeit; durch deren Gegenwart die Anreibung der Sehne an die harten Körper gehindert, und folglich die Bewegung erleichtert wird.

Es finden sich auch Sehnen; die da, wo sie sich um einen harten Körper winden, knorpelartig, ja manchmal beinicht sind.

Die Muskel sind alle in einer Haut enthalten, die man die eigene Haut der Muskel (*Membrana propria musculorum*) nennt. Diese Haut, die ein zusammengedrängtes Zellengewebe ist, enthält alle Muskel gemeinschaftlich; dann aber gibt sie, in ihrer innern Oberfläche, viele Verlängerungen von sich, die sich zwischen die Muskel einsenken; sie sowohl unter sich, als auch mit den benachbarten Theilen verbinden, und jeden Muskel insbesondere umkleiden. Von diesen setzt sich ein fadiges Gewebe zwischen alle Bündel und Fasern der Muskel fort, und verbindet sie miteinander. Wo aber diese Verlängerungen die Sehnen ganz locker umgeben, und um die Bewegung zu erleichtern, eine schlüpfrigmachende Feuchtigkeit absondern; werden sie Sehnencheiden (*Vaginæ tendinum*) genannt.

In Gegenden; wo die Muskel bey ihrer Wirkung leicht aus ihrer Lage weichen könnten, wird ihre eigene Haut, durch besondere sehnige Fasern, oder durch sehnige Ausbreitungen anderer Muskel, verstärkt. Eine auf diese Art verstärkte Muskelhaut nennt man dann eine sehnige Muskelscheide (*Vagina tendinea musculorum*); und diese sehnigen Scheiden finden sich vorzüglich in den Gliedmassen.

Wo aber dergleichen Scheiden nicht vermögend wären, die Sehnen bey verschiedenen Bewegungen in ihrer Lage fest zu halten, da sind eigene Bänder vorhanden, die man, weil ihr Daseyn blos auf die Muskel Bezug hat, Muskelbänder (*Ligamenta musculorum*) nennet.

Endlich sind auch noch in manchen Gegenden des Körpers fehnigbänderige Ausbreitungen ausgespannt, theils um die unter ihnen liegenden Muskel gegen einen Druck von aussen her zu beschützen, theils, um gewisse Theile des Körpers zu verschiedenen Verrichtungen geschickter zu machen.





## VON DEN MUSKELN INS BESONDERE

Bey einem jeden Muskel hat man nach seiner Benennung, seine Gestalt, Lage, Fügung mit den benachbarten Muskeln, seinen Ursprung, Ende, und endlich seine Wirkung zu bemerken,

Die Figuren der einzelnen Muskel werden uns ihre Gestalt; die Syntaxtabellen aber ihre Lage und Fügung mit den benachbarten Muskeln, andeuten: das übrige findet man bey der Beschreibung der einzelnen Muskel.

---



*S Y N T A X I S*

O D E R

FÜGUNG DER MUSKEL

U N T E R S I C H.

2 1 7 8 7 4 1 2

1872

FÜHRUNG DER MUSIK

VERLAG









*K. Donheimer sc. Viennæ.*



## In Capite.

A. Quorarius. B. Orbicularis palpebrarum. C. Compressor narium. D. Levator labii superioris, alaeque nasi. E. Levator labii superioris. F. Zygomaticus minor. G. Levator anguli oris. H. Zygomaticus major. I. Nasalis labii superioris. K. Orbicularis oris. L. Depressor labii inferioris. M. Levatores menti. N. Depressor anguli oris. O. Buccinator. P. Masseter. Q. Anterior auriculae. R. Attollens auriculam. S. Major helix. T. Traqueus. U. Minor helix. V. Antitragicus. W. Riventer maxillae.

## In Collo.

A. Sternomastoideus cum Cleidomastoideo. B. Cucullaris. C. Latissimus colli. D. Sternohyoideus. E. Aspera arteria. F. Sternothyreoideus. G. Coracohyoideus. H. Levator scapulae. I. Scalenus medius.

## In artu superiore.

A. Suprascapularis. B. Coracobrachialis. C. Biceps brachii. D. Triceps brachii. E. Brachialis internus. F. Radialis externus longior. G. Radialis externus brevior. H. Supinator brevis. I. Profundus. K. Ulnaris internus. L. Sublimis. M. Flexor longus pollicis manus. N. Pronator quadratus. O. Abductor longus pollicis manus. P. Extensor minor pollicis manus. Q. Opponens pollicis. R. Flexor brevis pollicis manus. S. Adductor pollicis manus. T. Interosseus prior indicis. U. Abductor indicis. V. Interosseus posterior indicis. W. Flexor parvus digiti minimi manus. X. Abductor digiti minimi manus. Y. Adductor ossis metacarpi digiti minimi manus. A. Interosseus prior. b. Interosseus posterior digiti medii. C. Interosseus prior. d. Interosseus posterior digiti annularis. e. Interosseus digiti minimi manus. 1. 2. 3. 4. Lumbricales. \* Pro-nator teres et Supinator longus truncati.

## In artu inferiore.

A. Gluteus medius. B. Gluteus minor. C. Piriacus internus. D. Psoas magnus. E. Pectineus. F. Adductor longus femoris. G. Gracilis. H. Adductor magnus femoris. I. Vastus internus. K. Cruralis. L. Vastus externus. M. Biceps cruris. N. Popliteus. O. Soleus. P. Peroneus longus. Q. Peroneus brevis. R. Extensor longus digitorum pedis. S. Tibialis posticus. T. Extensor proprius pollicis pedis. U. Flexor longus digitorum pedis. V. Flexor brevis digitorum pedis. W. Peroneus tertius. X. Plantaris. Y. Extensor brevis digitorum pedis. Z. Interosseus primus digiti primi minoris. \* Rectus cruris truncatus.

## In Trunco.

A\*. Pectoralis. B. Latissimus dorsi. C. Serratus magnus. D. Obliquus externus abdominis. E. Cremaster. F. Subclavius. G. Serratus anticus. H. Subscapularis. I. Teres major. K. Pyramidalis. L. Intercostales externi. M. Intercostales interni. N. Obliquus internus abdominis. O. Rectus abdominis.

## In artu superiore.

A. Deltoideus. B. Coracobrachialis. C. Triceps brachii. D. Biceps brachii. E. Epus Aponeurosis. F. Brachialis internus. G. Supinator brevis. H. Supinator longus. I. Pronator teres. K. Radialis internus. L. Palmaris longus. M. Sublimis. N. Ulnaris internus. O. Flexor longus pollicis manus. P. Pronator quadratus. Q. Abductor longus pollicis manus. R. Extensor minor pollicis manus. S. Palmaris brevis. T. Opponens pollicis. U. Abductor brevis pollicis manus. V. Flexor brevis pollicis manus. W. Abductor pollicis. X. Abductor indicis. Y. Flexor parvus digiti minimi. Z. Lumbricales et interossei. a. Pro fundus.

## In artu inferiore.

A. Gluteus magnus. B. Gracilis. C. Adductor magnus. D. Adductor longus femoris. E. Pectineus. F. Psoas magnus. G. Piriacus internus. H. Sartorius. I. Gluteus medius. K. Tensor vaginae femoris. L. Vastus externus. M. Rectus cruris. N. Vastus internus. O. Biceps cruris. P. Semitendinosus. Q. Gemellus. R. Soleus. S. Flexor longus digitorum pedis. T. Peroneus longus. U. Peroneus brevis. V. Extensor longus digitorum pedis. W. Peroneus tertius. X. Tibialis anticus. Y. Abductor pollicis pedis. Z. Flexor brevis pollicis pedis. a. Flexor brevis digitorum pedis. b. Extensor brevis digitorum pedis. c. Flexor longus pollicis pedis. d. Plantaris. e. Tibialis posticus. f. Extensor proprius pollicis pedis. g. Interosseus primus digiti primi minoris.













# SYNTAXIS. TAB. II.

## In Capite.

A. Corrugatores superciliarum. B. Levatores palpebrarum. C. Ciliares. D. Temporalis. E. Masseter. F. Buccinator. G. Pterygideus externus. H. Levatores angulorum oris. I. Depressor alae nasi. K. Nasales labii superioris. L. Orbicularis oris. M. Depressores labii inferioris. N. Levatores menti. O. Trachelomastoideus. P. Dententer. maxillae inferioris.

## In Trunco.

A. Intercostales externi. B. Intercostales interni. C. Transversus abdominis. D. Obliqui interni lamina postica. E. Peritoneum. F. Diaphragma. G. Quadratus lumborum. H. Psoas parvus. I. Psoas magnus. K. Gliaei interni. L. Obturatores externi. M. Erector penis. N. Accelerator. O. Transversus perineci. P. Sphincter externus ani. Q. Penis truncatus. R. Gluteus minor.

## In artu superiore.

A. Subscapularis. B. Supinator brevis. C. Pronator quadratus. D. Flexor brevis pollicis manus. E. Adductor pollicis manus. F. Interosseus prior et G. Interosseus posterior indicis. H. Interosseus prior et I. Interosseus posterior digiti medii. K. Interosseus prior et L. Interosseus posterior digiti annularis. M. Interosseus digiti auricularis.

## In Collo.

A. Mylohyoideus. B. Dasioiglossus. C. Ceratoglossus. D. Cricothyreoideus. E. Sternothyreoideus. F. Hyothyreoideus. G. Commune extremi Stylopharyngei. Palatopharyngei et Salpingopharyngei. H. Constrictor inferior pharyngis. I. Pectus internus major capitis. K. Longi colli. L. Intertransversarii colli priores. M. Levatores costarum primarium. N. Scalenus prior. O. Scalenus medius. P. Pleura. Q. Intertransversarius colli prior quintus.

## In artu superiore.

A. Subscapularis. B. Teres major. C. Biceps brachii. D. Coracobrachialis. E. Brachialis externus. F. Brachialis internus. G. Radialis externus longior. H. Radialis externus brevior. I. Supinator brevis. K. Pronator teres rescissus. L. Pronator quadratus. M. Flexor longus pollicis manus. N. Profundus. O. Adductor ossis metacarpi digiti minimi. P. Flexor brevis pollicis manus. Q. Adductor pollicis manus. R. Lumbricalis primus. S. Lumbricalis secundus. T. Lumbricalis tertius. U. Lumbricalis quartus. V. Interosseus posterior digiti annularis. W. Interosseus prior digiti annularis. X. Interosseus posterior digiti medii. Y. Interosseus prior digiti medii. Z. Interosseus posterior indicis. A. Interosseus prior indicis.

## In artu inferiore.

A. Adductor magnus femoris. B. Tibialis posticus. C. Peroneus brevis. D. Interosseus primus digiti secundi. E. Interosseus secundus. F. Interosseus secundus digiti tertii. G. Interosseus secundus digiti quarti.

## In artu inferiore.

A. Adductor brevis femoris. B. Adductor magnus femoris. C. Semimembranosus. D. Gracilis. E. Biceps cruris. F. Peroneus longus. G. Peroneus brevis. H. Tibialis posticus. I. Flexor longus pollicis pedis. K. Flexor longus digitorum pedis. L. Flexor brevis pollicis pedis. M. Extensor brevis digitorum pedis. N. Interosseus primus digiti parvi pedis. O. Extensor digitorum pedis longus abscissus.













# SYNTAXIS. TAB. III.

## In Capite.

A. Epicraniius. B. Attollens auriculam. C. Helicis major. D. Orbicularis palpebrarum. E. Anterior auricula. F. Helicis minor. G. Tres retrahentes auriculam. H. Masseter. I. Zygomaticus major. K. Pterygoideus internus. L. Mylohyoideus.

## In artu superiore.

A\*. Deltoideus. B. Triceps brachii. C. Brachialis internus. D. Supinator longus. E. Radialis externus longior. F. Brachialis externus. G. Anconeus. H. Radialis externus brevior. I. Profundus. K. Palmaris longus. L. Sublimis. M. Ulnaris internus. N. Ulnaris externus. O. Extensor proprius digiti auriculare. P. Extensor communis digitorum manus. Q. Abductor digiti auricularis. R. Interosseus posterior digiti annularis. S. Interosseus posterior digiti medii. T. Interosseus prior digiti medii. U. Interosseus prior indicis. V. Abductor indicis. W. Abductor longus pollicis manus. X. Extensor minor pollicis manus. Y. Adductor pollicis manus. Z. Extensor major pollicis manus. A. Indicator. b. Interossei et lumbricales.

## In Collo.

M. Latissimus colli. N. Sternomastoideus cum Cleidomastoideo. O. Cucullaris. P. Biventer cervicis. Q. Splenius capitis. R. Splenius colli. S. Trachelomastoideus. T. Levator scapulae. U. Transversalis cervicis.

## In Trunca.

A. Infraspinatus. B. Rhomboidei majores. C. Sacrolumbales. D. Teres minor. E. Teres major. F. Latissimus dorsi. G. Obliquus externus abdominis. H. Serratus posticus superior. I. Rhomboideus minor. K. Spinalis dorsi. L. Longissimus dorsi. M. Intercostales externi. N. Intercostales interni undecimus. O. Serratus magnus. P. Serratus posticus inferior. Q. Obliquus internus abdominis. R. Multifidus spinæ. S. Semispinalis dorsi.

## In artu superiore.

A. Supraspinatus. B. Teres minor. C. Infraspinatus. D. Teres major. E. Triceps brachii. F. Biceps brachii. G. Brachialis internus. H. Radialis externus longior. I. Radialis externus brevior. K. Anconeus. L. Supinator brevis. M. Abductor longus pollicis manus. N. Extensor minor pollicis manus. O. Extensor major pollicis manus. P. Indicator. Q. Profundus. R. Ulnaris internus. S. Sublimis. T. Abductor digiti minimi manus. U. Interosseus posterior digiti annularis. V. Interosseus posterior digiti medii. W. Interosseus prior digiti medii. X. Abductor indicis. Y. Adductor pollicis manus. Z. Extensor communis digitorum manus. A. Interossei et lumbricales. b. Interossei et lumbricales.

## In Coxa


### et artu inferiore.

A. Gluteus medius. B. Tensor vaginæ femoris. C. Gluteus magnus. D. Levator ani. E. Sphincter ani externus. F. Abductor magnus femoris. G. Gracilis. H. Sartorius. I. Vastus internus. K. Semimembranosus. L. Semitendinosus. M. Biceps cruris. N. Vastus externus. O. Plantaris. P. Popliteus. Q. Peroneus longus. R. Gemellus. S. Soleus. T. Flexor longus pollicis pedis. U. Peroneus brevis. V. Extensor brevis digitorum pedis. W. Abductor digiti minimi pedis. X. Flexor brevis digiti minimi pedis. Y. Flexor brevis digitorum pedis. Z. Tibialis posticus. A. Peroneus tertius. b. Extensor longus digitorum pedis.

## In Coxa

### et artu inferiore.


A. Coccygeus. B. Levator ani. C. Sphincter internus ani. D. Transversus alter perinei. E. Transversus perinei. F. Gluteus medius. G. Psoas magnus. H. Pyramiformis. I. Geminus superior. K. Geminus inferior. L. Obturator externus. M. Obturator internus. N. Quadratus femoris. O. Vastus externus. P. Abductor magnus femoris. Q. Biceps cruris. R. Semitendinosus. S. Gracilis. T. Vastus internus. U. Semimembranosus. V. Popliteus. W. Plantaris. X. Soleus. Y. Flexor longus pollicis pedis. Z. Peroneus brevis. A. Peroneus longus. b. Extensor brevis digitorum pedis. C. Flexor brevis digitorum pedis. D. Flexor brevis digiti minimi pedis. E. Tibialis posticus. F. Flexor longus digitorum pedis. G. Extensor longus digitorum pedis. H. Peroneus tertius. I. Gemellus.














In artu superiore.

A. Subscapularis. B. Teres major. C. Coracobrachialis. D. Brachialis externus. E. Brachialis internus. F. Radialis externus longior. G. Radialis externus brevior. H. Supinator brevis. I. Flexor longus pollicis manus. K. Pronator quadratus. L. Profundus. M. Adductor ossis metacarpi quarti. N. Extensor digitorum manus. O. Interosseus auricularis. P. Interosseus posterior et Q. Interosseus prior annularis. R. Interosseus posterior et S. Interosseus prior digiti medii. T. Interosseus posterior et U. Interosseus prior indicis. V. Flexor brevis pollicis manus. W. Adductor pollicis manus.



In Capite Collo et Trunco.

A. Temporalis. B. Masseter. C. Biventer maxillae. D. Mylohygoides. E. Pterigoides internus. F. Biventer cervicis. G. Splenius capitis. H. Levator scapulae. I. Interspinales cervicis. K. Complexus. L. Obliquus superior capitis. M. Obliquus inferior capitis. N. Trachelomastoidei. O. Transversales cervicis. P. Cervicalis descendens. Q. Scalenus medius. R. Scalenus posticus. S. Spinalis cervicis. T. Serratus posticus superior. U. Splenius colli. V. Levatores costarum. W. Intercostales externi. X. Intercostales interni undecimi. Y. Transversi abdominis. Z. Sacrolumbales et Longissimi dorsi. a. Semispinales dorsi. b. Semispinales dorsi. c. Multifidi spinae. e. Psoe magni. f. Gluteus minor. g. Obturatoris coxae. h. Obturator internus. i. Filarii interni. k. Interspinales dorsi. l. Interspinales lumborum.

In artu superiore.

A. Supscapularis. B. Supinator brevis. C. Pronator quadratus. D. Flexor brevis pollicis manus. E. Adductor pollicis manus.

In artu inferiore.

A. Semimembranosus. B. Gracilis. C. Adductor magnus femoris. D. Biceps cruris. E. Gemellus recisus. F. Plantaris recisus. G. Popliteus. H. Tibialis posticus. I. Flexor longus digitorum pedis. K. Peroneus longus. L. Flexor longus pollicis pedis. M. Peroneus brevis. N. Extensor brevis digitorum pedis. O. Interosseus digiti minimi. P. Flexor brevis pollicis pedis.


In artu inferiore.

A. Adductor magnus femoris. B. Tibialis posticus. C. Peroneus brevis. D. Interossei secundi digitorum pedis.
















A. Abductor digiti minimi. B. Abductor pollicis. C. Flexor brevis digiti minimi. D. Interosseus secundus digiti tertii. E. Interosseus digiti minimi. F. Flexor brevis digiti minimi. G. Lumbricales. H. Transversalis pedis. I. Interosseus secundus digiti secundi. K. Interosseus secundus digiti primi. L. Flexor longus digitorum. M. Flexor longus pollicis. N. Adductor pollicis. O. Flexor brevis pollicis.



A. Peroneus brevis. B. Peroneus longus. C. Tibialis posticus. D. Flexor brevis digiti minimi. E. Interosseus digiti minimi. F. Interosseus secundus digiti tertii. G. Interosseus primus. H. Interosseus secundus digiti secundi. I. Interosseus primus. K. Interosseus secundus digiti primi. L. Interosseus primus. M. Transversalis pedis. N. Adductor pollicis. O. Flexor brevis pollicis. P. Abductor pollicis. Q. Tibialis anticus.



A. Pterygoideus internus. B. Mylohyoideus. C. Cerviculus secundus digiti primi. D. Biventer maxillae. E. Recti capitis posteriores minores. F. Recti capitis posteriori majores. G. Obliqui superiores capitis. H. Obliqui inferiores capitis. I. Interospinales cervicis. K. Scaleni medii. L. Intertransversarii colli. M. Levatores breviores costarum. N. Levatores longiores costarum. O. Intercostales externi. P. Intercostales interni. Q. Pleura. R. Intertransversarii dorsi. S. Semispinalis dorsi. T. Spinalis cervicis. U. Multifidi primae. V. Interospinales dorsi. W. Interospinales lumborum. X. Intertransversarii lumborum. Y. Quadrati lumborum. Z. Pars diaphragmatis.



A. Aponeurosis plantaris. B. Abductor pollicis. C. Flexor brevis pollicis. D. Flexor longus pollicis. E. Lumbricales. F. Transversalis pedis. G. Interosseus secundus digiti primi. H. Interosseus secundus digiti secundi. I. Interosseus secundus digiti tertii. K. Flexor brevis digitorum. L. Interosseus digiti minimi. M. Flexor brevis digiti minimi. N. Abductor digiti minimi. O. Flexor longus digitorum.



A. Flexor longus digitorum. B. Lumbricalis primus. C. Lumbricalis secundus. D. Lumbricalis tertius. E. Lumbricalis quartus. F. Flexor longus pollicis. G. Tibialis posticus. H. Tibialis anticus. I. Abductor pollicis. K. Flexor brevis pollicis. L. Adductor pollicis. M. Peroneus brevis. N. Peroneus longus. O. Flexor brevis digiti minimi. P. Interosseus digiti minimi. Q. Interosseus secundus digiti tertii. R. Interosseus primus. S. Interosseus secundus digiti secundi. T. Interosseus secundus digiti primi.



A. Peroneus brevis. B. Peroneus longus. C. Tibialis anticus. D. Interosseus primus digiti primi. E. Interosseus secundus. F. Interosseus primus digiti secundi. G. Interosseus secundus. H. Interosseus primus digiti tertii. I. Interosseus secundus. K. Interosseus digiti minimi.














*In Capite et Collo*

A. Epioranius. B. Attollens auriculam. C. Anterior auriculæ. D. Retrahentes auriculam. E. Helicis major. F. Helicis minor. G. Tragicus. H. Antitragicus. I. Orbicularis palpebrarum. K. Compressor naris. L. Nasalis labii superioris. M. Orbicularis oris. N. Zygomaticus major. O. Depressor anguli oris. P. Buccinator. Q. Masseter. R. Pterygoideus internus. S. Stylohyoideus. T. Styloglossus. U. Basiloglossus. V. Latissimus colli. W. Sternomastoideus cum Cleidomastoideo. X. Biventer cervicis. Y. Splenius capitis. Z. Splenius colli. a. Scalenus medius. b. Levator scapulae. c. Cucullares.

*In Trunco*

A. Infrascapulari. B. Teres minor. C. Teres major. D. Latissimus dorsi. E. Serratus anticus. F. Pectoralis. G. Serratus magnus. H. Obliquus externus abdominis. I. Cremaster.

*In artu superiore dextro.*

A. Triceps brachii. B. Brachialis internus. C. Biceps brachii. D. Supinator longus. E. Pronator teres. F. Radialis internus. G. Palmaris longus. H. Sublimis. I. Ulnaris internus. K. Ulnaris externus. L. Abductor pollicis brevis. M. Abductor pollicis brevis alter. N. Flexor brevis pollicis. O. Adductor pollicis. P. Flexor longus pollicis. Q. Palmaris brevis. R. Flexor digiti minimi brevis. S. Abductor digiti minimi. T. Adductor ossis metacarpi digiti minimi.

*In artu superiore sinistro.*

A. Deltoides. B. Biceps. C. Brachialis internus. D. Triceps. E. Ulnaris internus. F. Supinator longus. G. Radialis internus. H. Sublimis. I. Flexor pollicis longus. K. Radialis externus longior alter. L. Radialis externus longior. M. Radialis externus brevior. N. Ulnaris externus. O. Extensor digitorum communis. P. Indicator. Q. Extensor proprius digiti auricularis. R. Abductor pollicis longus. S. Extensor pollicis minor. T. Extensor pollicis major. U. Abductor pollicis brevis. V. Opponens pollicis. W. Adductor pollicis. X. Interosseus prior indicis. Y. Abductor indicis. Z. Flexores digitorum. 1. 2. 3. Lumbricales cum Interosseis.

*In coxa et artu inferiore sinistro.*

A. Adductor longus femoris. B. Pectineus. C. Proximus magnus. D. Sartorius. E. Tensor vaginae femoris. F. Gluteus medius. G. Gluteus magnus. H. Semitendinosus. I. Biceps cruris. K. Vastus externus. L. Rectus cruris. M. Vastus internus. N. Gemellus. O. Soleus. P. Plantaris. Q. Peroneus longus. R. Peroneus brevis. S. Extensor digitorum longus cum Peroneo tertio. T. Extensor pollicis proprius. U. Tibialis anticus. V. Extensor digitorum brevis. W. Interosseus primus digiti secundi. X. Interosseus secundus digiti secundi. Y. Interosseus secundus digiti tertii. Z. Interosseus secundus digiti quarti. a. Abductor digiti minimi. b. Flexor digiti minimi brevis. c. Flexor digitorum brevis et longus.

*In artu inferiore dextro.*

A. Rectus cruris. B. Vastus internus. C. Sartorius. D. Gracilis. E. Semimembranosus. F. Semitendinosus. G. Gemellus. H. Soleus. I. Plantaris. K. Flexor pollicis longus. L. Flexor digitorum longus. M. Tibialis posticus. N. Tibialis anticus. O. Extensor pollicis proprius. P. Extensor digitorum communis. Q. Flexor digitorum brevis. R. Abductor pollicis. S. Flexor pollicis brevis.





# EINTHEILUNG DER MUSKEL

NACH DEN THEILEN, DIE SIE BEWEGEN,

## Die Muskel des Unterkiefers.

|   |                                    |            |
|---|------------------------------------|------------|
| Der Kaumuskel                               | <i>Masseter</i>                    | Tab. XVII. |
| — Schlafmuskel                              | <i>Temporalis</i>                  | XVII.      |
| — innere Flügelmuskel                       | <i>Pterygoideus internus</i>       | XVII.      |
| — äußere Flügelmuskel                       | <i>Pterygoideus externus</i>       | XVII.      |
| — zweybäuchige Muskel des Un-<br>terkiefers | <i>Biventer maxillæ inferioris</i> | XVII.      |

## Die Muskel des Kopfes.

|   |                                      |        |
|---|--------------------------------------|--------|
| Der Brustschlüsselbeinwarzenmuskel        | <i>Sternocleidomastoideus</i>        | XVIII. |
| — bäuschchenähnliche des Kopfes           | <i>Splenius capitis</i>              | XVIII. |
| — zweybäuchige Nackenmuskel               | <i>Biventer cervicis</i>             | XVIII. |
| — durchflochtene Muskel                   | <i>Complexus</i>                     | XVIII. |
| — Nackenwarzenmuskel                      | <i>Trachelomastoideus</i>            | XVIII. |
| — hintere grössere gerade Kopf-<br>muskel | <i>Rectus capitis posticus major</i> | XIX.   |
| — hintere kleinere gerade Kopf-<br>muskel | <i>Rectus capitis posticus minor</i> | XIX.   |
| — obere schiefe Kopfmuskel                | <i>Obliquus superior capitis</i>     | XIX.   |
| — untere schiefe Kopfmuskel               | <i>Obliquus inferior capitis</i>     | XIX.   |
| — gerade Seitenmuskel des Kopfes          | <i>Rectus capitis lateralis</i>      | XIX.   |
| — innere grössere gerade Kopf-<br>muskel  | <i>Rectus capitis internus major</i> | XIX.   |
| — innere kleinere gerade Kopf-<br>muskel  | <i>Rectus capitis internus minor</i> | XIX.   |

## Die Muskel des Halses.

|   |   |        |
|---|---|--------|
| Der bäuschchenähnliche des Halses             | <i>Splenius colli</i>                           | XVIII. |
| — Stachelmuskel des Nackens                   | <i>Spinalis cervicis</i>                        | XXI.   |
| Die Zwischenstachelmuskel des Na-<br>ckens    | <i>Interspinales cervicis</i>                   | XXII.  |
| Der Queermuskel des Nackens                   | <i>Transversalis cervicis</i>                   | XX.    |
| — abwärtslaufende Nackenmuskel                | <i>Cervicalis descendens</i>                    | XX.    |
| — vordere Ungleichdreysseitige                | <i>Scalenus prior</i>                           | XXI.   |
| — mittlere Ungleichdreysseitige               | <i>Scalenus medius</i>                          | XXI.   |
| — hintere Ungleichdreysseitige                | <i>Scalenus posticus</i>                        | XXI.   |
| Die vordern Zwischenqueermuskel des<br>Halses | <i>Intertransversarii priores colli</i>         | XXII.  |
| — hintern Zwischenqueermuskel des<br>Halses   | <i>Intertransversarii posteriores<br/>colli</i> | XXII.  |
| Der lange Halsmuskel                          | <i>Longus colli</i>                             | XIX.   |

Die



## Die Muskel des ganzen Rückgrathes.

|   |                         |        |
|---|-------------------------|--------|
| Der Vieltheilige Muskel des Rückgrathes | <i>Multifidus spinæ</i> | XXIII. |
|---|-------------------------|--------|

## Die Muskel des Rückens und der Lenden.

|                           |                          |     |
|---------------------------|--------------------------|-----|
| Der längste Rückenmuskel  | <i>Longissimus dorsi</i> | XX. |
| — Heiligebeinlendenmuskel | <i>Sacrolumbalis</i>     | XX. |

## Die Muskel des Rückens.

|                                       |                                 |        |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------|
| Der Stachelmuskel des Rückens         | <i>Spinalis dorsi</i>           | XX.    |
| — Halbstachelmuskel des Rückens       | <i>Semispinalis dorsi</i>       | XXI.   |
| Die Zwischenstachelmuskel des Rückens | <i>Interspinales dorsi</i>      | XXIII. |
| — Zwischenqueermuskel des Rückens     | <i>Intertransversarii dorsi</i> | XXII.  |

## Die Muskel der Lenden.

|                                      |                                    |        |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Der viereckichte Lendenmuskel        | <i>Quadratus lumborum</i>          | XXIII. |
| — kleine Lendenmuskel                | <i>Psoas parvus</i>                | XXIV.  |
| Die Zwischenstachelmuskel der Lenden | <i>Interspinales lumborum</i>      | XXIII. |
| — Zwischenqueermuskel der Lenden     | <i>Intertransversarii lumborum</i> | XXIII. |

## Die Muskel der Brust.

|                                    |                                     |        |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Der hintere obere Sägemuskel       | <i>Serratus posticus superior</i>   | XVIII. |
| — hintere untere Sägemuskel        | <i>Serratus posticus inferior</i>   | XV.    |
| Die längeren Hebemuskel der Rippen | <i>Levatores longiores Costarum</i> | XXI.   |
| — kürzeren Hebemuskel der Rippen   | <i>Levatores breviores Costarum</i> | XXI.   |
| — äußern Zwischenrippenmuskel      | <i>Intercostales externi</i>        | XXII.  |
| — innern Zwischenrippenmuskel      | <i>Intercostales interni</i>        | XXII.  |
| Der dreyeckichte Brustbeinmuskel   | <i>Triangularis sterni</i>          | XXIII. |

## Die Bauchmuskel

|                                |                                    |      |
|--------------------------------|------------------------------------|------|
| Der äußere schiefe Bauchmuskel | <i>Obliquus externus abdominis</i> | XV.  |
| — innere schiefe Bauchmuskel   | <i>Obliquus internus abdominis</i> | XV.  |
| — gerade Bauchmuskel           | <i>Rectus abdominis</i>            | XVI. |
| — Pyramidenmuskel              | <i>Pyramidalis</i>                 | XVI. |
| — queere Bauchmuskel           | <i>Transversus abdominis</i>       | XVI. |



## Die Muskel des Schwanzbeines.

|                       |                  |      |
|-----------------------|------------------|------|
| Der Schwanzbeinmuskel | <i>Coccygens</i> | XXV. |
|-----------------------|------------------|------|

## Die Muskel der Schulter.

|                                 |                          |     |
|---------------------------------|--------------------------|-----|
| Der Mönchskappenmuskel          | <i>Cucullaris</i>        | I.  |
| — größere rautenförmige Muskel  | <i>Rhomboideus major</i> | I.  |
| — kleinere rautenförmige Muskel | <i>Rhomboideus minor</i> | I.  |
| — Aufheber des Schulterblattes  | <i>Levator scapulae</i>  | I.  |
| — Unter Schlüsselbeinmuskel     | <i>Subclavius</i>        | II. |
| — vordere Sägemuskel            | <i>Serratus anticus</i>  | I.  |
| — große Sägemuskel              | <i>Serratus magnus</i>   | I.  |

## Die Muskel des Armes.

|                            |                         |      |
|----------------------------|-------------------------|------|
| Der Deltamuskel            | <i>Deltoides</i>        | II.  |
| — Obergräthenmuskel        | <i>Supraspinatus</i>    | III. |
| — breiteste Rückenmuskel   | <i>Latissimus dorsi</i> | II.  |
| — größere runde Muskel     | <i>Teres major</i>      | III. |
| — kleinere runde Muskel    | <i>Teres minor</i>      | III. |
| — Untergräthenmuskel       | <i>Infraspinatus</i>    | III. |
| — Brustmuskel              | <i>Pectoralis</i>       | II.  |
| — Rabenarmmuskel           | <i>Coracobrachialis</i> | III. |
| — Unterschulterblattmuskel | <i>Subscapularis</i>    | III. |

## Die Muskel des Vorderarmes.

|                               |                            |     |
|-------------------------------|----------------------------|-----|
| Der innere Armmuskel          | <i>Brachialis internus</i> | V.  |
| — zweyköpfige Armmuskel       | <i>Biceps brachii</i>      | IV. |
| — dreyköpfige Armmuskel       | <i>Triceps brachii</i>     | IV. |
| — Ellenbogenmuskel            | <i>Anconeus</i>            | IV. |
| — lange Rückwärtswender       | <i>Supinator longus</i>    | V.  |
| — kurze Rückwärtswender       | <i>Supinator brevis</i>    | X.  |
| — runde Vorwärtswender        | <i>Pronator teres</i>      | V.  |
| — viereckichte Vorwärtswender | <i>Pronator quadratus</i>  | X.  |

## Die Muskel der Hand.

|                                   |                                  |       |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------|
| Der äußere längere Speichenmuskel | <i>Radialis externus longior</i> | VIII. |
| — äußere kürzere Speichenmuskel   | <i>Radialis externus brevior</i> | VIII. |
| — äußere Ellenbogenbeinmuskel     | <i>Ulnaris externus</i>          | VII.  |
| — innere Ellenbogenbeinmuskel     | <i>Ulnaris internus</i>          | V.    |
| — innere Speichenmuskel           | <i>Radialis internus</i>         | V.    |

## Die Muskel der vier Finger

|  |  |      |
|--|--|------|
| Der gemeinschaftliche Ausstrecker der Finger | <i>Extensor communis digitorum manus</i> | VII. |
| — hochliegende Muskel                        | <i>Sublimis</i>                          | IX.  |
| — tiefliegende Muskel                        | <i>Profundus</i>                         | IX.  |
| Die Regenwurmmuskel der Hand                 | <i>Lumbricales manus</i>                 | IX.  |
| — innern Zwischenknochenmuskel               | <i>Interossei interni manus</i>          | XI.  |
| — äußern Zwischenknochenmuskel               | <i>Interossei externi manus</i>          | XI.  |

## Die Muskel des Zeigefingers.

|                             |                         |       |
|-----------------------------|-------------------------|-------|
| Der Anzeiger                | <i>Indicator</i>        | VIII. |
| — Abzieher des Zeigefingers | <i>Abductor indicis</i> | X.    |

## Die Muskel des Ohrfingers.

|   |   |      |
|---|---|------|
| Der eigene Ausstrecker des Ohrfingers                 | <i>Extensor proprius auricularis</i>    | VII. |
| — Abzieher des kleinsten Fingers                      | <i>Abductor digiti minimi</i>           | VI.  |
| — kleine Bieger des kleinsten Fingers                 | <i>Flexor parvus digiti minimi</i>      | VI.  |
| — Zuzieher des Mittelhandbeines des kleinsten Fingers | <i>Adductor metacarpi digiti minimi</i> | VI.  |

## Die Muskel des Daumens.

|  |                                       |       |
|--|---------------------------------------|-------|
| Der lange Abzieher des Daumens         | <i>Abductor longus pollicis</i>       | VII.  |
| — kurze Abzieher des Daumens           | <i>Abductor brevis pollicis</i>       | VI.   |
| — zweyte kurze Abzieher des Daumens    | <i>Abductor brevis alter pollicis</i> | VI.   |
| — entgegenstellende Muskel des Daumens | <i>Opponens pollicis</i>              | VI.   |
| — Zuzieher des Daumens                 | <i>Adductor pollicis</i>              | X.    |
| — lange Bieger des Daumens             | <i>Flexor longus pollicis</i>         | IX.   |
| — kurze Bieger des Daumens             | <i>Flexor brevis pollicis</i>         | X.    |
| — kleinere Ausstrecker des Daumens     | <i>Extensor minor pollicis</i>        | VII.  |
| — größere Ausstrecker des Daumens      | <i>Extensor major pollicis</i>        | VIII. |

## Die Muskel der flachen Hand.

|                            |                        |     |
|----------------------------|------------------------|-----|
| Der lange Flachehandmuskel | <i>Palmaris longus</i> | VI. |
| — kurze Flachehandmuskel   | <i>Palmaris brevis</i> | VI. |



## Die Muskel des Schenkels.

|                                   |                                |         |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------|
| Der große Lendenmuskel            | <i>Psoas magnus</i>            | XXIV.   |
| — innere Hüftmuskel               | <i>Iliacus internus</i>        | XXIV.   |
| — Kammmuskel                      | <i>Pectineus</i>               | XXVI.   |
| — lange Zuzieher des Schenkels    | <i>Adductor longus femoris</i> | XXVII.  |
| — kurze Zuzieher des Schenkels    | <i>Adductor brevis femoris</i> | XXVII.  |
| — große Zuzieher des Schenkels    | <i>Adductor magnus femoris</i> | XXVIII. |
| — äußere Verstopfer               | <i>Obturator externus</i>      | XXVIII. |
| — große Gefäßmuskel               | <i>Gluteus magnus</i>          | XXIV.   |
| — mittlere Gefäßmuskel            | <i>Gluteus medius</i>          | XXV.    |
| — kleinere Gefäßmuskel            | <i>Gluteus minor</i>           | XXVI.   |
| — birnförmige Muskel              | <i>Pyramiformis</i>            | XXVII.  |
| — innere Verstopfer               | <i>Obturator internus</i>      | XXVII.  |
| — viereckichte Schenkelmuskel     | <i>Quadratus femoris</i>       | XXVII.  |
| Die Zwillingsmuskel des Schenkels | <i>Gemini</i>                  | XXVII.  |
| — Spanner der Schenkelscheide     | <i>Tensor vaginæ femoris</i>   | XXIV.   |

## Die Muskel des Unterschenkels.

|                                   |                        |         |
|-----------------------------------|------------------------|---------|
| Der gerade Unterschenkelmuskel    | <i>Rectus Cruris</i>   | XXV.    |
| — äußere dicke Muskel             | <i>Vastus externus</i> | XXVI.   |
| — innere dicke Muskel             | <i>Vastus internus</i> | XXVI.   |
| — Unterschenkelmuskel             | <i>Cruialis</i>        | XXVI.   |
| — zweyköpfige Unterschenkelmuskel | <i>Biceps cruris</i>   | XXVIII. |
| — halbsehnige Muskel              | <i>Semitendinosus</i>  | XXVIII. |
| — halbhäutige Muskel              | <i>Semimembranosus</i> | XXVIII. |
| — schlanke Muskel                 | <i>Gracilis</i>        | XXVI.   |
| — Schneidermuskel                 | <i>Sartorius</i>       | XXV.    |
| — Kniekehlenmuskel                | <i>Popliteus</i>       | XXIX.   |

## Die Muskel des Fußes.

|                              |                          |        |
|------------------------------|--------------------------|--------|
| Der Zwillingsmuskel der Wade | <i>Gemellus</i>          | XXIX.  |
| — Plattfußmuskel             | <i>Plantaris</i>         | XXIX.  |
| — Schollenmuskel             | <i>Soleus</i>            | XXIX.  |
| — lange Wadenbeinmuskel      | <i>Peroneus longus</i>   | XXXII. |
| — kurze Wadenbeinmuskel      | <i>Peroneus brevis</i>   | XXXII. |
| — dritte Wadenbeinmuskel     | <i>Peroneus tertius</i>  | XXX.   |
| — hintere Schienbeinmuskel   | <i>Tibialis posticus</i> | XXXII. |
| — vordere Schienbeinmuskel   | <i>Tibialis anticus</i>  | XXX.   |



## Die Muskel der Zehen.

|  |  |         |
|--|--|---------|
| Der lange Ausstrecker der Zehen            | <i>Extensor longus digitorum pedis</i> | XXX.    |
| — kurze Ausstrecker der Zehen              | <i>Extensor brevis digitorum pedis</i> | XXX.    |
| — lange Bieger der Zehen                   | <i>Flexor longus digitorum pedis</i>   | XXXI.   |
| — kurze Bieger der Zehen                   | <i>Flexor brevis digitorum pedis</i>   | XXXI.   |
| Die Regenwurmmuskel des Fusses             | <i>Lumbricales pedis</i>               | XXXI.   |
| — äussern Zwischenknochenmuskel des Fusses | <i>Interossei externi pedis</i>        | XXXIII. |
| — inneren Zwischenknochenmuskel des Fusses | <i>Interossei interni pedis</i>        | XXXIII. |

## Die eigenen Muskel der grossen Zehe.

|   |   |         |
|---|---|---------|
| Der eigene Ausstrecker der grossen Zehe | <i>Extensor proprius pollicis pedis</i> | XXX.    |
| — lange Bieger der grossen Zehe         | <i>Flexor longus pollicis pedis</i>     | XXXI.   |
| — kurze Bieger der grossen Zehe         | <i>Flexor brevis pollicis pedis</i>     | XXXII.  |
| — Zuzieher der grossen Zehe             | <i>Adductor pollicis pedis</i>          | XXXIII. |
| — Queermuskel des Fusses                | <i>Transversalis pedis</i>              | XXX.    |
| — Abzieher der grossen Zehe             | <i>Abductor pollicis pedis</i>          | XXIX.   |

## Die eigenen Muskel der kleinsten Zehe.

|                                   |  |         |
|-----------------------------------|--|---------|
| Der Abzieher der kleinsten Zehe   | <i>Abductor digiti minimi pedis</i>      | XXXI.   |
| — kurze Bieger der kleinsten Zehe | <i>Flexor brevis digiti minimi pedis</i> | XXXIII. |



BESCHREIBUNG  
DER  
EINZELN MUSKEL  
DIE  
KNOCHEN BEWEGEN.

DISCHARGE

OF

WILLIAM W. WILSON


OF THE

ARMY OF THE UNITED STATES





TABI.





# T A B. I.

**FIG. I. rückwärts II. vorwärts. DER MOENCHSKAPPENMUSKEL**  
(*Cucullaris*). In der Syntax T. I. im Halfe B. III. o. VI. c.

Er entstehet an der oberen bogenförmigen Linie des Hinterhauptbeines (a) an dem Nackenbände (b) und an den Spitzen der Stachelfortsätze der zwey untersten Hals- (6. 7) und aller Rückenwirbelbeine (1—12).

— endet sich an der oberen Gegend der hinteren Hälfte des Schlüsselbeines (c), an der Schulterhöhe (d) und Schulterblattsgräthe (e).

— erhält und hebet den geneigten Kopf; drehet ihn, den Hals und den Rücken nach der feststehenden Schulter; zieht die Schulter rück- und aufwärts, gerade nach hinten, oder rück- und abwärts, je nachdem die einzelnen Theile desselben wirken.

**FIG. III. vorw. IV. rückw. DER AUFHEBER DES SCHULTERBLATTES**  
(*Levator scapulae*) Synt. T. I. im Halfe H. III. T. IV. H. VI. b.

Er entstehet an den Querfortsätzen der vier oberen Halswirbelbeine (1. 4).

— endet sich an dem hinteren oberen Winkel des Schulterblattes (a).

— hebet das Schulterblatt ein- und vorwärts auf; bey festem Schulterblatte zieht er den Hals rück- und seitwärts.

**FIG. V. rückw. DER GROESSERE RAUTENFOERMIGE MUSKEL**  
(*Rhomboideus major*) Synt. T. III. im Stamme B.

Er entstehet an den Stachelfortsätzen der vier obersten Rückenwirbel (1—4) und des letzten Halswirbelbeines (7), dann auch an ihren Zwischenstachelbändern (a).

— endet sich an der äusseren Lefze des hinteren Randes am Schulterblatte (b) unter der dreyeckichten Fläche.

— hebet das Schulterblatt nach hinten zu schief aufwärts; wenn die Schulter fest ist, so drehet er den Rücken gegen selbe.

**FIG. VI. rückw. DER KLEINERE RAUTENFOERMIGE MUSKEL**  
(*Rhomboideus minor*) Synt. T. III. im Stamme I.

Er entstehet an den Stachelfortsätzen der drey unteren Halswirbelbeine (5—7) und an dem Nackenbände (a).

— endet sich an der äusseren Lefze des hinteren Randes am Schulterblatte (b) bey der dreyeckichten Fläche.

— wirkt wie der vorige auf das Schulterblatt; drehet aber bey festgehaltener Schulter den Hals zur Seite abwärts.

**FIG. VII. vorw. DER VORDERE SÆGEMUSKEL** (*Serratus anticus*)  
Synt. T. I. im Stamme G. VI. E.

Er entspringet an der äusseren Lefze des oberen Randes der dritten, vierten und fünften Rippe (3—5), wo diese sich mit ihren Knorpeln verbinden.

Er endet sich an dem rabenähnlichen Fortsatze des Schulterblattes (a).

— zieht den Hals des Schulterblattes ein- und vorwärts schief herab, oder hebet die genannten Rippen auf- und auswärts.

**FIG. VIII. seitwärts. DER GROSSE SÆGEMUSKEL** (*Serratus magnus*).  
Synt. T. I. im Stamme c. III. o. VI. G.

Er entstehet an den neun oberen Rippen (1—9) und einigen Zwischenrippenmuskeln (a).

— endet sich an dem Grunde (b) und unteren Winkel des Schulterblattes (c), welches, da es sonst das Ende desselben bedeckt, weggenommen ist.

— zieht das Schulterblatt vor- und aufwärts, gerade vorwärts, oder vor- und abwärts; bey befestigter Schulter wirkt er im Gegentheile über die Rippen, an welchen er entstehet.



## T A B. II.

### FIG. I. *vorw.* DER UNTERSCHLÜSSELBEINMUSKEL (*Subclavius*)

Synt. T. I. *im Stamme F.*

Er entstehet an dem Knorpel der ersten Rippe (1).

— endet sich an der unteren Fläche des Schlüsselbeines (a).

— zieht das Schlüsselbein ab- und vorwärts gegen das Brustbein; hebet bey befestigtem Schlüsselbeine die erste Rippe auf.

### FIG. II. *vorw.* III. *rückw.* DER DELTAMUSKEL (*Deltoides*).

Synt. T. I. *im linken Arme A.* III. A\*. VI. A.

Er entstehet am vorderen Rande der äußeren Hälfte des Schlüsselbeines (a), an der Schulterhöhe (b) und dem unteren Rande der Schulterblattsgräthe (c).

— endet sich an der Rauhnigkeit des Körpers am Armknochen (d)!

Der ganze Muskel zieht den Arm gerade auswärts in die Höhe; mit dem vorderen Theile allein wirkend zieht er selben vorwärts, mit dem hinteren Theile allein rückwärts in die Höhe: auch drückt er den Kopf des Armbeines in die Gelenkfläche des Schulterblattes; bey befestigtem Arme wirkt er im Gegentheile über die Schulter.

### FIG. IV. *vorwärts* V. *rückwärts*. DER BRUSTMUSKEL (*Pectoralis*)

Synt. Tab. I. *im Stamme A\**. VI. F.

Er entstehet an dem vorderen Rande des Schlüsselbeines, an dessen gewölbtem Theile (a), an der vorderen Lefze des Brustbeins Seitenrandes (b), an den Knorpeln der drey untersten wahren Rippen (6. 7) und an der fehnigen Ausbreitung des äußeren schiefen Bauchmuskels (c).

— endet sich an der rauhen Linie des großen Hügels am Armknochen (d) dergestalt, daß die obern (e), welche vor- und abwärts laufen, die unteren aufsteigenden Theile (f) überkreutzen und vorwärts bedecken.

Wirket der ganze Muskel, so zieht er den Arm gegen die Brust vorwärts, und drehet ihn zugleich einwärts; ist der Arm erhoben, so zieht er ihn ab- und vorwärts. Ist sein oberer Theil allein in Wirkung, so hebet er den Arm und die Schulter vorwärts, so wie sein unterer selbe vorwärts niederdrückt. Bey befestigtem Arme wirkt er über den ganzen Stamm oder jene Theile des Stammes, aus welchen er entstehet, in entgegengesetzter Richtung.


### FIG. VI. *rückw.* VII. *seitw.* VIII. *vorw.* DER BREITESTE RÜCKENMUSKEL (*Latissimus dorsi*) Synt. T. I. *im Stamme B.* III. F. VI. D.

Er entstehet mit einer fehnigen Ausbreitung an den Stachelfortätzen der sechs bis acht untersten Rückenwirbel (6—12) und aller Lendenwirbelbeine (1—5), an den Stacheln (a) und dem Schwanzhügel des heiligen Beines (b), an der hinteren Hälfte der äußeren Lefze des Darmbeinkammes (c), endlich an der äußeren Fläche der vier untersten Rippen (9—11).

— endet sich an der rauhen Linie (d), die vom kleineren Hügel des Armknochens herabsteiget.

— drückt den erhobenen Arm und die Schulter nieder, dann zieht er sie nach hinten abwärts, drehet den Arm einwärts, und wenn dieser befestiget ist, so hebet er die vier untersten Rippen und den Stamm in die Höhe.



















TAB. III.





**FIG. I. rückw. II. vorw. DER OBERGRÄTHENMUSKEL (*Supraspinatus*)**

Synt. T. I. III. *im rechten Arme A.*

Er entstehet an der ganzen Grube ober der Gräthe am Schulterblatte (*a*).

— endet sich an dem obersten Muskeleindrucke des gröfseren Hügels am Armknochen (*b*).

— hebet den Arm vorwärts und zugleich schief auswärts in die Höhe, da er sich an dem Kapselbande befestiget, spannet er dasselbe bey dieser Bewegung an, damit es nicht, weil es sich dabey faltet, eingeklemmet werde. Das Schulterblatt ziehet er im Gegentheile an den Kopf des Armknochens, wenn der Arm befestiget ist.

**FIG. III. rückw. DER UNTERGRÄTHENMUSKEL (*Infraspinatus*)**

Synt. T. III. *im Stamme A, und im rechten Arme c. VI. im Stamme A.*

Er entstehet an der untern Fläche der Schulterblattsgräthe (*a*), an dem Grunde (*b*) und unterem Winkel (*c*) des Schulterblattes, wie auch an jenem Theile der Fläche unter der Gräthe, die er bedeckt.

— endet sich an dem mittleren Muskeleindrucke des gröfseren Hügels am Armknochen (*d*).

— drehet den Armknochen von vorne auswärts; die Gelenkkapsel spannet er aus gleicher Ursache wie der vorige an.

**FIG. IV. rückw. V. vorw. DER KLEINERE RUNDE MUSKEL (*Teres minor*)**

Synt. T. III. *im Stamme B, und im rechten Arme B. VI. im Stamme B.*

Er entstehet an den obern zwey Drittheilen der äufseren Lefze des vorderen Randes am Schulterblatte (*a*).

— endet sich an dem unteren Muskeleindrucke des gröfseren Hügels am Armknochen (*b*).

— wirkt wie der vorige.

**FIG. VI. rückw. VII. vorw. DER GROESSERE RUNDE MUSKEL (*Teres major*)**

Synt. T. I. *im Stamme I. T. II. im linken Arme B. III. im Stamme E. und im rechten Arme D. IV. im linken Arme B. VI. Stamme C.*

Er entstehet an dem noch übrigen Theile der äufseren Lefze des vorderen Randes (*a*) und am unteren Winkel des Schulterblattes (*b*).

— endet sich an der rauhen Linie, die von dem kleineren Hügel des Armknochens abwärts läuft (*c*).

— drehet den Arm einwärts, und ziehet ihn gegen den Rücken.

**FIG. VIII. vorw. DER UNTERSCHULTERBLATTMUSKEL (*Subscapularis*)**

Synt. T. I. *im Stamme H. II. IV. im rechten und linken Arme A.*

Er entstehet an der ganzen ausgehöhlten Fläche und allen Rändern des Schulterblattes (*a*).

— endet sich an dem kleineren Hügel des Armknochens (*b*).

— drehet den Arm einwärts, und wenn er in die Höhe gehoben ist, ziehet er ihn abwärts. Spannet bey seiner Wirkung ebenfalls die Gelenkkapsel an, um die Einklemmung zu verhindern.

**FIG. IX. vorw. X. rückw. DER RABENARM MUSKEL (*Coracobrachialis*)**

Synt. T. I. *im rechten und linken Arme B. II. im linken Arme D. IV. c.*

Er entstehet an der Spitze des rabenähnlichen Fortsatzes am Schulterblatte (*a*) genau mit dem kürzeren Kopfe des zweyköpfigen Armmuskels verwachsen bis zu jenem Ort, wo dieser Kopf abgeschnitten ist (*b*). Auch bemerkt man in dem Körper dieses Muskels der Länge nach eine Spalte (*c*), wodurch ein Armnerv von innen nach aussen zu läuft.

— endet sich in- und etwas rückwärts an der Mitte des Armknochens (*d*).

— ziehet den Arm fest an die Seite des Stammes, und wenn selber einwärts gekehret ist, so drehet er ihn auswärts; ziehet auch das Schulterblatt an den Kopf des Armknochens.



## T A B. IV.

**FIG. I. vorw. II. rückw. DER ZWEYKOEPPIGE ARMMUSKEL**  
*(Biceps brachii)* Synt. T. I. *im rechten Arme c. im linken Arme d.*  
 II. c. III. *im rechten Arme f. VI. c. im linken Arme b.*

Die Sehne seines längeren Kopfes entstehet in der Höhle des Armgelenkes am oberen, und äußeren Theile des Randes der Gelenkhöhle des Schulterblattes (*a*), läuft über den Kopf des Armknochens in die Furche zwischen den beyden Hügelu desselben, wo sie dann die Gelenkkapsel durchbohret; es befindet sich aber hier ein Zellengewebe, um sowohl diese Oeffnung zu schliessen, als auch die Sehne locker zu verbinden; wie sie aber ferner in dieser Furche schon zwischen den zwey von den Armhügelu herabsteigenden rauhen Linien sich befindet, wird sie durch sehnigbänderige Fasern, die von einer rauhen Linie zur andern lauffen, fest in dieser Furche erhalten; damit sie bey keiner Bewegung des Arms ausgleiten könne, und so verlieret sie sich endlich in dem Muskelkörper, nachdem sie in einiger Entfernung frey aus der Furche heraus getreten ist. Der kürzere Kopf entstehet verbunden mit dem Rabenarmmuskel, wie dort schon gemeldet worden, aus der Spitze des rabenähnlichen Fortsatzes (*b*).

— endet sich in eine sehnige Ausbreitung (*c*), die sich einwärts über die Vorderarmmuskeln in die sehnige Scheide verbreitet; dann in eine starke Sehne (*d*), die sich an dem hinteren Theile der Rauhigkeit der Speiche (*e*) befestiget.

— drehet die Speiche, wenn sie vorwärts gekehret ist, rückwärts, und bieget den Vorderarm, auch spannet er die Scheide des Vorderarms einwärts an. Bey befestigtem Vorderarm kann er ebenfalls den Arm über selbst biegen; wirkt er aber, wenn der Vorderarm ausgestreckt gehalten wird, so ziehet er den Arm an die Seite des Körpers und vorwärts: ist er auswärts gekehret, so wird er von ihm einwärts gedrehet; das Schulterblatt ziehet er an den Armknochen.

**FIG. III. vorw. IV. und V. rückw. DER DREYKOEPPIGE ARMMUSKEL**  
*(Triceps brachii)* Synt. T. I. *im linken Arme c. im rechten Arme d. III. im linken Arme b. im rechten Arme e. VI. im linken Arme d. im rechten Arme a.*

Der lange Kopf (*A*) entstehet an dem Halfe des Schulterblattes (*a*). Der kurze (*B*) an der äußeren Fläche des Armknochens (*b*) gleich unter dem Halfe desselben, wie auch an dem vorderen Winkel eben dieses Knochens (*c*). Der dritte Kopf (*C*) wird der ÄUSSERE ARMMUSKEL (*Brachialis externus*) Synt. T. II. *im linken Arme e. T. III. f. T. IV. d.* genannt, ist von den vorigen zweyen bedeckt, und entstehet aus der äußeren Fläche der unteren Hälfte des Armknochens (*d*), an dem hinteren (*e*) und vorderen Winkel (*f*) und Knorren (*g*) dieses Knochens.

Der lange und kurze Kopf enden sich nicht an dem Höckerfortsatze (*b*) allein, wie der äußere Armmuskel (*i*), sondern sie geben auch eine sehnige Ausbreitung (*k*) von sich, die sich theils an dem äußeren Winkel des Ellenbogenbeines (*l*) befestiget, theils auswärts in die sehnige Scheide verlieret.

Er strecket den Vorderarm aus, und wenn dieser befestiget ist, wirkt er im Gegentheile über den Arm: der lange Kopf kann noch besonders den Arm an die Seite des Körpers und etwas rückwärts ziehen: auch ziehet er das Schulterblatt an den Armknochen.


**FIG. VI. rückw. DER ELLENBOGENMUSKEL (*Anconeus*)** Synt. T. III. *im linken Arme g. im rechten Arme k.*

Er entstehet an dem vorderen Knorren des Armknochens (*a*).

— endet sich an dem äußeren Winkel des oberen Endes des Ellenbogenbeines (*b*), auch befestiget er sich durch einige Fasern an die über ihm liegende sehnige Ausbreitung des dreyköpfigen Armmuskels.

— strecket den Vorderarm aus, und spannet die sehnige Ausbreitung vorwärts an.
















## TAB. V.

**FIG. I. vorw. gewendet. DER LANGE RÜCKWÆRTSWENDER** (*Supinator longus*) Synt. T. I. *im linken Arme H; im rechten Arme ©.* III. *im linken Arme D. VI. im linken Arme F; im rechten Arme D.*

Er entstehet an dem vorderen Winkel unter der Mitte des Armknochens (a).

— endet sich an der Wurzel des Griffelfortsatzes der Speiche, an dessen vorderem Rande (b).

— drehet die Speiche sowohl aus- als einwärts, nachdem die eine oder andere Bewegung vorhergegangen ist, auch trägt er viel zur Biegung des Vorderarms über den Arm bey.

**FIG. II. vorw. III. rückw. DER RUNDE VORWÆRTSWENDER** (*Pronator teres*) Synt. T. I. *im linken Arme I; im rechten Arme \*.* II. *im linken Arme K. VI. im rechten Arme E.*

Er entstehet an dem hinteren Knorren des Armknochens (a).

— endet sich an der vorderen Fläche der Speiche (b).

— drehet die Speiche einwärts, und hilft den Vorderarm biegen.

**FIG. IV. rückw. V. vorw. DER INNERE ARMMUSKEL** (*Brachialis internus*) Synt. T. I. *im linken Arme F; im rechten Arme E. H. im linken Arme F. III. im linken Arme c; im rechten Arme G. IV. im linken Arme E. VI. im linken Arme c; im rechten Arme B.*

Er entstehet mit zwey Spitzen an dem Ende jener Rauhigkeit des Armknochens, an welcher der Deltamuskel sich endet (a), dann sowohl aus der hinteren als vorderen Fläche der unteren Hälfte des Armknochens.

— endet sich an der Rauhigkeit des Ellenbogenbeines (b), welche an der Wurzel des krähenähnlichen Fortsatzes ist, noch vorher verlieren sich einige fehnige Fasern mit der fehnigen Ausbreitung des zweyköpfigen Armmuskels in die Vorderarmscheide.

— bieget den Vorderarm, und, wenn dieser befestiget ist, den Arm über den Vorderarm.

**FIG. VI. vorw. DER INNERE SPEICHENMUSKEL** (*Radialis internus*) Synt. T. I. *im linken Arme K. VI. im linken Arme G; im rechten Arme F.*

Er entstehet an dem hinteren Knorren des Armknochens (a).

— endet sich an der inneren Gegend des Grundstückes vom Mittelhandbeine des Zeigefingers (b).

— bieget die Hand, drehet sie sammt der Speiche einwärts, und hilft mit zur Biegung des Vorderarms.

**FIG. VII. rückw. VIII. vorw. DER INNERE ELLENBOGENBEINMUSKEL** (*Ulnaris internus*) Synt. T. I. *im linken Arme N; im rechten Arme K. III. im linken Arme M; im rechten Arme R. VI. im rechten Arme I; im linken E.*


Er entstehet an dem hinteren Knorren des Armknochens (a), an der hinteren Seite des Höckerfortsatzes (b), und mittelst der fehnigen Scheide an dem äußeren Winkel des Ellenbogenbeines (c) fast durch die ganze Länge desselben.

— endet sich an dem erbsenähnlichen Beine (d).

— ziehet das erbsenähnliche Bein aufwärts, bieget und ziehet die Hand rückwärts.



TAB. VI.



T A B. VI.

FIG. I. vorw. (a.b.c.) DER LANGE FLACHE HANDMUSKEL (*Palmaris longus*) Synt. T. I. im linken Arme L. III. im linken Arme K. VI. im rechten Arme G.

Er entstehet an dem hinteren Knorren des Armknochens (a).

— endet sich theils an dem inneren Querbande der Handwurzel und kurzen Abzieher des Daumens (b); welches Ende hier abgeschnitten, und ganz in den Tabellen der Muskelbänder der Hand zu sehen ist, grösstentheils aber verlieret er sich in die sehnige Ausbreitung der flachen Hand (c).

— spannet die sehnige Ausbreitung der flachen Hand nach oben zu an, bieget die Hand, und trägt sowohl zur Einwärtsdrehung als Biegung des Vorderarmes bey.

FIG. I. vorw. (d.e.) DER KURZE FLACHE HANDMUSKEL (*Palmaris brevis*) Synt. T. I. in der linken Hand s. VI. in der rechten Hand a.

Er entstehet an der sehnigen Ausbreitung der flachen Hand (d), und an dem inneren queeren Handwurzelbande nahe an dem Daumen.

— endet sich an der Fetthaut, und Muskelscheide am hinteren Rande der Hand (e).

— zieht die Haut, an die er sich endet, gegen den Ballen und macht sie daher etwas aufschwellen.

FIG. II. vorw. (a.b.c.d.) DER KURZE ABZIEHER DES DAUMENS DER HAND (*Abductor brevis pollicis manus*) Synt. T. I. in der linken Hand u. VI. in der rechten L; in der linken u.

Er entstehet an dem inneren queeren Handwurzelbande (a), wie auch aus einer in ihm sich verlierenden Seline des langen Abziehers, welche hier abgeschnitten ist (b).

— endet



— endet sich an dem vorderen Hügel des Grundstückes vom ersten Gliede des Daumens (*c*), dann wendet er sich auf den Rücken desselben (*d*), und endet sich vereinigt mit den Ausstrekern an dem zweyten Gliede des Daumens.

— zieht den Daumen von den übrigen Fingern ab, und etwas gegen die flache Hand; bieget auch das erste Glied. Ist der Daumen aber, so viel möglich, schon abgezogen, oder das Mittelhandbein befestiget, so strecket er das zweyte, und dann auch das erste Glied aus.

**FIG. II. vorw. (c.f.g.) DER KLEINE BIEGER DES KLEINSTEN FINGERS DER HAND.** (*Flexor parvus digiti minimi manus*) Synt. T. I. in der linken Hand *γ*; in der rechten *w*. VI. in der rechten *R*.

Er entstehet an dem hackenförmigen Fortsatze des Hackenbeines (*e*), und an dem inneren queeren Handwurzelbande (*f*).

— schlinget sich bey dem hinteren Rande des Fingers auf den Rücken desselben (*g*), und endet sich an dem dritten Gliede (vid. T. VII. Fig. II. (B) *D*).

— bieget den kleinsten Finger und dessen Mittelhandbein; strecket das zweyte und dritte Glied aus.

**FIG. III. vorw. (a.b.) DER ZWEYTE KURZE ABZIEHER DES DAUMENS DER HAND** (*Abductor brevis alter pollicis manus*) Synt. T. VI. i. d. link. H. M.

Er entstehet an dem inneren, queeren Handwurzelbande (*a*).

— endet sich an dem vorderen, rauhen Hügel des Grundstückes vom ersten Gliede des Daumens (*b*). Bey dieser seiner Befestigung, und noch eher ist er mit dem kurzen Bieger des Daumens fest verwachsen, daher ihn andere und auch Albin an manchen Stellen als einen Theil desselben betrachten.

— zieht den Daumen von den übrigen Fingern ab, aber mehr einwärts, er bieget auch das erste Glied des Daumens.

**FIG. III. vorw. (c. d.) DER ABZIEHER DES KLEINSTEN FINGERS DER HAND** (*Abductor digiti minimi manus*) Synt. T. I. in der rechten Hand *x*. III. in der rechten Hand *T*; in der linken *α*. VI. in der rechten Hand *s*.

Er entstehet an dem erbsenähnlichen Beine (*c*).

— endet sich am hinteren Hügel des Grundstückes vom ersten Gliede des kleinsten Fingers (*d*), der andere Theil seiner Sehne aber läuft mit dem kleinen Bieger auf den Rücken des Fingers, um da die sehnige Ausbreitung bilden zu helfen, und an dem dritten Gliede sich zu enden, wie es bey den Ausstrekern dieses Fingers zu sehen ist.

— zieht den kleinsten Finger von den übrigen ab, bieget ihn und das Mittelhandbein, auch streket er das dritte Glied dieses Fingers aus.

**FIG. IV. vorw. (a. b. c.) DER ENTGEGENSTELLENDEN DAUMEN-MUSKEL DER HAND** (*Opponens pollicis manus*) Synt. T. I. in der linken Hand *T*; in der rechten *α*. VI. in der linken Hand *v*.

Er entstehet an dem inneren queeren Handwurzelbande (*a*), und an dem großen vielwinklichten Handwurzelbeine (*b*).

— endet sich an dem vorderen Rande (*c*) der inneren Fläche am Mittelhandbeine des Daumens.

— zieht den Daumen einwärts, und gegen die Mitte der flachen Hand, wodurch er also den übrigen Fingern entgegen gestellt wird.

**FIG. IV. vorw. (d.e.f.) DER ZUZIEHER DES MITTELHANDBEINES DES KLEINSTEN FINGERS DER HAND** (*Adductor metacarpi digiti minimi manus*) Synt. T. I. in der rechten Hand *γ*. II. in der linken Hand *ο*. IV. in der linken Hand *m*. VI. in der rechten Hand *τ*.


Er entstehet an dem hackenförmigen Fortsatze des Hackenbeines (*d*) und an dem inneren queeren Handwurzelbande (*e*).

— endet sich an der hinteren Fläche, und dem hinteren Winkel des Mittelhandbeines des Ohrfingers (*f*).

— zieht das Mittelhandbein schief gegen den Daumen, wodurch die flache Hand von dieser Seite etwas hohl gemacht wird.



TAB. VII.



T A B. VII.

FIG. I. rückw. DER ÄUSSERE ELLENBOGENBEINMUSKEL (*Ulnaris externus*) Synt. T. III. im linken Arme N. VI. im linken Arme N; im rechten K.

Er entsteht an dem vorderen Knorren des Armknochens (a), dann an dem oberen Theile der über ihm liegenden Vorderarmscheide (b) bis dahin, wo sie (c) abgeschnitten ist.

— endet sich an der hinteren Seite des Grundstückes vom Mittelhandbeine des kleinsten Fingers (d).

— zieht das Mittelhandbein des kleinsten Fingers ab, und gegen den Rücken der Hand, strecket die Hand aus und zieht sie rückwärts.

FIG. II. rückw. DER GEMEINSCHAFTLICHE AUSSTRECKER DER FINGER DER HAND (*Extensor communis digitorum manus*) Synt. T. III. im linken Arme P. VI. im linken Arme O.

Er entsteht an dem vorderen Knorren des Armknochens (a), und an der Vorderarmscheide (b) bis dahin (c), wo sie abgeschnitten ist.

— gehet in vier Sehnen aus (d), welche sich auf dem Rücken der Hand oft in noch mehrere zertheilen; und durch schief laufende, fehnige Bündel (e) vereinigt werden, dann läuft jede zu ihrem Finger. Die erste vereinigt sich noch besonders mit dem Anzeiger (*Indicator*) dessen Sehne (f) hier abgeschnitten ist, und die vierte verbindet sich mit der Sehne des eigenen Ausstreckers des Ohrfingers (g). Auf dem Rücken des ersten Glied-



Gliedes eines jeden Fingers bilden sie durch ihre Verbindung mit den Sehnen der Regenwurmmuskeln, und Zwischenknochenmuskeln (*b*) eine sehnige Ausbreitung, die, in drey Schenkel gespalten, fortläuft. Der mittlere, der die eigentliche Fortsetzung des allgemeinen Ausstreckers ist, endet sich an dem Rücken des Grundstückes des zweyten Gliedes (*i*); die beyden Seitenschenkel aber, welche die eigentliche Fortsetzung der Regenwurm- und Zwischenknochenmuskeln sind, vereinigen sich auf dem unteren Ende des zweyten Gliedes, und enden sich an dem Rücken des dritten Gliedes (*k*).

— strecket die zweyten, und nach diesen auch die ersten Glieder der Finger aus; wegen der Fortsetzung einiger seiner sehnigen Fasern, und festen Verbindung mit den Regenwurm- und Zwischenknochenmuskeln kann er auch das dritte Glied ausstrecken helfen; die Hand, wenn sie nicht gebogen gehalten wird, streket er ebenfalls aus.

**FIG. II. rückw. B. DER EIGENE AUSSTRECKER DES OHRFINGERS.**  
(*Extensor proprius auricularis*) Synt. T. III. im linken Arme o. VI. im linken Arme o.

Er entstehet mittelst des gemeinschaftlichen Ausstreckers an dem vorderen Knorren des Armknochens (*a*), und an der Vorderarmscheide (*b*) die bey (*c*) abgeschnitten ist.

Auf dem Rücken der Hand vereinigt er seine Sehne mit jener, die von dem gemeinschaftlichen Ausstrecker zum Ohrfinger läuft (*g*), und endet sich mit selber, wie schon gemeldet worden. Nur ist noch anzumerken, daß der hintere Rand der sehnigen Ausbreitung, auf dem Rücken des ersten Gliedes, noch von der Sehne des kleinen Biegers, und Abziehers dieses Fingers (*l*) gebildet werde.

— strecket den Ohrfinger aus, und zieht ihn von den übrigen ab, bieget die Hand, und zieht sie zugleich ein wenig rückwärts.

**FIG. III. rückw. IV. vorw. DER LANGE ABZIEHER DES DAUMENS**  
(*Abductor longus pollicis manus*) Synt. T. I. im linken Arme o; im rechten o. III. im linken Arme w; im rechten m. VI. im linken Arme r.

Er entstehet an dem vorderen Winkel des Ellenbogenbeines (*a*), an der äußeren Fläche der Speiche (*b*), und aus dem Zwischenknochenbände.

— endet sich an dem großen vielwinklichten Handwurzelbeine (*c*), und an der vorderen Gegend des Grundstückes vom Mittelhandbeine des Daumens (*d*); auch setzet sich ein Theil seiner Sehne in dem kurzen Abzieher des Daumens fort, die hier (*e*) abgeschnitten, und bey (T. VI. Fig. II. *b*.) fortgesetzt gesehen werden kann.

— zieht den Daumen von den übrigen Fingern ab, indem er ihn vor und etwas einwärts zieht; die Hand zieht er ebenfalls vorwärts; hilft dem kurzen Abzieher bey seiner Wirkung.

**FIG. V. rückw. DER KLEINERE AUSSTRECKER DES DAUMENS DER HAND** (*Extensor minor pollicis manus*) Synt. T. I. im linken Arme r; im rechten p. III. im linken Arme x; im rechten n. VI. im linken Arme s.

Er entstehet an dem vorderen Winkel des Ellenbogenbeines (*a*) und aus dem Zwischenknochenbände.

— endet sich, nachdem er seine Sehne mit der Sehne des größeren Ausstreckers (*b*) und kurzen Biegers (*c*), die hier abgeschnitten sind, und mit dem kurzen Abzieher (T. VI. Fig. II. *d*.) verbunden hat, an dem Rücken des Grundstückes des ersten und zweyten Gliedes des Daumens (*d*): da aber die Fasern, die zum zweyten Gliede laufen, jene bedecken, die am ersten Gliede sich enden, so können diese hier nicht gesehen werden.

— strecket beyde Glieder des Daumens aus, das Mittelhandbein desselben zieht er von den übrigen Fingern ab, und gerade vorwärts; er zieht die Hand vorwärts, und kann sie auch rückwärts drehen.



**FIG. I. rückw. DER GROESSERE AUSSTRECKER DES DAUMENS DER HAND** (*Extensor major pollicis manus*) Synt. T. III. *im linken Arme z; im rechten o. VI. im linken Arme τ.*

Er entstehet an der äusseren Fläche, und dem Winkel des Ellenbogenbeines (*a*), und aus dem Zwischenknochenbände.

— endet sich, indem er verbunden mit dem kleineren Ausstrecker (*b*), und kurzen Bieger (*c*) dieses Fingers zu dem zweyten Gliede des Daumens läuft, an dem Rücken des Grundstückes desselben (*d*).

— strecket das zweyte und erste Glied des Daumens aus; das Mittelhandbein desselben zieht er vor- und auswärts; auch strecket er die Hand aus, und wenn sie vorwärts gedrehet ist, drehet er sie rückwärts.

**FIG. II. rückw. DER ANZEIGER** (*Indicator*) Synt. T. III. *im linken Arme a; im rechten Arme p. VI. im linken p.*

Er entstehet an der äusseren Fläche und dem Winkel des Ellenbogenbeines (*a*), wie auch aus dem Zwischenknochenbände.

— endet sich, mit der Sehne des allgemeinen Ausstreckers (*b*) vereinigt, an dem zweyten Gliede des Zeigefingers (*c*).

— hat in Rücksicht des Fingers die nämliche Wirkung, wie der allgemeine Ausstrecker; die Hand aber kann er nebst dem Ausstrecken auch noch rückwärts drehen helfen.

**FIG. III. vorw. gewendet. IV. rückw. DER ÄUSSERE LÄNGERE SPEICHENMUSKEL** (*Radialis externus longior*) Synt. T. I. *im rechten Arme f. II. im linken Arme g. III. im linken Arme e; im rechten h. IV. im linken Arme f. VI. im linken Arme l.*

Er entstehet an dem untersten Theile des vorderen Winkels (*a*) und an dem vorderen Knorren (*b*) des Armknochens.

— endet sich an dem Rücken des Grundstückes vom Mittelhandbeine des Zeigefingers (*c*). Von dem Körper dieses Muskels trennet sich ein Theil desselben (*d*), der, durch die ganze Länge von dem übrigen Theile des Muskels getrennet, in eine eigene Sehne ausgeht. Diese Sehne weicht zuweilen ganz von dem äusseren längeren Speichenmuskel ab, und endet sich mit dem äusseren kürzeren Speichenmuskel an dem Grundstücke des Mittelhandbeines vom Mittelfinger; daher dieser Theil von einigen auch der zweyte äussere längere Speichenmuskel (*Radialis externus longior alter*) Synt. T. VI. *im linken Arme κ*, ist genennet worden; am gewöhnlichsten aber verbindet sich seine Sehne unten wieder mit diesem Muskel, und endet sich, vereinigt mit ihm, an dem Mittelhandbeine des Zeigefingers, wie es unsere Figur zeigt.

**FIG. V. vorw. gewendet. VI. rückw. DER ÄUSSERE KÜRZERE SPEICHENMUSKEL** (*Radialis externus brevior*) Synt. T. I. *im rechten Arme g. II. im linken h. III. im linken Arme h. im rechten i. IV. im linken Arme g. VI. im linken Arme m.*


Er entstehet an dem vorderen Knorren des Armknochens (*a*).

— endet sich an dem Rücken des Grundstückes vom Mittelhandbeine des Mittelfingers (*b*).


Beide Speichenmuskeln strecken die Hand aus, und ziehen sie vorwärts. In Rücksicht der Vor- und Rückwärtsdrehung haben sie gleiche Wirkung mit dem langen Rückwärtswender; den Vorderarm helfen sie ebenfalls biegen.



I.




II.



III.



IV.



V.



VI.









TAB. IX.

I.



III.


II.



V.



IV.





**FIG. I.** *vorw.* DER HOCHLIEGENDE MUSKEL (*Sublimis*) Synt. T. I. *im linken Arme M; im rechten L.* III. *im linken Arme L; im rechten S.* VI. *im linken und rechten Arme H.*

Er entstehet an dem hinteren Knorren des Armknochens (*a*) und aus dem hinteren Seitenbande des Ellenbogengelenkes mit einigen Fasern (*b*), welche von diesem Bande (*c*) weggeschnitten sind, dann entstehet er an der Wurzel der Rauigkeit des Ellenbogenbeines (*d*), an der inneren Fläche (*e*) und dem inneren Winkel (*f*) der Speiche.

— gehet in vier Sehnen aus (*g*), wovon jede zu ihren Fingern läuft, wie sie aber gegen das untere Ende des ersten Gliedes kommen, spaltet sich jede in zwey Schenkel (*h*), die sich auf der ausgehöhlten Fläche des Gliedes, und dem inneren Theile der Gelenkkapsel durch kreuzförmig laufende sehnige Fasern (*i*) wieder vereinigen, und endlich an der ausgehöhlten Fläche des zweyten Gliedes (*k*) sich enden.

— bieget die zweyten, dann die ersten Glieder der Finger, und nähert die Finger einander: wenn nichts hindert, bieget er auch die Hand.

**FIG. III.** *vorw.* IV. (*a. b. d. e.*) *rückw.* DER TIEFLIEGENDE MUSKEL (*Profundus*) Synt. T. I. *im linken Arme a.* *im rechten I.* T. II. *im linken Arme N.* III. *im linken Arme I; im rechten a.* IV. *im linken Arme L.*

Er entstehet an der Wurzel der Rauigkeit (*a*) und an der oberen Hälfte der inneren Fläche des Ellenbogenbeines (*b*), wie auch an dem Zwischenknochenbande, und mittelst der sehnigen Scheide aus dem äußeren Winkel des Ellenbogenbeines (*c*).

— zertheilet sich in vier Sehnen (*d*), die in der flachen Hand, bey dem Ursprunge der Regenwurmmuskeln (*f, g*), von einander weichen, und zu ihrem bestimmten Finger laufen, wo jede bey dem ersten Gliede durch die Spalte des hochliegenden Muskels (*Fig. I. l.*) geht, und sich an dem Muskeleindrucke der inneren Fläche des dritten Gliedes (*e*) endet.

— bieget die dritten, dann die zweyten, und auch die ersten Glieder der Finger, indem er zugleich die Finger einander nähert, verstärkt aber auch bey dieser Wirkung die Wirkung der Regenwurmmuskeln; die Hand kann er wie der vorige ebenfalls biegen.

**FIG. III.** *vorw.* (*f. g. b.*) DIE REGENWURMMUSKELN (*Lumbricales*) Synt. T. I. *in der link. Hand z; in der rechten Hand 1. 2. 3. 4.* II. *in der link. Hand R. S. T. U.* *in der link. Hand b.* III. *in der recht. a.* VI. *in der linken Hand 1. 2. 3.*

Der erste entstehet bloß nur aus der Sehne des tiefliegenden Muskels die zum Zeigfinger gehet (*f*); die übrigen aber entstehen sowohl an einer, als der anderen Sehne, zwischen welchen sie liegen (*g*).

Ihre Sehnen wenden sich an dem vorderen Rande der Finger (*h*) auf den Rücken derselben, wo sie sich mit dem allgemeinen Ausstrecker der Finger, und den Zwischenknochenmuskeln verbinden, und sich am Rücken des dritten Gliedes enden, was bey (*Tab. VII. Fig. II. k*) schon angemerkt worden und dort nachzusehen ist.

Sie biegen die ersten Glieder der Finger, und ziehen sie zugleich vorwärts; wegen ihrer Verbindung mit den Ausstreckern können sie das dritte Glied ausstrecken helfen.


**FIG. V.** *vorw.* DER LANGE BIEGER DES DAUMENS DER HAND (*Flexor longus pollicis manus*) Synt. T. I. *im linken Arme o; im rechten M.* II. *im linken Arme M.* IV. *im linken Arme I.* VI. *im linken Arme I; im rechten r.*

Er entstehet an der Wurzel der Rauigkeit (*a*), und an dem ganzen mittleren Theile der inneren Fläche der Speiche (*b*), wie auch an dem Zwischenknochenbande; zu diesem Ursprung kömmt noch ein schmaler Theil, der an dem hinteren Knorren des Armknochens entstehet (*c*).

— endet sich an der inneren Fläche des zweyten Gliedes des Daumens (*d*).

— bieget das zweyte, dann das erste Glied; auch kann er das Mittelhandbein des Daumens gegen die flache Hand, und die Hand selbst biegen.





## TAB. X.

**FIG. I. rückw. II. vorw. DER KURZE RÜCKWÆRTSWENDER**  
(*Supinator brevis*) Synt. T. I. *im linken Arme G; im rechten H. II.*  
*im linken Arme I; im rechten B. III. im rechten Arme L. IV, im linken*  
*Arme H; im rechten B.*

Er entstehet an dem vordern Knorren des Armknochens (*a*), an der Gelenkkapsel des Armgelenkes (*b*), welche hier weggeschnitten ist, und endlich an dem Ellenbogenbeine (*c*).

— endet sich an dem inneren Theile des Halses der Speiche (*d*), an dem vorderen und oberen Theile des Randes ihrer Rauigkeit (*e*) und an der inneren (*f*) vorderen (*g*) und äusseren Fläche (*h*) derselben.

— drehet die Speiche, und mit ihr die Hand rückwärts.

**FIG. III. vorw. IV. seitw. DER VIERECKICHTE VORWÆRTSWENDER**  
(*Pronator quadratus*) Synt. T. I. *im linken Arme P; im rechten N. II.*  
*im linken Arme L; im rechten c. IV. im linken Arme I; im rechten c.*

Er entstehet an jener schiefen Linie des Ellenbogenbeines, die sich von dessen inneren Fläche (*a*) bis zum Grunde des Griffelfortsatzes (*b*) erstreckt.

— ender



- endet sich an der inneren Fläche der Speiche (c).
- drehet die Speiche, und also auch die Hand vorwärts.

**FIG. V. rückw. VI. vorw. DER ABZIEHER DES ZEIGEFINGERS** (*Abductor indicis*) Synt. T. I. in der linken Hand x; in der rechten u. III. in der linken Hand v; in der rechten x. VI. in der linken Hand y.

Er entstehet an der Rückenfläche des großen vielwinklichten Handwurzelbeines (a), an dem Grundstücke des Mittelhandbeines des Daumens (b), und des Zeigefingers (c).

— endet sich größtentheils an der vorderen (d) und äußeren Gegend (e) des Grundstückes vom ersten Gliede des Zeigefingers; er giebt aber auch fehnige Fasern von sich, um die fehnige Ausbreitung auf dem Rücken dieses Fingers ausmachen zu helfen, wie bey dem allgemeinen Ausstrecker der Finger zu sehen ist.

— zieht den Zeigefinger zu dem Daumen, und wenn jener festgehalten wird, den Daumen zu dem Zeigefinger; das erste Glied kann er auch durch seinen inneren Theil biegen, so wie er durch seinen äußeren, und durch die Verbindung mit den Ausstreckern dieses Fingers selbes ausstrecken helfen kann.

**FIG. VII. vorw. DER KURZE BIEGER DES DAUMENS DER HAND** (*Flexor brevis pollicis manus*) Synt. T. I. in der linken Hand v; in der rechten r. II. in der linken Hand p; in der rechten d. IV. in der rechten Hand d; in der linken v. VI. in der rechten Hand n.

Er entstehet an dem Hackenbeine (a) an dem köpfigten (b) und kleineren vielwinklichten (c) Handwurzelbeine.

Bey seinem Ende spaltet er sich in zwey Theile, zwischen welchen die Sehne des langen Biegers des Daumens fortläuft; diese Theile enden sich an dem linsenähnlichen Knochen des Daumens (d); der hintere derselben aber endet sich noch besonders an dem ersten Gliede des Daumens (e), indem er sich auf dessen Rücken wendet, und dann mit den Ausstreckern dieses Fingers verbindet. (T. VIII. Fig. I. c.)

— bieget das erste Glied, und auch das Mittelhandbein des Daumens, indem er letzteres zugleich etwas rück- und einwärts zieht; vermöge seiner Verbindung mit den Ausstreckern hilft er auch diesen bey ihrer Wirkung.

**FIG. VIII. vorw. DER ZUZIEHER DES DAUMENS DER HAND** (*Adductor pollicis manus*) Synt. T. I. in der linken Hand w; in der rechten s. II. in der linken Hand q; in der rechten e. III. in der linken und rechten Hand y. IV. in der linken Hand w; in der rechten e. VI. in der linken Hand w; in der rechten o.


Er entstehet an dem inneren Winkel des Mittelhandbeines des Mittelfingers (a) und an dem Grundstücke des Mittelhandbeines des Ringfingers (b).

— endet sich an dem Grundstücke des ersten Gliedes des Daumens (c).

— zieht den Daumen gerade zu den anderen Fingern, auch bieget er das erste Glied desselben.



TAB. XII.



T A B. XI.

FIG. I. vorw. II. rückw. DIE INNEREN ZWISCHENKNOCHENMUSKELN DER HAND (*Interossei interni manus*) Synt. T. I. in der linken Hand z; in der rechten T, v, c, e. II. in der linken Hand w, z, a. in der rechten F, G, K, M. III. in der linken Hand u, b; in der rechten a, b. IV. in der linken Hand o, q, t, u. VI. in der linken Hand x, i, 3.

Der erste (a. b.) entstehet an der vorderen Fläche des Mittelhandbeines des Zeigefingers (a), und endet sich an dem vorderen Hügel des Grundstückes vom ersten Gliede eben dieses Fingers (b).

Der zweyte (c. d.) entstehet an der hinteren Fläche des Mittelhandbeines des Zeigefingers (c), und läuft an dem hinteren Rande dieses Fingers auf dem Rücken desselben fort, um sich daselbst am dritten Gliede zu enden (d).

Der dritte (e. f.) entstehet an der vorderen Fläche des Mittelhandbeines des Ringfingers (e), und endet sich; da er von dem vorderen Rande dieses Fingers auf dessen Rücken läuft, ebenfalls an dem dritten Gliede des nämlichen Fingers (f).

Der vierte (g. h.) entstehet an der vorderen Fläche des Mittelhandbeines des Ohrfingers (g), und endet sich auf gleiche Art wie der vorige auf dem Rücken des dritten Gliedes des Ohrfingers (h).



**FIG. III. rückw. IV. vorw. DIE ZWEYKOEPPFIGEN, oder ÆUSSEREN ZWISCHENKNOCHENMUSKELN DER HAND** (*Interossei manus bicipites, seu externi*) Synt. T. I. in der linken Hand z; in der rechten a, b, d: II. in der linken Hand v, x, y; in der rechten h, i, l. III. in der linken Hand r, s, t; in der rechten u, v, w. IV. in der linken Hand p, r, s. VI. in der linken Hand 2.

Der erste (*a. c. e.*) entstehet an der hinteren Fläche (*a*) und dem hinteren Winkel (*b*) des Mittelhandbeines des Zeigefingers, wie auch an der vorderen Fläche (*c*) und dem vorderen Winkel (*d*) des Mittelhandbeines des Mittelfingers; läuft von dem vorderen Rande des Mittelfingers, auf dessen Rücken und endet sich an dem dritten Gliede desselben (*e*).

Der zweyte (*f. g. e.*) entstehet sowohl an der hinteren Fläche (*f*) und dem hinteren Winkel (*d*) des Mittelhandbeines des Mittelfingers, als auch an der vorderen Fläche (*g*) und dem vorderen Winkel (*b*) des Mittelhandbeines des Ringfingers; läuft an dem hinteren Rande des Mittelfingers, und endet sich, vereinigt mit dem vorigen, an dem dritten Gliede (*e*) des Mittelfingers.

Der dritte (*i. k. m.*) entstehet an der hinteren Fläche (*i*) und dem hinteren Winkel (*b*) des Mittelhandbeines des Ringfingers, wie auch an der vorderen Fläche (*k*) und dem vorderen Winkel (*d*) des letzten Mittelhandbeines; läuft von dem hinteren Rande des Ringfingers auf den Rücken desselben fort, um sich an dem dritten Gliede (*m*) zu enden.

Die inneren sowohl, als die äusseren Zwischenknochenmuskeln biegen die ersten Glieder der Finger, wenn sie schon etwas gebogen sind: wegen ihrer Verbindung (*n*) mit den Ausstreckern können sie die dritten, und zweyten Glieder ausstrecken. Einzeln wirkt jeder dergestalt, daß er den Finger, an welchem er sich endet, nach seiner Seite zieht, und daher ziehen die vorderen die Finger vorwärts, die hinteren aber selbe rückwärts.

---

## SEHNIGE MUSKELSCHIEDEN DER OBEREN GLIED- MASSEN.

Ueber die Muskeln, welche das Schulterblatt, und den oberen Theil des Armes bedecken, ist eine dünne sehnige Scheide gezogen, die nicht nur alle diese Muskeln zugleich überzieht, sondern sich auch zwischen selbe eindringet, um einige von ihnen auch einzeln einzuschließen: sie überzieht daher den Deltamuskeln, den unbedeckten Theil des Untergräthen- und kleinen runden Muskels, dringet sodann zwischen selbe ein, und verbindet sich mit einer ähnlichen Scheide, die vorwärts den Unterschulterblattmuskeln, die Sehne des breitesten Rückenmuskels, und den großen runden Muskel bedeckt, und zwischen selbe eindringet. Mit die-  
fer




fer Scheide vereinigt, bildet sie durch ihre Fortsetzung die Scheide des Armes, welche die Muskeln, die um den Armknochen liegen, bis zu dem Ellenbogen einschließet. Die Armscheide erhält fehnige Verstärkungen von der Sehne des breitesten Rücken - Brust - vorderen Säge - und Delta - muskels, durch welche Muskeln sie auch gehörig angespannet werden kann: auch diese dringet zwischen jede zwey Muskeln ein, um sie von einander abzufondern: besonders befestiget sie sich an dem vorderen und hinteren Winkel des Armknochens, um wahre Scheidewände zwischen den Muskeln der inneren und äußeren Gegend des Armes zu bilden, die man Zwischenmuskelbänder (*Ligamenta intermuscularia*) nennet, und aus welchen diese Muskeln auch zum Theil entstehen. Weit stärker wird diese Scheide, da sie über den Ellenbogen fortgesetzt wird, und den Vorderarm erreicht, wo sie dann die Vorderarmscheide genannt wird. Diese wird nicht nur von der Fortsetzung der Armscheide, und ihren eigenen fehnigen Fasern gebildet, sondern sie wird auch an der inneren Gegend von der Fortsetzung der fehnigen Ausbreitung des zweyköpfigen und inneren Armmuskels, an der äußeren Gegend aber von der fehnigen Ausbreitung des dreyköpfigen Armmuskels zusammengesetzt, durch welche Muskeln sie auch nach oben zu angespannet wird. Einige Vorderarmsmuskeln werden noch außer dieser Scheide aus- und rückwärts durch eine andere fehnige Scheide eingeschlossen, welche, von der vorigen bedeckt, auswärts an dem vorderen Knorren des Armknochens, und dem vorderen Theile des Höckerfortsatzes, rückwärts aber an dem hinteren Knorren des Armknochens, dem hinteren Theile des Höckerfortsatzes und an dem äußeren Winkel des Ellenbogenbeines entstehet. Diese Scheide bildet auswärts zwischen dem äußeren kurzen Speichenmuskel und dem gemeinschaftlichen Ausstrecker der Finger, dann zwischen dem letzteren und dem äußeren Ellenbogenbeinmuskel, und endlich zwischen dem äußeren Ellenbogenbeinmuskel, und dem Ellenbogenmuskel eben so viele Scheidewände: aus welchen diese Muskeln zum Theile entspringen, und woraus ein gemeinschaftlicher Kopf dieser Muskeln entstehet: rückwärts bildet sie auch Scheidewände, welche aber zwischen dem runden Vorwärtswender, und dem inneren Speichenmuskel, dann zwischen dem letzteren, und dem langen flachen Handmuskel, wie auch zwischen diesem, und dem oberen Theil des inneren Ellenbogenbeinmuskels, und endlich zwischen dem oberen Theile des letzteren, und dem des hochliegenden Muskels liegen. Diese Scheidewände werden mit den ebenerwähnten, aus ihnen zum Theil entstandenen, Muskeln, zusammen als der gemeinschaftliche Kopf der letzteren betrachtet. Endlich läuft diese Scheide frey von den Muskeln abwärts, und ihre Fasern verlieren sich bey dem unteren Ende des Vorderarmes in den daselbst befindlichen Muskelbändern.





I.

II.





## T A B. XII.

### FIG. I. II. *vorw.* (A) DIE SEHNIGE AUSBREITUNG DER FLACHEN HAND (*Aponeurosis palmaris*).

Sie entstehet größtentheils an dem inneren Queerbande der Handwurzel (a), ferner, wenn der lange Flachehandmuskel sich vorfindet, aus der Verlängerung seiner Sehne (b) die sich zum Theil strahlenförmig in diese Ausbreitung endet; mangelt aber der lange Flachehandmuskel, so erhält sie sehnige Verstärkungsfasern von dem inneren Speichen- und Ellenbogenbeinmuskel; auch verlängern sich einige Fasern von dem inneren Armbande in dieselbe. Von diesem ihrem Ursprunge läuft sie gegen die Finger, indem sie sich in ihrem Fortgange immer mehr ausbreitet, und gegen die Köpfe der Mittelhandbeine der vier Finger in eben so viele deutlich unterschiedene Bündel abtheilet (c); gegen den Daumen aber verbreitet sie sich nur in der Gestalt einer sehnigen Scheide über die kurzen Abzieher desselben (d). Die vier Bündel, welche zu den Fingern gehen, werden durch querlaufende sehnige Fasern, welche sich vom Zeigefinger bis zum kleinen Finger hinerstrecken, und vom Weitbrecht Queerbänder der flachen Hand (*Ligamenta palmaria transversa*) genennet werden (e), mit einander verbunden. Auf der vorderen Gegend des ersten Fingergelenkes verlieren sie sich zum Theile in die Haut (f); an beyden Seiten aber geben sie Fasern von sich (g), die sich tiefer gegen die Mittelhandknochen sowohl an dem inneren Winkel und an den rauhen Hügeln des Mittelhandbeines, als auch an den rauhen Hügeln des ersten Gliedes der Finger enden. Eben dafelbst verlieren sich einige Fasern in die Haut (h).

Der Nutzen dieser Ausbreitung ist die unter ihr liegenden Muskeln, und andere Theile zu beschützen, die Hand durch ihre Anspannung flach, und dadurch zu manchen Geschäften tauglicher zu machen.

### FIG. I. II. *vorw.* (B) DAS INNERE ARMBAND (*Ligamentum armillare internum*).

Dieses Band ist eigenthümlich das verstärkte Ende des inneren Theiles der Vorderarmscheide; es entstehet an dem Ellenbogen (i) und an dem erbsenähnlichen Beine (k) umschlinget sodann die Sehnen jener Muskeln, welche bey dem unteren Ende des Vorderarmes zur Handwurzel laufen, (die Sehne des langen Flachehandmuskels allein ausgenommen) bedeckt die Sehne des inneren Speichen- und Ellenbogenbeinmuskels wiewohl nur schwach, und endet sich theils an der Speiche (l), theils aber setzen sich seine Fasern über die Scheide der Sehnen des langen Abziehers und kleineren Ausstreckers des Daumens in dem äußeren Theile der Vorderarmscheide fort (T. XIV. Fig. I. 7.). Das nämliche Band erhält an seinem unteren Rande von dem erbsenähnlichen und kahnähnlichen Handwurzelbeine Verstärkungen, wodurch es sich genau mit dem inneren Queerbande der Handwurzel verbindet, und ist nur durch ihre Schwäche von diesem unterschieden.

FIG. II. A. *Supinator longus*. B. *Pronator teres*. C. *Radialis internus*. D. *Palmaris longus*. E. *Sublimis*. F. *Radialis externus longior*. G. *Flexor longus pollicis*. H. *Pronator quadratus*. I. *Abductor longus pollicis*. K. *Extensor minor pollicis*. L. *Ulnaris internus*. M. *Palmaris brevis*. N. *Abductor digiti minimi*. O. *Flexor parvus digiti minimi*. P. *Abductor brevis pollicis*. Q. *Opponens pollicis*. R. *Flexor brevis pollicis*. S. *Adductor pollicis*. T. *Abductor indicis*.



**FIG. I. vorw. (A) DAS INNERE QUEERBAND DER HANDWURZEL***(Ligamentum transversum carpi internum).*

Dieses Band befestigt sich an dem hakenähnlichen Fortsatze des Hakenbeines (a), von welchem es quer über die tiefe Furche der Handwurzel läuft, und endet sich an der Rauigkeit des großen vielwinklichten Beines (b); an der Aushöhlung des kahnähnlichen Beines aber befindet sich eine bänderige Scheide (c), die größtentheils von der Fortsetzung dieses Bandes gebildet wird, und durch welche die Sehne des inneren Speichermuskels durchgeht. Durch die Verwicklung der sehnigen Fasern jener Muskeln, die aus diesem Bande entstehen, und der Bänder, die das erbsenähnliche Bein an dasselbe anheften, wird dessen Stärke um vieles vermehret.

Der Nutzen dieses Bandes, in Rücksicht der Muskeln ist, die Sehnen der Biegemuskeln, bey der Biegung der Hand, in der Furche der Handwurzel zu erhalten, damit sie nicht empor steigen, und zu ihrer Verrichtung untauglich werden: nebstbey ist selbes auch der Ursprung der kleinen Muskeln des Daumens, und Ohrfingers

**FIG. I. vorw. II. seitw. DIE BÄNDER DER BIEGEMUSKELN.**

Die Sehnen der Biegemuskeln der Finger werden bey jedem Gelenke des Fingers durch einen (d), oder zwey (e) bänderige Ringe (*annuli ligamentosi*) eingeschlossen, die sich an den Gelenkhügeln der Glieder des Fingers befestigen, von einer Befestigung zu der anderen aber auch einige Fasern unter der Sehne fortsetzen (f), um dadurch einen ganzen Ring auszumachen. An die Körper der zwey ersten Glieder werden sie Erstens durch die Scheidebänder (g) (*Ligamenta vaginalia*) angehalten, die von einem Rande des Körpers der Glieder (h) zu dem anderen eben dieses Gliedes (i) laufen, und also die Sehnen bedecken, wodurch sie, verbunden mit der Aushöhlung des Knochens, einen Kanal bilden. Zweytens werden sie an die Körper der Glieder, durch die Kreuzbänder (*ligamenta cruciata*) angehalten, wovon das bey dem ersten Gliede (k) aus zwey schiefen, sich überkreuzenden Bündeln bestehet, die bey dem unteren Rande des Scheidebandes (l) entstehen, und an den Hügeln des zweyten Fingergelenkes (m) sich enden; das Kreuzband am zweyten Gliede aber (n), bestehet gewöhnlich nur aus einem schief laufenden Bündel, das nur zuweilen nach oben (o) oder unten (p) einen Schenkel von sich gibt, wodurch selbes einigermaßen dem vorigen ähnlich wird. Die Sehne des langen Biegers des Daumens erhält nur bey dem Gelenke, zwischen dem Mittelhandbeine und dem ersten Gliede, einen bänderigen Ring (q), der durch das Ende des Zuziehers des Daumens verstärkt wird, dann ein schief lauffendes Bündel, welches von der hinteren Gegend des ersten Gelenkes (r) zu der vorderen des zweyten (s) herabsteiget, bey diesem aber sich mit querliegenden Fasern verbindet, die auch daselbst gleichsam ein Ringband (t) bilden. Ueber alle diese Bänder ist eine dünne Haut gezogen, welche sowohl die Bänder aneinander heftet, als auch zwischen einem und dem anderen Bande dem Kanal ergänzt, und daselbst dem Ausfluß des schlüpfrigmachenden Schleimes verhindert.

Durch diese gesagten Bänder werden die Sehnen in ihrer gehörigen Lage erhalten, damit sie nicht durch ihre Abweichung die Finger verunstalten, und zu verschiedenen Verrichtungen untauglich machen.

In dem ersterwähnten Kanal sind die Sehnen des hochliegenden, und tiefen Muskels durch die Falten ihrer Scheidehaut an den Fingern angeheftet; die Sehnen des ersten durch eine oder mehrere fadenähnliche Falte (u) an dem Körper des ersten Gliedes, durch eine kürzere (w) an dem zweyten Gelenke; die Sehnen des anderen durch ähnliche Fäden (x) an dem Körper des zweyten Gliedes, und durch eine kürzere (y) an dem dritten Gelenke.






FIG. I. A. Supinator longus. B. Radialis internus. C. Palmaris longus. D. Sublimis. E. Ulnaris internus. F. Flexor longus pollicis manus. G. Profundus. H. Pronator quadratus. I. Adductor pollicis. K. Flexor brevis pollicis. L. Abductor longus pollicis. M. Extensor minor pollicis. N. Radialis externus longior. O. Abductor indicis. P. Interossei externi manus. Q. Interossei interni. R. Lumbricales. S. Adductor metacarpi digiti minimi manus. T. Flexor parvus digiti minimi. U. Abductor digiti minimi.

FIG. III. A. Supinator longus. B. Radialis internus. C. Sublimis. D. Flexor longus pollicis manus. E. Radialis externus longior alter. F. Radialis externus longior. G. Radialis externus brevior. H. Ulnaris externus. I. Extensor communis digitorum manus. K. Indicator. L. Extensor proprius auricularis. M. Abductor longus pollicis. N. Extensor minor pollicis. O. Extensor major pollicis. P. Abductor brevis pollicis. Q. Opponens pollicis. R. Adductor pollicis. S. Abductor indicis. T. Interossei interni. U. Lumbricales. V. Sublimis et Profundus.

FIG. IV. A. Radialis internus. B. Palmaris longus. C. Sublimis. D. Ulnaris internus. E. Pronator quadratus. F. Opponens pollicis. G. Abductor brevis pollicis. H. Flexor brevis pollicis. I. Adductor pollicis. K. Flexor longus pollicis. L. Palmaris brevis. M. Flexor brevis digiti minimi manus. N. Abductor digiti minimi. O. Abductor ossis metacarpi digiti minimi. P. Ulnaris externus.










I.



II.





## T A B. XIV.

**FIG. I. II. rückw. DAS ÄUSSERE ARMBAND (*Ligamentum arvillare externum*).**

Dieses Band, welches aus mehreren Schichten bestehet, ist so gestaltet, daß es die Sehnen der Muskeln, welche von dem Rücken des Vorderarmes zur Hand laufen, sowohl alle zusammen, als auch einzeln einschließet. Die äußere Schichte entstehet an der inneren (Tab. XII. Fig. I. n.) und vorderen Gegend des unteren Endes der Speiche (a. und T. XIII. Fig. III. a.) von welcher das Band schief abwärts läuft, und sich sodann theils an dem fünften Mittelhandbeine (b. und T. XIII. Fig. IV. a.), und an dem hinteren Theile des unteren Endes des Ellenbogenbeines (c. und T. XIII. Fig. IV. b.) endet, theils aber über dem hinteren Rand der Handwurzel seine Fasern zu dem erbsenähnlichen Beine (T. XIII. Fig. IV. c.) fortsetzet. Die inneren Schichten aber befestigen sich an jeder rauhen Linie, die sich zwischen den Furchen der Speiche, und des Ellenbogenbeines, in welchen die Sehnen dem Rücken der Hand zulaufen, befindet: dadurch werden vor diese Sehnen wahre Scheiden gebildet, deren man sechs findet. Die erste (d) enthält die Sehnen des langen Abziehers (A) und kleineren Ausstreckers (B) des Daumens; die zweyte (e) die Sehnen der äußeren Speichenmuskeln (C. D); die dritte (f) enthält die Sehne des größeren Ausstreckers des Daumens (E); die vierte (g) die Sehnen des gemeinschaftlichen Ausstreckers der Finger (G), und des Anzeigers (F); die fünfte (h) die Sehne des eigenen Ausstreckers des Ohrfingers (H), und endlich die sechste (i) enthält die Sehne des äußeren Ellenbogenbeinmuskels (I). Von diesem Bande verlängert sich ferner über den Rücken der Hand eine sehnige Haut (k) die sich bey dem hinteren Rande der Hand an das Mittelhandbein des kleinen Fingers befestiget, daselbst aber auch dem Abzieher dieses Fingers seine Scheide verschaffet; gegen den Daumen hingegen verlieret sie sich, nachdem sie den Abzieher des Zeigefingers überstiegen, und die ausstreckenden Sehnen des Daumens besonders eingeschlossen hat, in die sehnige Scheide der kleinen Muskeln des Daumens.

Durch das äußere Armband werden die obenangeführten Sehnen gehörig in den Furchen der Speiche, und des Ellenbogenbeines erhalten, und dadurch sowohl das Abgleiten, als auch das Emporsteigen derselben bey Ausstreckung der Hand verhindert.

Die Sehnen der ausstreckenden Muskeln der Finger werden auf dem Rücken des ersten Fingergelenkes, und des ersten Gliedes hinreichend von den sehnigen Ausbreitungen, die auf diesen Gegenden sich finden, festgehalten, indem selbe diese Sehnen sowohl an den inneren, als auch an den äußeren Rand jedes Fingers fest andrücken, und ihre Abweichung bey den Bewegungen dieses Gelenkes verhindern.

**FIG. I. A. Abductor longus pollicis. B. Extensor minor pollicis. C. Radialis externus longior. D. Radialis externus brevior. E. Extensor major pollicis. F. Indicator. G. Extensor communis digitorum. H. Extensor proprius digiti auricularis. I. Ulnaris externus. K. Ulnaris internus. L. Sublimis. M. Abductor digiti auricularis. N. Interosseus externus tertius. O. Interosseus externus secundus. P. Interosseus externus primus. Q. Interosseus internus primus. R. Abductor indicis. S. Flexor brevis pollicis. T. Adductor pollicis. V. Lumbricales & interossei.**



**FIG. I. vorw. II. seitw. DER ÄUSSERE SCHIEFE BAUCHMUSKEL***(Obliquus externus abdominis)* Synt. T. I. im Stamme D. III. G. VI. H.

Er nimmt seinen Ursprung an den untern Rändern der acht untersten Rippen, an deren vorderen Enden (5—12).

— endet sich an der vorderen Fläche des sechsten und siebenten Rippenknorpels (6—7), und des Schwertknorpels (*a*), dann mittelst einer fehnigen Ausbreitung an der weissen Bauchlinie (*b*), welche durch die Vereinigung und Durchkreuzung der Fasern der fehnigen Ausbreitungen des schiefen äusseren, inneren und queeren Bauchmuskels erzeugt wird, in dessen Mitte man das Nabelloch (*c*) findet, welche Oeffnung bey Erwachsenen mit einer fehnigt-bänderichten Masse ausgefüllt ist; ferner theilet sich in der Weichengegend die fehnige Ausbreitung in zwey Schenkel, welche eine dünne Sehne (*d*) zum Theil vereinigt; der innere davon, indem er sich auf der Vereinigung der Schaambeine mit dem von der andern Seite kommenden kreuzet, endet sich am Schaambeine der entgegengesetzten Seite (*e*); der äussere aber befestiget sich an dem Vereinigungsknorpel (*f*). Die aus dieser Theilung entstandene Spalte wird der Bauch- oder Weichenring (*annulus abdominalis*, s. *inguinalis*) (*g*) genannt; endlich befestiget er sich an der äussern Lefze des vorderen Theils vom Darmbeinskamme (*h*), bis zu dessen vorderen oberen Dorn, von welchem der bis zum Schaambeine verdickte und gespannte fehnige Rand der Ausbreitung unter dem Nahmen des Fallopischen, oder Poupartischen Bandes (*Ligamentum Fallopi*, s. *Poupartii*) (*i*) bekannt ist. Die Gegend (*l*) zwischen dem Anfange der fehnigen Ausbreitung, sowohl dieses als des inneren schiefen (Fig. IV. VI. *d*.) und queeren Bauchmuskels (T. XVI. Fig. I. II. *c*.), und zwischen dem äusseren Rande des geraden Bauchmuskels (*k*), wird die halbmondförmige Linie des Spigels (*Linea semilunaris Spigellii*) genennet.

— drehet die Seite der Brust, an welcher er sich befindet, vorwärts, bieget sie auch vor- und seitwärts, und spannet bey aufrechter Stellung die Schenkelscheide vorwärts an.

**FIG. III. rückw. DER HINTERE UNTERE SÄGEMUSKEL (*Serratus posticus inferior*)** Synt. T. III. im Stamme P.

Er entstehet, verbunden mit der Sehne des breitesten Rückenmuskels, an den Stachelfortfätzen der drey untersten Rückenwirbel (10—12), und der drey bis vier obersten Lendenwirbelbeine (1—3), dann mit einer ähnlichen fehnigen Ausbreitung die sich mit der vorigen verbindet, an den Queerfortfätzen der Lendenwirbelbeine.

— endet sich an dem untern Rande der vier letzten Rippen, nahe an ihren Knorpeln (9—12).


— zieht die Rippen, an die er sich anheftet, rück- und abwärts.

**FIG. IV. vorw. V. rückw. VI. seitw. DER INNERE SCHIEFE BAUCHMUSKEL (*Obliquus internus abdominis*)** Synt. T. I. im Stamme N. II. D. III. G.

Er entstehet mit einer fehnigen Ausbreitung an den Stachelfortfätzen der untersten drey Lendenwirbelbeine (3—5) und des heiligen Beines (*a*), dann




I.




II.



III.



IV.




V.



VI.







192 637

---

dann durch eine fehnige Ausbreitung aus den Queerfortfätzen der untersten Lendenwirbelbeine: ferner aus dem Kamme des Darmbeines durch dessen ganze Länge, vom hinteren (*b*) bis zum vorderen Dörne (*c*).

— endet sich an den Knorpeln der drey untersten Rippen (10—12) fleischigt, an dem achten und neunten Rippenknorpel aber in eine fehnige Ausbreitung (8. 9.), die sich alsdann in ein vorderes, und hinteres Blatt zertheilet. Das vordere (*d*), welches man hier abgeschnitten sieht, läuft über den geraden Bauchmuskel, und verbindet sich fest mit der hinteren Fläche der fehnigen Ausbreitung des äußeren schiefen Bauchmuskels, mit welcher es sich an der weißen Bauchlinie, nach der ganzen Länge derselben, endet; einige Queerfingerbreit unter dem Nabel übersteiget es den unteren Theil der fehnigen Ausbreitung des queeren Bauchmuskels, (Tab. XVI. Fig. I. II. *e*.) und verbindet sich mit demselben. Das hintere Blatt (*e*), hingegen welches sich nur einige Queerfingerbreit unter dem Nabel erstreckt, läuft, verbunden mit dem oberen Theile der fehnigen Ausbreitung des queeren Bauchmuskels (Tab. XVI. Fig. I. II. *d*.) unter dem geraden Bauchmuskel und endet sich an dem Knorpel der siebenten und achten Rippe (7—8), an dem schwertförmigen Knorpel (*g*), und an der weißen Bauchlinie. Vorne unterwärts verbindet er sich genau mit dem pouparti-schen Bande, und läßt in dieser Gegend Fleischfasern von sich, die, vereinigt mit einigen Fasern des queeren, und äußeren schiefen Bauchmuskels, den HÄNGEMUSKEL DER HODE (*Cremaster*) (*A*) bilden. Dieser letztere bedeckt den Saamenstrang und steigt mit selben durch den Bauchring in den Hodensack, wo er sich an der Scheidehaut der Hode endet (*f*).

— drehet die Brust schief seit- und rückwärts, und verstärket durch seine Anspannung die Wirkung des Hängemuskels, welcher die Hode zu dem Bauchringe aufwärts hebet: wenn er mit dem äußern schiefen Bauchmuskel, mit dem er sich an der Seite des Stammes kreuzet, zusammen wirkt, so zieht er die Brust gerade zur Seite.

---



## T A B. XVI.

**FIG. I. vorw. II. seitw. III. rückw. DER QUEERE BAUCHMUSKEL, (*Transversus Abdominis*) Synt. T. II. im Stamme c. IV. r.**

Er entspringet mit zackichten Sehnen aus den Queerfortsätzen der vier oberen Lendenwirbel (1 — 4) und des letzten Rückenwirbelbeines (12): dann aus dem ganzen untern Rande der letzten falschen Rippe (12): ferner aus der fehnigen Ausbreitung des über ihm liegenden inneren schiefen Bauchmuskels (a), aus der inneren Lefze des Kammes am Darmbeine (b), und endlich aus der inneren Fläche der Knorpel und der vorderen Enden der sieben untersten Rippen (6 — 12): der obere Theil dieses Muskels (6.f.) verbindet sich genau mit dem unteren Theile des dreyeckichten Brustbeinmuskels (5—f und T. XXIII. b. 5).

— endet sich an dem Seitenrande des schwertförmigen Knorpels (f), in eine fehnige Ausbreitung, die sich unter dem Nabel spaltet. Der Theil dieser Ausbreitung ober der Spalte läuft unter dem geraden Bauchmuskel, wo dessen unterer Rand, nebst dem ähnlichen des hinteren Blattes des inneren schiefen Bauchmuskels, von einigen die halbkreisförmige Linie des Douglafs (*Linea Semicircularis Douglassi*) (g) genennet wird; der unter der Spalte aber bedeckt den geraden Muskel, um sich zuletzt an der weißen Bauchlinie zu enden.

Mit seinem gleichnamigen Muskel wirkend, bringet er die Rippen einander näher, das ist, die linken zu den rechten.

**FIG. IV. vorw. DER GERADE BAUCHMUSKEL (*Rectus Abdominis*) Synt. T. I. im Stamme o.**

Sein kürzerer Schenkel entstehet aus dem oberen Theile der Knorpelvereinigung der Schaambeine (a), sein längerer aus der Mitte derselben (b).

Er endet sich an dem untern Rande des fünften, sechsten und siebensten Rippenknorpels (5 — 7), und an der Wurzel des Schwertknorpels. In seinem Laufe befestiget er sich durch die fehnigen Streifen (*Inscriptiones s. Intersectiones tendineæ*) (d) an dem vordern Theile seiner Scheide, welche vorwärts aus der fehnigen Ausbreitung des äußeren, dem vorderen Blatte des inneren schiefen, und dem untern Theile der Ausbreitung des queeren Bauchmuskels, rückwärts aber aus dem hinteren Blatte des inneren schiefen, und dem oberen Theile der Ausbreitung des queeren Bauchmuskels zusammengesetzt ist.

Wenn die Muskel des Rückgrades den Stamm aufrecht halten, so ziehet er die Rippen, an die er angeheftet ist, abwärts: er bieget auch die Brust über das Becken vorwärts.

**FIG. V. vorw. DER PYRAMIDENMUSKEL (*Pyramidalis*) Synt. T. I. im Stamme r.**

Er entstehet theils aus der Knorpelvereinigung der Schaambeine, theils aus dem Schaambeine selbst an dessen Rauigkeit (a).



— endet sich an der weißen Bauchlinie (b).

— ziehet die weiße Bauchlinie abwärts, und spannet sie daher an.

### GEMEINSCHAFTLICHE WIRKUNG ALLER BAUCHMUSKEL.

Durch ihre Wirkung drücken sie unmittelbar die Eingeweide der Bauchhöhle, und befördern daher alle Absonderungen und Ausleerungen derselben: ihre Wirkung aber erstrecket sich auch auf die in der Brust enthaltenen Theile, da sie durch das Herabziehen der Rippen und den Druck der Baueingeweide gegen das Zwergfell die Lunge pressen, und also das Ausathmen bewirken.












I.



II.



III.



IV.



V.



VI.




VII.




VIII.



IX.



X.



XI.





## T A B. XVII.

**FIG. I. II. vorw. III. rückw. DER KAUMUSKEL (*Masseter*) Synt. T. I. in Kopfe p. II. in Kopfe e. III. h. IV. b. VI. a.**

Er entstehet an dem Jochfortsatze des Oberkieferbeines (*a*), an der Rauigkeit (*b*) und an dem ganzen unteren Rande (*c*) des Jochbeines, und des Jochfortsatzes am Schlafbeine (*d*), wie auch unter der Jochbrücke aus der Scheide, mit welcher der Schlafmuskel überzogen ist (*e*).

— endet sich an der äußeren Fläche des Winkels (*f*), und der Wurzel des kränenähnlichen Fortsatzes (*g*) am Unterkiefer.

— drückt den unteren Kiefer an den oberen; auch kann er mit seinem inneren Theile den vorwärtsgezogenen Unterkiefer wieder zurückziehen: wenn der Unterkiefer feststeht, ziehet er den Kopf abwärts.

**FIG. IV. vorw. V. rückw. VI. innerw. DER SCHLAFMUSKEL (*Temporalis*) Synt. T. II. im Kopfe d. IV. a.**

Er entstehet an der bogenförmigen Linie des Seitentheiles am Schädel (*a*) an der ganzen Oberfläche der Schlafgrube, und an der Scheide, mit welcher er überzogen ist.

— endet sich an der inneren Fläche (*b*) und an den Rändern (*d*) des kränenähnlichen Fortsatzes am Unterkiefer.

— drückt ebenfalls den unteren Kiefer an den oberen, da er zugleich den Gelenkfortsatz zurück in die Gelenkhöhle zieht.

**FIG. VII. seitw. VIII. unterw. DER ZWEYBÄUCHIGE (*Biventer*) Synt. T. I. im Kopfe w. II. p. IV. c. d.**

Deßsen hinterer Bauch entstehet an dem Warzeneinschnitt (*a*) und verläuft sich in eine Sehne (*b*), die durch eine sehnichte Haut an das Zungenbein befestiget ist; aus eben dieser Sehne entstehet dann der vordere Bauch (*c*) zu dem sich noch einige an dem Grunde des Zungenbeines entstehende Bündeln (*d*) gesellen, und mit welchen er sich an dem untern Rande des Unterkiefers, bey der Vereinigung desselben endet (*e*).

Er eröffnet den Mund sowohl durch schiefe Abziehung des Unterkiefers, als auch durch Rückwärtsbiegung des Kopfes, welches letztere er am meisten bewirkt, wenn man die Abziehung des Unterkiefers verhindert.

**FIG. IX. vorw. XI. (b. c.) unterw. DER ÄUSSERE FLÜGELMUSKEL (*Pterygoideus externus*) Synt. T. II. im Kofe g.**

Er entstehet an der äußeren Fläche des äußeren Gaumenflügelfortsatzes (*a*) und an dem daran stoßenden Theil des Gaumen- und Oberkieferbeines (*b*).

— endet sich an der inneren (*c*) und vorderen Gegend (*d*) sowohl des Halses am Gelenkfortsatze des Unterkiefers, als auch der Gelenkkapsel, und des Zwischenknorpels.

— zieht den Gelenkfortsatz vorwärts aus der Grube unter dem Gelenkhügel des Schlafbeines, wodurch das Kinn auf die entgegengesetzte Seite gezogen wird; zieht zugleich aber auch den Zwischenknorpel vorwärts, und spannet die Gelenkkapsel an, damit sie nicht eingeklemmet werde.

**FIG. X. vorw. XI. (e. f. g.) DER INNERE FLÜGELMUSKEL (*Pterygoideus internus*) Synt. T. III. im Halfe k. IV. e. V. a. VI. r.**

Er entstehet an der inneren Fläche des äußeren Flügelfortsatzes (*e*) an dem Flügeltheile des Gaumenbeines, und an dem Oberkieferbeine (*f*).

— endet sich an der inneren Fläche des Winkels am Unterkiefer (*g*).

— zieht den Unterkiefer zu dem Oberkiefer, und etwas schief gegen die andere Seite.



## T A B. XVIII.

**FIG. I. vorw. II. rückw. DER BRUST SCHLÜSSELBEIN WARZEN MUSKEL** (*Sterno Cleidomastoideus*). Synt. T. I. *im Halfe* A. III. N. VI. w

Er entstehet an der äußeren Fläche des oberen Stückes vom Brustbeine bey dessen oberem Rande (a), dann aus dem oberen Rande des vorderen Endes vom Schlüsselbeine (b).

— endet sich an dem ganzen Umfange des Warzenfortsatzes (c) und an der oberen bogenförmigen Linie des Hinterhauptbeines (d).

— bieget den Kopf vorwärts und gegen seine Seite; und drehet ihn so, daß das Gesicht nach der entgegengesetzten Seite gekehret wird: wenn der Kopf feststehet, hebet er das Brust- und Schlüsselbein in die Höhe.

**FIG. III. rückw. DER HINTERE OBERE SÄGEMUSKEL** (*Serratus posticus superior*). Synt. T. III. *im Stamme* H. IV. T.

Er entstehet an den Stachelfortsätzen der drey unteren Halswirbelbeine (5—7) und der zwey oberen Rückenwirbelbeine (1, 2) an dem Nackenbande (a), und Zwischenstachelbändern (b).

— endet sich an dem oberen Rande der zweyten, dritten, vierten und fünften Rippe (2—5), dort wo sie sich am meisten vorwärts krümmen.

— hebet die Rippen; an die er sich befestiget, auf: wenn die Rippen fest stehen, drehet er die Halswirbelbeine zur Seite.

**FIG. IV. rückw. DER BÄUSCHCHENÄHNLICHE MUSKEL DES KOPFES** (*Splenius capitis*). Synt. T. III. *im Halfe* a. IV. G. VI. y.

Er entstehet an den Stachelfortsätzen der zwey oberen Rückenwirbelbeine (1, 2) und des untersten Halswirbelbeines (7); dann von dem Nackenbande (a) bis zum Stachelfortsatze des dritten Halswirbelbeines.

— endet sich rück- und seitwärts an dem Warzenfortsatze (b), wie auch an der oberen bogenförmigen Linie des Hinterhauptbeines (c).

— bieget den Kopf zur Seite, und drehet ihn rückwärts.

**FIG. V. rückw. DER BÄUSCHCHENÄHNLICHE MUSKEL DES HALSES** (*Splenius colli*). Synt. T. III. *im Halfe* R. IV. u. VI. z.

Er entstehet an den Stachelfortsätzen des dritten und vierten Rückenwirbelbeines (3, 4).

— endet sich an den Querfortsätzen der drey oberen Halswirbelbeine (1, 3).

— bieget und drehet den Hals zur Seite rückwärts.

**FIG. VI. rückw. VII. seitw. (A) DER ZWEYBÄUCHIGE NACKENMUSKEL** (*Biventer cervicis*). Synt. T. III. *im Halfe* P. IV. F. VI. x

Er entstehet an dem Querfortsatze des dritten, vierten, fünften, sechsten und siebenten Rückenwirbelbeines (3—7), wie auch an dem Stachelfortsatze des ersten Rückenwirbelbeines (1).

— endet sich an der oberen bogenförmigen Linie des Hinterhauptbeines (a)

— bieget den Kopf rückwärts, und drehet ihn zugleich auf die Seite.

**FIG. VI. rückw. VII. seitw. (B) DER DURCHFLOCHTENE MUSKEL** (*Complexus*). Synt. T. IV. *im Halfe* K.

Er entsteht an den Querfortsätzen der oberen drey Rückenwirbelbeine (1—3) und des letzten Halswirbelbeines (7), dann aus der Verbindung der Gelenkfortsätze des dritten, vierten, fünften und sechsten Halswirbelbeines (3—6)

— endet sich an der oberen Grube des Hinterhauptbeines (a), bedeckt von dem vorigen.

— bieget und drehet den Kopf rück- und seitwärts.

**FIG. VIII. rückw. IX. seitw. DER NACKENWARZENMUSKEL** (*Trachelmastoideus*) Synt. T. II. *im Kopfe* o. III. *im Halfe* S. IV. N.

Er entstehet an den Querfortsätzen der drey oberen Rückenwirbelbeine (1—3) und des untersten Halswirbelbeines (7) dann aus der Verbindung der Gelenkfortsätze des dritten, vierten, fünften und sechsten Halswirbelbeines (3—6).


— endet sich an der äußeren Fläche der Spitze des Warzenfortsatzes (a).

— bieget und drehet den Kopf seit- und rückwärts.






IV.




V.



VII.




VI.



VIII.



IX.









TAB. XLX.

I.



II.



III.



IV.



V.



VI.




VII.



VIII.



IX.



X.





## T A B. XIX.

**FIG. I. rückw. DER HINTERE GRÖßERE GERADE KOPFMUSKEL** (*Rectus capitis posticus major*). Synt. T. V. im Stamme F.

Er entstehet an dem Stachelfortsatze des zweyten Halswirbelbeines (2).

— endet sich an der unteren bogenförmigen Linie des Hinterhauptbeines (a).

— bieget und drehet den Kopf zur Seite rückwärts.

**FIG. II. rückw. DER HINTERE KLEINERE GERADE KOPFMUSKEL** (*Rectus capitis posticus minor*). Synt. T. V. im Stamme E.

Er entstehet an der Rauhigkeit des hinteren Halbringes vom ersten Halswirbelbeine (1).

— endet sich unter dem vorigen, mehr einwärts, an der unteren bogenförmigen Linie des Hinterhauptbeines (a).

— bieget den Kopf gerade zurück.

**FIG. III. rückw. DER UNTERE SCHIEFE KOPFMUSKEL** (*Obliquus capitis inferior*). Synt. T. IV. im Halse M. V. im Stamme H.

Er entstehet an dem Stachelfortsatze des zweyten Halswirbelbeines (2).

— endet sich an dem Querfortsatze des ersten Halswirbelbeines (1).

— drehet das erste Halswirbelbein und mit demselben den darauf ruhenden Kopf zur Seite.

**FIG. IV. rückw. DER OBERE SCHIEFE KOPFMUSKEL** (*Obliquus capitis superior*). Synt. IV. im Halse L. V. im Stamme G.

Er entstehet an dem Querfortsatze des ersten Halswirbelbeines (1).

— endet sich an dem äußeren Ende der unteren bogenförmigen Linie des Hinterhauptbeines (a).

— bieget den Kopf gerade zurück.

**FIG. V. vorw. DER GERADE SEITENMUSKEL DES KOPFES** (*Rectus Capitis lateralis*).

Er entstehet an dem Querfortsatze des ersten Halswirbelbeines (1).

— endet sich an dem Drosseladerdorn des Hinterhauptbeines (a).

— bieget den Kopf vorwärts, und ziehet ihn, so viel das Gelenk zuläßt, auf die Seite.

**FIG. VI. und VII. vorw. DER INNERE GRÖßERE GERADE KOPFMUSKEL** (*Rectus capitis internus major*). Synt. T. II. im Halse I.

Er entstehet an dem Querfortsatze des dritten, vierten, fünften und sechsten Halswirbelbeines (3—6).

— endet sich an dem Seitenrande der unteren Fläche des Keilfortsatzes am Hinterhauptbeine (a).

— bieget den Kopf vorwärts und drehet ihn etwas zur Seite.

**FIG. VIII. vorw. DER INNERE KLEINERE GERADE KOPFMUSKEL** (*Rectus capitis internus minor*).

Er entstehet an der vorderen Fläche des Seitentheiles des ersten Halswirbelbeines (1).

— endet sich an dem Muskelhügel des Keilfortsatzes am Hinterhauptbeine (a).

— bieget den Kopf vorwärts.

**FIG. IX. und X. vorw. DER LANGE HALSMUSKEL** (*Longus colli*) Synt. T. II. im Halse K.

Er entstehet an den Körpern der drey oberen Rückenwirbel (a) und der zwey unteren Halswirbelbeine (b), dann aus dem Köpfchen der ersten Rippe (c) und an dem Querfortsatze des dritten, des vierten, fünften und sechsten Halswirbelbeines (d).

— endet sich an den Querfortsätzen der zwey untersten (e) und den Körpern der fünf obersten Halswirbelbeine (f).

— bieget den Hals vorwärts und drehet ihn zugleich auf die Seite.



## T A B. XX.

**FIG. I. und II. rückw. (A) DER ABWÄRTSLAUFENDE NACKENMUSKEL**  
(*Cervicalis descendens*) Synt. T. IV. im Halfe p.

Er entstehet an dem hinteren Ende der zweyten, dritten, vierten und auch zuweilen der fünften und sechsten Rippe (2—6), da, wo diese sich mit den Queerfortsätzen der Rückenwirbelbeine verbinden.

— endet sich an den Queerfortsätze des vierten, fünften und sechsten Halswirbelbeines (4—6).

— bieget und drehet den Hals auf die Seite.

**FIG. I. II. III. IV. rückw. (C) DER LÄNGSTE RÜCKENMUSKEL, und (D) DER HEILIGEBEINLENDENMUSKEL** (*Longissimus dorsi*, & *Sacro-lumbalis*) Synt. T. III. im Stamme l. c. IV. a. z.

Der gemeinschaftliche Kopf (B), aus welchem diese beyde Muskeln entstehen, nimmt seinen Anfang an dem Schwanzhügel (a) und den Stacheln (b) des heiligen Beines, an der Rauigkeit des Darmbeines (c) und an den Stachelfortsätzen der Lendenwirbelbeine (1—5); er endet sich zum Theile an den Queerfortsätzen der Lendenwirbelbeine (Fig. IV. 1-5), zum Theile aber bildet er durch seine Fortsätzung die zwey oben genannten Muskeln.

Außer diesem Anfange entstehet der längste Rückenmuskel noch an den Queerfortsätzen der vier unteren Rückenwirbelbeine (Fig. IV. d); endet sich an den Queerfortsätzen aller Rückenwirbelbeine (Fig. III. IV. e), und an dem hinteren Ende der dritten bis zur zehnten Rippe (Fig. III. 3—10); auch verbindet er sich ganz oben mit einigen Nackenmuskeln, hauptsächlich aber mit dem abwärtslaufenden (Fig. I und III f.). Der Heiligebeinlendenmuskel aber endet sich an den Winkeln aller Rippen (Fig. I und IV. g) durch spitzige Sehnen, die durch neue aus den oberen Rändern der acht unteren Rippen entstehende Fleischbündel (Fig. II. b) verstärkt werden, und hier (Fig. II. i) abgeschnitten sind, weil sie sonst die Fleischbündel bedecken.

Beyde Muskeln, wenn sie zugleich wirken, halten den vorwärts gebogenen Rückgrath, richten ihn auf, und biegen ihn zurück auf die Seite; der Heiligebeinlendenmuskel ziehet noch besonders die Rippen abwärts, welches auch der längste Rückenmuskel, jedoch sehr schwach, bewirket.

**FIG. V. rückw. DER STACHELMUSKEL DES RÜCKENS** (*Spinalis dorsi*) Synt. T. III. im Stamme k. IV. c.

Er entstehet an den Stachelfortsätzen der drey unteren Rücken- (10—12) und der zwey oberen Lendenwirbelbeine (1. 2).

— endet sich an dem Stachelfortsätzen der oberen acht Rückenwirbelbeine (2—8), mit Ausnahme des ersten.

— richtet den vorwärts gebogenen Rückgrath auf, und trägt etwas zu dessen Seitenbiegung bey.


**FIG. VI. VII. rückw. VIII. seitw. DER QUEERMUSKEL DES NACKENS** (*Transversalis cervicis*) Synt. T. III. im Halfe u. IV. o.


Er entstehet an den Queerfortsätzen der fünf oberen Rückenwirbel- (1—5) und den vereinigten Gelenkfortsätzen der vier unteren Halswirbelbeine (a).

— endet sich an den Queerfortsätzen der sechs oberen Halswirbelbeine (1. 6.)

— bieget den Hals seit- und rückwärts.













I.




II.




III.




IV.



V.




VI.



VII.



VIII.





**FIG. I. vorw. DER VORDEEE UNGLEICHDREYSEITIGE MUSKEL**  
(*Scalenus prior*) Synt. T. II. im Halfe N.

Er entstehet an den Queerfortsatze des vierten, fünften und sechsten Halswirbelbeines (4—6).

— endet sich an der äußeren Lefze des inneren Randes der ersten Rippe, nahe an der Verbindung mit ihrem Knorpel (1).

— hebet die erste Rippe auf, und bieget, wenn selbe befestiget ist, den Hals vor- und seitwärts.

**FIG. II. vorw. III. rückw. DER MITTERE UNGLEICHDREYSEITIGE MUSKEL**  
(*Scalenus medius*) Synt. T. I. 1. II. o. IV. a. V. k. VI. a.

Er entstehet an den Queerfortsätzen aller Halswirbelbeine (1—7).

— endet sich an den Queerfortsätzen der zwey unteren Halswirbelbeine (a) und des ersten Rückenwirbelbeines (b), dann an der äußeren Fläche der hinteren Hälfte der ersten Rippe (1).

— wirkt wie der vorige.

**FIG. IV. rückw. DER HINTERE UNGLEICHDREYSEITIGE MUSKEL**  
(*Scalenus posticus*) Synt. T. IV. im Halfe R.

Er entstehet an den Queerfortsatze des fünften und sechsten Halswirbelbeines (5. 6).

— endet sich an der äußeren Lefze des oberen Randes der zweyten Rippe (2), nahe an dessen hinteren Ende.

— hebet die zweyte Rippe auf, und bieget, bey befestigter Rippe, den Hals seitwärts.

**FIG. V. rückw. DER STACHELMUSKEL DES NACKENS** (*Spinalis cervicis*) Synt. T. IV. im Halfe s. V. r.

Er entstehet an den Queerfortsätzen der sechs oberen Rückenwirbelbeine (1—6).

— endet sich an den Stachelfortsätze des zweyten, des dritten, vierten, fünften und sechsten Halswirbelbeines (2—6).

— bieget den Hals zurück, und drehet ihn auf die Seite.

**FIG. VI. rückw. DER HALBSTACHELMUSKEL DES RÜCKENS** (*Semispinalis dorfi*) Synt. T. III. im Stamme s. IV. b. V. s.

Er entstehet an den Queerfortsatze des siebenten, achten, neunten und zehnten Rückenwirbelbeines (7—10).

— endet sich an den Stachelfortsätzen der fünf oberen Rücken- (1—5) und der zwey unteren Halswirbelbeine (6. 7).

— drehet die Wirbelbeine, an denen er sich endet, zur Seite.

**FIG. VII. rückw. EIN KURZER HEBEMUSKEL DER RIPPE** (*Levator brevis costæ*) Synt. T. V. im Stamme M.

Jede Rippe hat einen solchen Muskel, der an dem Queerfortsatze des oberhalb der Rippe liegenden Wirbelbeines (a) entstehet, sich an dem oberen Rande der gleich darauf folgenden Rippe endet (b), selbe befestiget und rückwärts aufhebet. Sie sind an der Zahl zwölf.

**FIG. VIII. rückw. EIN LANGER HEBEMUSKEL DER RIPPE** (*Levator longior costæ*) Synt. T. V. im Stamme N.

Er entstehet an dem Queerfortsatze jenes Rückenwirbelbeines (a), welches das zweyte ober der Rippe ist, die er beweget.

— endet sich an dem hinteren Theile des oberen Randes seiner Rippe (b)

— ziehet die Rippe auf- und rückwärts. Solcher Muskeln sind drey oder vier, zu denen drey oder vier unteren Rippen.



## T A B. XXII.

**FIG. I. vorw. II. seitw. DIE VORDEREN ZWISCHENQUEERMUSKEL DES HALSES** (*Intertransversarii priores colli*). Synt. T. II. L. a.

Jeder aus ihnen entstehet an der oberen Gegend der Wurzel des unterhalb liegenden Querfortsatzes vom Halswirbelbeine (a).

— endet sich an der unteren Gegend des gleich oberhalb liegenden Querfortsatzes (b).

Sie biegen den Hals seitwärts, der erste drehet noch besonders das erste Halswirbelbein zur Seite.

**FIG. III. vorw. DIE HINTEREN ZWISCHENQUEERMUSKEL DES HALSES** (*Intertransversarii posteriores colli*) Synt. T. V. im Halße L.

Es entstehet gleichfalls jeder aus der obern Gegend des unterhalb liegenden Querfortsatzes (a) aber näher gegen die Spitze desselben, und mehr rückwärts.

Jeder endet sich auf gleiche Art wie die vorigen an der unteren Gegend des gleich oberhalb liegenden Querfortsatzes (b).

Sie wirken wie die vorderen.

**FIG. IV. rückw. V. seitw. DIE ZWISCHENSTACHELMUSKEL DES NACKENS** (*Interspinales cervicis*) Synt. T. IV. V. im Halße I.

Jeder entstehet aus der oberen Gegend des unterhalb liegenden Stachelfortsatzes (a).

— endet sich an der unteren Gegend des gleich oberhalb liegenden Stachelfortsatzes (b).

Sie biegen den Hals rückwärts.

**FIG. VI. rückw. DIE ZWISCHENQUEERMUSKEL DES RÜCKENS** (*Intertransversarii dorsi*). Synt. T. V. im Stamme R.

Nur die unteren sind deutlicher, da sie zwischen den oberen Rückenwirbelbeinen mehr für Bänder zu halten sind, und laufen eben von einem Querfortsatze zum anderen.

Sie biegen den Rücken seitwärts.

**FIG. VII. seitw. VIII. rückw. EIN ÄUSSERER ZWISCHENRIPPENMUSKEL** (*Intercostalis externus*). Synt. T. I. L. II. A. III. M. IV. W. V. O.

Jeder dieser Muskeln, deren an der Zahl eilf sind, entstehet an der äusseren Lefze des unteren Randes der oberhalb liegenden Rippe (a), bis auf eine kleine Entfernung von deren Verbindung mit ihrem Knorpel.

— endet sich an dem oberen Rande der unterhalb liegenden Rippe (b).

— bringet die Rippen einander näher.

**FIG. IX. seitw. X. rückw. INNERE ZWISCHENRIPPENMUSKEL** (*Intercostales interni*). Synt. T. I. im Stamme M. II. B. III. N. IV. X. V. P.









Es sind deren ebenfalls eilf, und entstehen an dem unteren Rande der Rippenknorpel (a) und der inneren Lefze des unteren Randes der oberhalb liegenden Rippe (b), bis zu dem Winkel derselben.

Sie enden sich an der inneren Lefze des oberen Randes der darauf folgenden Rippe (c) und Rippenknorpels (d). Es ereignet sich auch, daß einige Fleischbündel dieser Muskel die nächst folgende Rippe übersteigen, und sich dann in der zweyten enden, wie es Fig. XI. (e), von der Brusthöhle anzusehen, darstellt.








Sie haben die nämliche Wirkung, wie die äusseren.















## T A B. XXIII.

### FIG. I. *vorw.* DER DREYECKICHE BRUSTMUSKEL (*Triangularis sterni*).

Er entstehet an der inneren Lefze des Seitenrandes am unteren Stücke des Brustbeines (*a*), an dem sechsten und siebenten Rippenknorpel (6. 7.) und an dem Seitenrande des schwertförmigen Anhanges (*b*).

— endet sich an der inneren Fläche der Knorpeln und der vorderen Enden der dritten, vierten und fünften Rippe (3—5). Der untere Theil dieses Muskels (*b-5* und Tab. XIV. Fig. I. *f-5*) verbindet sich genau mit dem queeren Bauchmuskel.

— zieht genannte Rippen ab und einwärts, oder wenn selbe befestiget sind, hebet er das Brustbein in die Höhe einwärts.

### FIG. II. *rückw.* DIE ZWISCHENQUEERMUSKEL DER LENDEN (*Intertransversarii lumborum*). Synt. T. V. im Stamme x.

Sie entstehen an dem Querfortsatze des einen, und enden sich an dem Querfortsatze des anderen Lendenwirbelbeines, nur der erste endet sich an dem Querfortsatze des letzten Rückenwirbelbeines (12).

Sie nähern die Querfortsätze einander, und biegen daher die Lenden seitwärts.

### FIG. III. *rückw.* IV. *seitw.* DER VIELTHEILIGE MUSKEL DES RÜCKGRATHES (*Multifidus spinæ*) Synt. T. IV. im Stamme d. V. u.

Er entstehet an den vier Seitenerhobenheiten des heiligen Beines (*a*) und an dem hinteren langen Darmbeinsbände und dem Darmbeine selbst, an den Gelenkfortsätzen der Lendenwirbelbeine (*b*), an den Querfortsätzen aller Rückenwirbelbeine (*c*) und den schief absteigenden Fortsätzen der vier bis fünf unteren Halswirbelbeine (*d*).

— endet sich an den Stachelfortsätzen aller Wirbelbeine (*e*). das erste ausgenommen. In den Lenden endigen sich einige Bündel auch an den Gelenkfortsätzen des gleich oberhalb ihrer Entstehung liegenden Lendenwirbelbeines (*f*).

— bieget den Rückgrath seit- und rückwärts.

### FIG. V. *seitw.* EIN ZWISCHENSTACHELMUSKEL DER LENDEN (*Interspinalis lumborum*) Synt. T. IV. im Stamme l. V. w.

Solche sind fünf, sie entstehen von einem Stachelfortsatze, und enden sich an dem anderen des oberhalb liegenden Lendenwirbelbeines.

Sie bringen die Stachelfortsätze einander näher.

Dergleichen sind auch einige in dem unteren Theile des Rückens, die man die ZWISCHENSTACHELMUSKEL DES RÜCKENS (*Interspinales dorsi*) nennet, und die in der Synt. Tab. V. κ. V. v. zu sehen sind.

### FIG. VI. *vorw.* VII. *rückw.* DER VIERECKICHE LENDENMUSKEL (*Quadratus lumborum*) Synt. T. II. im Stamme g. V. y.

Er entstehet an der inneren Lefze des oberen Theiles vom Darmbeinskamme (*a*) an dem Bände, welches zwischen dem Darmbeine und dem Querfortsatze des letzten Lendenwirbelbeines ist (*b*), dann von den Querfortsätzen der oberen Lendenwirbelbeine (*c*).

— endet sich an den Querfortsätzen der vier oberen Lendenwirbelbeine (1—4) und an dem Körper des letzten Rückenwirbelbeines (12), wie auch an dem unteren Rande der letzten Rippe (12).

— zieht die letzte Rippe abwärts und bieget die Lenden seitwärts.



## T A B. XXIV.

### FIG. I. *vorw.* DER KLEINE LENDENMUSKEL (*Psoas parvus*) Synt. T. II. *im Stamme H.*

Er entstehet an dem Körper des letzten Rücken - (12) und ersten Lendenwirbelbeines (1), dann aus dem Bande zwischen dem letzten Rücken- und ersten Lendenwirbelbeine (*a*), und aus dem ähnlichen Bande zwischen dem ersten und zweyten Lendenwirbelbeine (*b*).

— endet sich an dem oberen Rande des Schaambeines, wo selbes sich mit dem Darmbeine verbindet (*c*); wie auch in eine fehnige Ausbreitung, die den großen Lenden- und inneren Hüftmuskel bedeckt, wovon hier der abgeschnittene Rand derselben (*d*) zu sehen ist.

— bieget die Lenden vorwärts, und etwas zur Seite; auch verstärket er durch die Anspannung seiner fehnigen Ausbreitung die Wirkung des großen Lenden- und inneren Hüftmuskels.

### FIG. II. III. *vorw.* V. *rückw.* DER GROSSE LENDENMUSKEL (*Psoas magnus*) Synt. T. I. *im rechten Fusse D.* *im linken F. II. im Stamme I.* III. *im linken Fusse G.* IV. *im Stamme e.* VI. *im linken Fusse c.*

Er entstehet an dem Körper des letzten Rücken - (12) und der vier oberen Lendenwirbelbeine (1—4), wie auch aus den Bändern zwischen diesen Wirbelbeinen (*a*) und an den Querfortsätzen aller Lendenwirbelbeine (*b*).

— endet sich gemeinschaftlich mit dem inneren Hüftmuskel an dem kleinen Umwender des Schenkelbeines (*c*).

— bieget den Schenkel vorwärts in die Höhe, und drehet ihn zugleich auswärts: wenn der Schenkel feststeht bieget er die Lenden und das Becken vorwärts und nach seiner Seite.

### FIG. IV. *vorw.* V. *rückw.* DER INNERE HÜFTMUSKEL (*Iliacus internus*) Synt. T. I. *im linken Fusse G.* *im rechten c.* II. *im Stamme K.* IV. *im Stamme i.*

Er entstehet an der inneren Lefze des Kammes (*a*) und des vorderen oberen Stachels am Darmbeine (*b*) an dem vordern Rande, und der inneren Oberfläche eben dieses Knochens; ferner an dem Querfortsatze des letzten Lendenwirbelbeines (5) und aus dem Bande, welches von diesem Querfortsatze zum Darmbeine läuft (*d*).

— endet sich, vereinigt mit dem großen Lendenmuskel, welches dessen abgeschnittene Sehne (*e*) hier darstellt, an dem kleinen Umwender (*c*).

— hebet den Schenkel vorwärts in die Höhe; oder wenn dieser feststeht, bieget er das Becken vorwärts gegen den Schenkel.

### FIG. VI. *rückw.* DER GROSSE GESÄSSMUSKEL (*Gluteus magnus*) Synt. T. I. A. III. c. VI. G. *im linken Fusse*

Er entstehet an der äußeren Lefze des hinteren Theiles des Darmbeinskammes (*a*), an der Rauigkeit des Darmbeines (*b*), dann an der hinteren Fläche des Heiligen - (*c*) und Schwanzbeines (*d*); auch entstehet er aus jenen Bändern des Heiligen- und Schwanzbeines, welche er bedeckt.

— endet sich an der Rauigkeit des Schenkelbeines, die sich an der hinteren Gegend unter der Wurzel des großen Umwenders befindet (*e*), auch verlieret er sich zum Theil durch einige Fleischbündeln in die Schenkelscheide, und nahe liegende Muskel.

— strecket das Schenkelbein aus, bieget selbes rückwärts in die Höhe, und dreht es auswärts: auch ziehet er einen Schenkel von dem anderen ab. Ist aber der Schenkel festgestellt, so wirket er auf die nämliche Art in Ansehung des Beckens; desgleichen spannet er auch die Schenkelscheide an.


### FIG. VII. *vorw.* DER SPANNMUSKEL DER SCHENKELSCHETDE (*Tensor vaginae femoris*) Synt. T. I. K. III. B. VI. E. *im linken Fusse*

Er entstehet an dem vordern obern Stachel des Darmbeines (*a*).

— endet sich in die fehnige Schenkelscheide (*b*), wovon die Beschreibung nach der Tab. XXXIII. zu finden ist.

— spannet die Schenkelscheide nach oben an.
















## T A B. XXV.

**FIG. I. vorw. II. rückw. DER SCHWANZBEINMUSKEL (*Coccygeus*)**  
Synt. T. III. im Becken A.

Er entstehet an dem Stachel des Sitzbeines (a).

— endet sich an dem Seitenrande des Heiligen - (b) und Schwanzbeines (c)

— hebet das Schwanzbein einwärts in die Höhe, und zieht selbes so viel möglich auf die Seite.

**FIG. III. vorw. IV. rückw. DER MITTLERE GESÄESSMUSKEL (*Gluteus medius*)** Synt. T. I. im linken Fusse I. im rechten A. III. im linken Fusse A. im rechten F. VI. im linken Fusse F.

Er entstehet an der Gegend der äusseren Fläche des Darmbeines, die sich zwischen der äusseren bogenförmigen rauhen Linie, und der äusseren Lefze des Kammes befindet (a), bis zu dem vordern oberen Stachel des Darmbeines (b).

— endet sich an der äusseren Fläche des grossen Umwenders (c).

— ziehet einen Schenkel von dem anderen ab, und hebet ihn rückwärts in die Höhe.

**FIG. V. vorw. DER SCHNEIDERMUSKEL (*Sartorius*)** Synt. T. I. im linken Fusse H. III. im linken Fusse H. VI. im rechten Fusse c. im linken D.

Er entstehet an dem vordern oberen Stachel des Darmbeines (a).

— endet sich an der inneren Seite des Stachels am Schienbeine (b); auch sendet er einige Fasern zu der sehnigen Scheide, womit der Unterschenkel überzogen ist.

— bieget das Knie, alsdann dreht er den Unterschenkel einwärts: den Schenkel erhebet er dergestalt, daß der eine Unterschenkel über den anderen gezogen wird.

**FIG. VI. vorw. VII. seitw. DER GERADE MUSKEL DES UNTERSCHENKELS (*Rectus cruris*)** Synt. T. I. im linken Fusse M. VI. im rechten Fusse A. im linken L.

Er entstehet an dem vorderen unteren Stachel des Darmbeines (a), und an dem oberen Theile des Randes der Gelenkpfanne (b).

— endet sich, vereinigt mit den beyden dicken Muskeln, und mit dem Unterschenkelmuskel, an der vorderen Fläche der Kniescheibe (c), über welche sich auch einige Fasern in das Band der Kniescheibe (d), das sich an dem Stachel des Schienbeines endet (e), verlieren.

— ziehet die Kniescheibe in die Höhe, spannet dessen Band, und strecket dadurch den gebogenen Unterschenkel aus; ist dieser aber befestiget, so richtet er den Schenkel gerade über den Unterschenkel auf: hebet den Schenkel gegen das Becken vorwärts, oder bieget in Gegentheile das Becken vorwärts gegen den Schenkel.



## T A B. XXVI.

**FIG. I.** (*a. b. d.*) *vorw.* II. (*a. c.*) *rückw.* DER ÄUSSERE DICKE MUSKEL (*Vastus externus*) Synt. T. I. im linken und rechten Fusse L. III. im linken Fusse N. im rechten O. VI. im linken Fusse K.

Er entstehet an der Wurzel des grossen Umwenders (*a*), an der vorderen Umwenderslinie (*b*), und an der äusseren Lefze der rauhen Linie des Schenkelbeines (*c*).

— endet sich an der äusseren Hälfte des Grundes der Kniescheibe (*d*), und durch seine fehnige Ausbreitung an dem äusseren Gelenkknorren des Schienbeines; auch gehen davon einige Fasern in die Schenkelscheide.

— strecket den Unterschenkel aus, oder richtet den Schenkel über den Unterschenkel auf; wenn der Unterschenkel aber gebogen gehalten wird, drehet er das Schienbein etwas auswärts.

**FIG. I.** (*e. g.*) *vorw.* II. (*f.*) *rückw.* DER INNERE DICKE MUSKEL (*Vastus internus*) Synt. T. I. im linken Fusse N. im rechten I. III. im linken Fusse I. im rechten T. VI. im rechten Fusse B. im linken M.

Er entstehet an der Wurzel des kleinern Umwenders (*e*) und an der inneren Lefze der rauhen Linie des Schenkelbeines (*f*).

— endet sich an der inneren Hälfte des Grundes der Kniescheibe (*g*), und durch eine fehnige Ausbreitung an den inneren Gelenkknorren des Schienbeines; er sendet ebenfalls einige Fasern zu der Schenkelscheide.

— strecket das Knie aus, wie der vorige.

**FIG. I.** (*b. i.*) *vorw.* DER UNTERSCHENKELMUSKEL (*Cruralis*) Synt. T. I. im rechten Fusse K:

Er entstehet an der vorderen Umwenderslinie (*b*), und an der vorderen Fläche des Schenkelbeines, fast nach der ganzen Länge desselben.

— endet sich zwischen den beyden dicken Muskeln, mit welchen er sich verbindet, an dem Grunde der Kniescheibe (*i*); einige seiner Fasern verlieren sich auch in die Gelenkkapsel.

— wirkt auf den Unterschenkel, wie der vorige; die Gelenkkapsel spannet er aufwärts an, damit sie, wenn man jenen ausstreckt, von der Kniescheibe nicht gequetschet werde.

**FIG. III.** *vorw.* DER SCHLANKE MUSKEL (*Gracilis*) Synt. T. I. im linken Fusse B. im rechten G. II. im linken Fusse D. III. im linken Fusse G. im rechten S. IV. im linken Fusse B. VI. im rechten Fusse D.

Er entstehet an dem inneren Rande des Schaambeines (*a*), bey der Knorpelvereinigung.

— endet sich an der inneren Seite des Stachels am Schienbeine (*b*), auch sendet er einige Fasern in die fehnige Schenkelscheide.

— bieget das Knie, und wenn dieses gebogen ist, so drehet er das Schienbein einwärts: den Schenkel ziehet er zu dem anderen hin.

**FIG. IV.** *vorw.* V. *rückw.* DER KAMMMUSKEL (*Pectineus*) Synt. T. I. im linken, und rechten Fusse E. VI. im linken Fusse B.

Er entstehet an dem Kamme (*a*) und an der Rauhigkeit des Schaambeines (*b*).

— endet sich an der rauhen Linie, die vom kleinen Umwender zu dem Körper des Schenkelbeines herabsteiget (*c*).

— ziehet einen Schenkel zu dem anderen, drehet ihn auswärts, und hebet ihn in die Höhe, oder bieget das Becken gegen den Schenkel herab.

**FIG. VI.** *vorw.* VII. *rückw.* DER KLEINERE GESÄESSMUSKEL (*Gluteus minor*) Synt. T. I. im rechten Fusse B. II. im R. III. f. im Stamme.

Er entstehet an dem ganzen übrigen Theil der äusseren Fläche des Darmbeines, die sich unter der bogenförmigen rauhen Linie befindet (*a*), wie auch zum Theil an dem Sitzbeine.

— endet sich an der vorderen Gegend der Spitze des grossen Umwenders (*b*); doch verlieren sich auch einige seiner Fasern in die Gelenkkapsel.

— hebet dem Schenkel auswärts in die Höhe.




I.




II.




III.



IV.



V.



VI.



VII.












I.



II.



III.



IV.



V.




VI.



VII.




VIII.



X.

IX.





## T A B. XXVII.

**FIG. I. vorw, II. rückw. DER BIRNFÖRMIGE MUSKEL (*Pyriformis*)**  
Synt. T. III. *im rechten Fusse* H.

Er entstehet an der vorderen Fläche des Heiligenbeines (a) und an dem hintern untern Stachel des Darmbeines (b).

— endet sich an der Grube des grossen Umwenders (c).

— rollet den Schenkel aus- und rückwärts, und hebet ihn etwas in die Höhe; ist der Schenkel vorwärts gebogen, so kann er ihn auch von dem anderen abziehen.

**FIG. III. rückw. DIE ZWILLINGSMUSKEL DES SCHENKELS (*Gemini*)**  
Synt. T. III. *im rechten Fusse* I. K.

— Der obere entstehet an dem Stachel des Sitzbeines (a), der untere hingegen an dem Rande des Einschnittes (b), den man zwischen dem Stachel, und der Rauhigkeit des Sitzbeines bemerkt.

Beide enden sich in der Grube des grossen Umwenders (c).

Sie wirken wie der birnförmige Muskel, nur können sie den Schenkel nicht heben.

**FIG. IV. rückw. DER INNERE VERSTOPFER (*Obturator internus*)**  
Synt. T. III. *im rechten Fusse* M. IV. *im Stamme* b.

Er entstehet an der inneren Hälfte des inneren Randes am Verstopfungsloche (a), und an der hinteren Fläche des Verstopfungsbandes.

Das Ende (b), und die Wirkung ist wie bey dem vorigen.

**FIG. V. vorw. VI. rückw. DER VIERECKICHTE SCHENKELMUSKEL (*Quadratus femoris*)** Synt. T. III. *im rechten Fusse* N.

Er entstehet an dem äusseren Rande der Rauhigkeit des Sitzbeines (a).

— endet sich an der hinteren Umwenderslinie (b).

— rollet den Schenkel rückwärts, und ziehet ihn zu dem andern hin.

**FIG. VII. vorw. VIII. rückw. DER LANGE ZUZIEHER DES SCHENKELS (*Adductor longus femoris*)** Synt. T. I. *im linken Fusse* D. *im rechten* F. VI. *im linken Fusse* A.

Er entstehet an der Knorpelvereinigung der Schaambeine (a) und an dem Schaambeine selbst (b).

— endet sich an der rauhen Linie des Schenkelbeines (c).

— ziehet den Schenkel zu den andern, drehet ihn auswärts, und bebet ihn vorwärts in die Höhe: das Becken bieget er vor- und abwärts.

**FIG. IX. rückw. X. vorw. DER KURZE ZUZIEHER DES SCHENKELS (*Adductor brevis femoris*)** Synt. T. II. *im linken Fusse* A.

Er entstehet ebenfalls an dem Schaambeine (a) und an der Knorpelvereinigung (b), nur etwas tiefer unten.

— endet sich an der rauhen Linie, die rückwärts von dem kleinen Umwender herabsteiget (c).

— wirkt wie der vorige.



## T A B. XXVIII.

**FIG. I. vorw. II. rückw. DER GROSSE ZUZIEHER, DES SCHENKELS**  
(*Adductor magnus femoris*) Synt. T. I. im linken Fusse c. im rechten  
H. II. im linken Fusse B; im rechten A. III. im linken Fusse p; im  
rechten F. IV. im linken Fusse c; im rechten A.

Er entstehet an der äusseren Fläche des absteigenden Schenkels des Schaambeines (a), und des aufsteigenden Schenkels des Sitzbeines (b), wie auch an der Rauhnigkeit des Sitzbeines (c).

— endet sich an der ganzen rauhen Linie des Schenkelbeines (d), und mittelst seines fehnigen Fortsatzes an der hintern obern Gegend des inneren Gelenkknorrens eben dieses Knochens (e).

— zieht den Schenkel zu dem andern, und wendet ihn zugleich auswärts; hebt selben auch in die Höhe.

**FIG. III. vorw. IV. rückw. DER ÄUSSERE VERSTOPFER** (*Obturator externus*) Synt. T. II. im Stamme L. III. im Becken L. IV. im Stamme g.

Er entstehet an dem inneren Theil des äusseren Randes des verstopfungs Loches (a), wie auch an der vorderen Fläche des verstopfenden Bandes.

— endet sich an der Grube des grossen Umwenders des Schenkelbeines (b).

— wendet den Schenkel auswärts, und zieht ihn zu dem andern hin.

**FIG. V. vorw. VI. rückw. (A) DER HALBSEHNIGE** (*Semitendinosus*) Synt. T. I. im linken Fusse p. III. im linken Fusse L; im rechten R. VI. im rechten Fusse F; im linken H.

Er entstehet an der Rauhnigkeit des Sitzbeines (a).

— endet sich an der inneren Fläche, und dem vordern Winkel des Schienbeines (b).

— bieget den Unterschenkel gegen den Schenkel, und drehet ihn alsdann einwärts: den Schenkel zieht er rückwärts in die Höhe.

**FIG. VII. vorw. VIII. (B) rückw. DER HALBHÄUTIGE MUSKEL**  
(*Semimembranosus*) Synt. T. II. im linken Fusse c. III. im linken Fusse K. im rechten U. IV. im linken Fusse A. VI. im rechten Fusse E.

Er entstehet an der Rauhnigkeit des Sitzbeines (c).

— endet sich an dem inneren Gelenkkopfe (d), und dem inneren Winkel des Schienbeines (e).

— wirkt wie der vorige.


**FIG. V. vorw. VI. VIII. rückw. (C. D.) DER ZWEYKÖPFIGE MUSKEL**  
DES UNTERSCHENKELS (*Biceps cruris*) Synt. T. I. im linken Fusse o; im rechten M. II. im linken Fusse E. III. im linken Fusse M. im rechten Q. IV. im linken Fusse D. VI. im linken Fusse I.

Sein längerer Kopf (C) entstehet, verbunden mit dem halbsehnigen Muskel, an der Rauhnigkeit des Sitzbeines (f); sein kürzerer (D) aber an dem unteren Theile der rauhen Linie des Schenkelbeines (g).

— endet sich an dem Kopfe des Wadenbeines (b), und an dem äusseren Knorren des Schienbeines (i).

— bieget den Unterschenkel, und ist selber einwärts gedrehet, so drehet er ihn auswärts: den Schenkel kann er ebenfalls rückwärts in die Höhe ziehen.
















**FIG. I. rückw. DER ZWILLINGSMUSKEL DER WADE (Gemellus)**  
 Synt. T. I. im linken Fusse a. III. im linken Fusse r. VI. im rechten Fusse g; im linken n.

Sein äußerer Kopf entstehet an der rauhen schief zum äußeren Knorren des Schenkelbeines, herabsteigenden Linie (a) und an dem hintern oberen Theil des äußeren Knorrens (b), auf gleich Art entstehet auch sein innerer Kopf an dem inneren Knorren (c) und an der inneren rauhen Linie (d) nur etwas weiter oben, als der vorige.

Nachdem sich seine Sehne (e) mit der des Schollenmuskels (f) verbunden, und dadurch die sogenannte Achillissehne gebildet hat, endet sich diese Sehne an dem Muskeleindruck der Rauigkeit des Fersenbeines (g).

Er strecket den Fuß aus, und wenn dieser festgestellet ist, ziehet er den Unterschenkel rückwärts gegen den Fuß; auch kann er den Unterschenkel gegen das Schenkelbein biegen.

**FIG. II. rückw. DER PLATTFUSSMUSKEL (Plantaris)** Synt. T. I. im linken Fusse d; im rechten x. III. im linken Fusse o; im rechten w VI. im rechten Fusse i; im linken Fusse v.

Er entstehet an der rauhen Linie des äußeren Gelenkknorrens des Schenkelbeines (a), gleich ober dem Ursprung des äußeren Kopfes des Zwillingsmuskels.

— endet sich an der inneren Seite der Rauigkeit des Fersenbeines (b) neben der Achillissehne.

— hilft dem vorigen in seiner Wirkung.

**FIG III. rückw. IV. vorw. DER SCHOLLENMUSKEL (Soleus)** Synt. T. I. im rechten r; im linken o. III. im linken Fusse s; im rechten x. VI. im rechten Fusse h. im linken o.

Er entstehet an dem hinteren Theile des Kofgens (a) und an dem oberen Theile des hinteren Randes (b) des Wadenbeines, dann an der schiefen rauhen Linie der hinteren Fläche (c) und am inneren Winkel (d) des Schienbeines seine Sehne (f) endet sich sammt der des Zwillingsmuskels (g) wie schon gemeldet worden an dem Fersenbeine (e).

— wirkt wie Zwillingsmuskel, nur kann er den Unterschenkel gegen den Schenkel nicht biegen.

**FIG. V. rückw. DER KНИЕKEHLENMUSKEL (Popliteus)** Synt. T. I. im rechten Fusse n. III. im linken Fusse p. im rechten v. IV. im linken Fusse a.

Er entstehet an dem Eindrucke der hinteren äußeren Gegend des äußern Gelenkknorrens am Schenkelbeine (a), desgleichen an dem hintern Theile des äußern Zwischenknorpels des Kniegelenkes (b).

— endet sich an dem inneren Winkel (c) und an dem ober der schiefen rauhen Linie gelegenen Theil der hinteren Fläche des Schienbeines.

— hilft das Kniegelenk biegen, und wann dieses gebogen, drehet er den Unterschenkel so, daß der vordere Rand des Schienbeines mehr einwärts zu stehen kömmt.

**FIG. VI. unterw. VII. seitw. DER ABZIEHER DER GROSSEN ZEHE (Abductor policis pedis)** Synt. T. I. im linken Fusse y. Tab. V. Fig. I. und II. B. Fig. III. I. Fig. IV. p. Tab. VI. im rechten Fusse r.

Er entstehet an der inneren (a) und unteren Gegend (b) des Randes der Rauigkeit des Fersenbeines, und an dem Bande, unter welchen die Sehne des langen Biegers der großen Zehe durchläuft, und an dem inneren Rande der sehnigen Ausbreitung des Plattfußes.

— endet sich an dem Grundstücke des ersten Gliedes der großen Zehe (c): bey dem ersten Gelenke mit welchem er fest verwachsen ist, sendet seine Sehne eine Ausbreitung gegen den Rücken (d) um sich allda mit dem Ausstrecker zu verbinden: auch verbindet er sich in seinem Laufe fest mit dem kurzen Bieger der großen Zehe (e).

— ziehet die große Zehe von den übrigen ab.





Er entstehet an der Wurzel des äußeren Gelenkkopfes am Schienbeine (*a*) und an dem oberen Theile des vordern Winkels eben dieses Knochens (*b*), ferner an dem Kopfe (*c*) dem vordern Winkel (*d*), und



der inneren Fläche des Wadenbeines; endlich aus dem Zwischenknochenbande, und aus der über ihn liegenden Scheide (e).

Die vier Sehnen (f), in welche er sich theilet, laufen zu den vier kleinen Zehen, wo sie sich auf dem Rücken derselben mit den Sehnen des kurzen Ausstreckers der Zehen verbinden (g). Sie bringen daselbst durch ihre fernere Verbindung mit den Regenwurm- und Zwischenknochenmuskeln des Fußes eben so, wie bey der Hand geschah, eine sehnige Ausbreitung hervor, deren mittlerer Schenkel sich an dem Grundstücke des zweyten Gliedes (b), die beyden Seitenschenkel aber an dem Grundstücke des dritten Gliedes enden (i).

— strecket die dritten, zweyten, und dann auch die ersten Glieder der vier kleinen Zehen aus; da er die Zehen zugleich einander nähert; auch bieget er den Fuß gegen den Unterschenkel, oder widrigen Falls den Unterschenkel gegen den Fuß.

**FIG. III. seitw. (k. l. m.) DER DRITTE WADENBEINMUSKEL** (*Peroneus tertius*) Synt. T. I. im linken und rechten Fusse w. II. im linken Fusse a; im rechten b. VI. im linken Fusse s.

Er entstehet gewöhnlich aus der Fortsetzung einiger fleischigen Fasern des langen Ausstreckers der Zehen (k), dann aber an der inneren Fläche, und an dem vorderen Winkel des Wadenbeines (l), wie auch aus dem Zwischenknochenbande, und der Unterschenkelscheide.

— endet sich an dem oberen Winkel des Grundstückes des fünften Mittelfußbeines (m).

— bieget den Fuß gegen den Unterschenkel, und kehret dabey den Rücken desselben etwas einwärts.

**FIG. IV. seitw. DER EIGENE AUSSTRECKER DER GROSSEN ZEHE** (*Extensor proprius pollicis pedis*) Synt. T. I. im linken Fusse f; im rechten t. VI. im rechten Fusse o; im linken r.

Er entsteht an dem vorderen Winkel (a) und an der inneren Fläche des Wadenbeines, wie auch an dem Zwischenknochenbande.

— endet sich an dem Grundstücke des zweyten Gliedes der grossen Zehe (b); auf dem Rücken des ersten Gliedes bildet er durch seine Verbindung mit den übrigen zur grossen Zehe gehörigen Muskeln eine sehnige Ausbreitung (c).

— strecket die grosse Zehe aus, und wenn er noch mehr wirkt, kann er auch den Fuß biegen, und den Rücken desselben etwas auswärts wenden.


**FIG. V. seitw. DER KURZE AUSSTRECKER DER ZEHEN** (*Extensor brevis digitorum pedis*) Synt. T. I. im linken Fusse b; im rechten y. II. im linken Fusse m. III. im linken Fusse v; im rechten b; IV. im linken Fusse n. VI. im rechten Fusse r; im linken v.

Er entstehet an dem äusseren Theile des vorderen Fortsatzes des Fersenbeines (a).

— endet sich mittelst seiner vier Sehnen (b), in welche er sich spaltet auf dem Rücken der Zehen; also zwar, daß die erste ganz allein, ohne Verbindung mit andern Muskeln, an dem Grundstücke des ersten Gliedes der grossen Zehe aufhöret (c): die übrigen aber, indem sie auf dem Rücken der drey ersteren kleinen Zehen durch ihre Vereinigung mit dem langen Ausstrecker der Zehen (d) und den Regenwurm- und Zwischenknochenmuskeln des Fußes die sehnige Ausbreitung bilden helfen, gleich dem langen Ausstrecker, an dem zweyten (e), und dritten Gliede (f) der eben gemeldeten drey Zehen.

— wirkt auf die drey kleinen Zehen wie der lange Ausstrecker; bey der grossen Zehe aber strecket er das erste Glied derselben allein aus.





T A B. XXXI.

FIG. I. unterw. II. seitw. DER ABZIEHER DER KLEINSTEN ZEHE (*Abductor digiti minimi pedis*) Synt. T. III. im linken Fusse w. Tab. V.

Fig. I. n. II. a. Tab. VI. im linken Fusse a.

Er entsteht an der unteren (a) und äusseren Gegend (b) des Randes der Rauhnigkeit des Fersenbeines, wie auch aus der sehnigen Ausbreitung am Plattfusse (c) die ihn bedeckt.

— endet sich an der Rauhnigkeit des Grundstückes des fünften Mittelfussbeines (d), und an der äusseren Gegend des Grundstückes des ersten Gliedes der kleinsten Zehe (e).

— zieht das Mittelfussbein, und die Zehe von den übrigen Zehen ab und gegen den Plattfuss.

FIG. III. unterw. DER KURZE BIEGER DER ZEHEN (*Flexor brevis digitorum pedis*) Synt. T. I. im linken Fusse α; im rechten γ. III. im linken Fusse γ; im rechten c; V. Fig. I. k. Fig. II. c. Tab. VI. im rechten Fusse α; im linken Fusse c.

Er entsteht an der unteren Gegend der Rauhnigkeit des Fersenbeines (a), und aus der über ihn liegenden sehnigen Ausbreitung des Plattfusses (b).

Die.



Die vier Sehnen (c) in welche er sich theilet, laufen zu den vier kleinen Zehen hin, wo sie sich bey deren ersten Gliedern in zwey Schenkel spalten, gegen das zweyte Fingergelenk aber durch kreuzweis laufende sehnige Fasern einander verbunden werden (d), und sich an den Seitenrändern des zweyten Gliedes (e) enden.

— bieget die zweyten, dann die ersten Glieder der Zehen.

**FIG. IV.** vorw. V. unterw. VII. rückw. **DER LANGE BIEGER DER ZEHEN** (*Flexor longus digitorum pedis*) Synt. T. I. im linken Fuß s. im rechten u. II. im linken Fusse κ. III. im rechten Fusse f. IV. im linken Fusse i. Tab. V. Fig. I. d. Fig. II. l. Fig. III. a. Tab. VI. im rechten Fusse l.

Er entstehet an der hinteren Fläche des Schienbeines (a), und an dem äußeren (b), und inneren Winkel (c) eben dieses Beines.

Nachdem seine Sehne (d) den Plattfuß erreicht hat, theilet sie sich in zwey Schenkel, wovon der innere (e) mit der Sehne des langen Biegers der großen Zehe fortläuft, der äußere aber die vier Sehnen zu den kleinen Zehen (f) von sich giebt, die auf gleiche Art, wie in der Hand der tiefe Muskel, durch die Spaltung des kurzen Biegers laufen, und an den Grundstücken der dritten Glieder sich enden (g).

Ehe sich noch der äußere Schenkel in die vier benannten Sehnen theilet, hängt sich an selben eine fleischige Portion an, welche an der inneren (h) unteren (i) und äußeren Gegend (k) des Körpers am Fersenknochen entstehet, und sich dann in diesem Schenkel des langen Ausstreckers (l) endet.

— bieget die Glieder der Zehen, und strecket den Fuß aus.

**FIG. VX.** unterw. (l, m) **DIE REGENWURMMUSKELN DES FUSSES** (*Lumbricales pedis*) Synt. T. V. Fig. I. e. Fig. II. g. Fig. III. b. c. d. e.

Diese vier kleine Muskel, verhalten sich eben so, wie die gleichnamigen der Hand, sie entstehen nämlich aus den Sehnen des langen Biegers der Zehen (l), und enden sich an dem inneren Hügeln des Grundes der ersten Glieder der vier kleinen Zehen (m): auch helfen sie die Ausbreitungen auf den Rücken dieser Zehen bilden.

Sie bringen die nämliche Wirkung auf die Zehen, wie die Regenwurm-muskel der Hand auf die Finger, herfor.

**FIG. V.** unterw. (n, o, p) VI. rückw. **DER LANGE BIEGER DER GROSSEN ZEHE** (*Flexor longus pollicis pedis*) Synt. T. I. im linken Fusse c. II. im linken Fusse i. IV. im linken Fusse l. Tab. V. Fig. I. d. II. m. III. f. Tab. VI. im rechten Fusse κ.

Er entstehet an der hinteren Fläche des Wadenbeines (n) fast durch die ganze Länge desselben, und aus dem Zwischenknochenbände.

Seine Sehne (o) verfürket von dem langen Bieger der Zehen (e) läuft zur großen Zehe, an dessen zweyten Gliede sie sich endet (p).

— bieget die große Zehe abwärts, und hilft dem langen Bieger der Zehen, vermöge der Verbindung mit ihm, in seiner Wirkung: auch trägt er zur Ausstreckung der Fusses etwas bey.



**FIG. I.** *unterw.* II. *seitw.* DER KURZE BIEGER DER GROSSEN ZEHE  
(*Flexor brevis pollicis pedis*) Synt. T. I. *im linken Fusse* z. II. *im*  
*linken Fusse* l. IV. *im linken Fusse* p. V. Fig. I. c. II. o. III. κ. IV. o.  
Tab. VI. *im rechten Fusse* s.

Er entstehet an dem Fersenbeine (a), an dem dritten keilähnlichen Beine (b), und an der Fortsetzung der fehnigen Ausbreitung des Plattfusses (c), auch verlängert sich ein Theil der Sehne des hinteren Schienbeinmuskels in ihm.

— endet sich an beyden linsenähnlichen Knochen (d), der äußere Theil desselben verbindet sich noch insbesondere mit dem Zuzieher (e), der innere aber mit dem Abzieher der großen Zehe (f).

— zieht die linsenähnlichen Knochen rück- und abwärts; da aber diese durch feste Bänder (g) an das erste Glied befestiget sind, folget das erste Glied dieser Ziehung, und wird daher gebogen.

**FIG. III.** *rückw.* IV. *vorw.* V. *unterw.* DER HINTERE SCHIENBEIN-  
MUSKEL (*Tibialis posticus*) Synt. T. I. *im linken Fusse* e, *im rechten* s. II.  
*im linken Fusse* h, *im rechten* b. III. *im linken Fusse* z. *im rechten* c.  
IV. *im linken Fusse* h, *im rechten* b. V. Fig. III. g. IV. c. Tab. VI. *im*  
*rechten Fusse* m.

Er entstehet an der hinteren Fläche der oberen Hälfte des Schienbeines (a) und an dem inneren Winkel des Wadenbeines (b) fast nach der ganzen Länge desselben, wie auch an dem Zwischenknochenbände.

— endet sich an dem kahnähnlichen (c) großen (d) und dritten keilähnlichen Beine (e), an dem Grundstücke des dritten Mittelfußbeines (f) und an dem Fersen- (g) und würfelähnlichen Beine (h) des Hinterfusses; auch sendet er einen kleinen Theil seiner Sehne (i), der hier abgeschnitten erscheint, zum Ursprunge des kurzen Biegers der großen Zehe.

**FIG. VI.** *rückw.* VII. *vorw.* VIII. *unterw.* DER LANGE WADENBEIN-  
MUSKEL (*Peroneus longus*) Synt. T. I. *im linken Fusse* t. *im rechten* v. II.  
*im linken Fusse* f. III. *im linken Fusse* a; *im rechten* a. IV. *im linken*  
*Fusse* k. V. Fig. III. n. IV. b. V. b. Tab. VI. *im linken Fusse* a.

Er entstehet an dem Kopfe des Waden- (a) und des Schienbeines (b) an dem vorderen Winkel (c) an der äußeren Fläche, und dem äußeren Winkel (d) des Wadenbeines, und aus der Unterschenkel-scheide.

— endet sich an dem ersten keilähnlichen Hinterfußbeine (e), und an den Grundstücke der ersten zwey Mittelfußbeine (f).

— bieget den Fuß, und zieht ihn dergestalt, daß der Rücken desselben einwärts gekehret wird.


**FIG. IX.** *rückw.* X. *vorw.* DER KURZE WADENBEINMUSKEL  
(*Peroneus brevis*) Synt. T. I. *im linken Fusse* u. *im rechten* a. II. *im*  
*linken Fusse* g; *im rechten* e. III. *im linken Fusse* u. *im rechten* z. IV.  
*im linken Fusse* m. *im rechten* c. V. Fig. III. m. IV. a. V. a. Tab. VI.  
*im linken Fusse* k.

Er entstehet an dem unteren Theile des vorderen Winkels (a) und der äußeren Fläche (b) des Wadenbeines, wie auch aus der Unterschenkel-scheide.

— endet sich an dem rauhen Hügel des Grundstückes des fünften Mittelfußbeines (c).

— strecket den Fuß aus, und zieht das Mittelfußbein der kleinen Zehe soviel möglich, von den übrigen ab, wodurch der Rücken des Fußes etwas breiter wird.











I.



II.




III.



IV.



V.



VI.





## T A B. XXXIII.

**FIG. I. unterw. (a, c, e.) DER ZUZIEHER DER GROSSEN ZEHE** (*Adductor pollicis pedis*) Synt. T. V. Fig. II. N. III. L. IV. N.

Er entstehet an dem großen Plattfußbande (a), und an dem Grundstücke des dritten Mittelfußknochens.

— endet sich theils, durch die Verbindung mit dem kurzen Bieger, den man hier (b) abgeschnitten sieht, an dem äußern linienähnlichen Knochen (c) theils aber, neben dem Bande des linienähnlichen Knochens (d) an dem Grundstücke des ersten Gliedes (e), da er sich zugleich mit dem queeren Muskel des Fußes (g) verbindet.

— bieget das erste Glied der großen Zehe, und zieht selbes zu den andern Zehen.

**FIG. I. unterw. (f, g) DER QUEERE MUSKEL DES FUSSES** (*Transversalis pedis*) Synt. T. V. Fig. I. F, II. H. IV. M.

Er entstehet an der äußeren Gegend des Köpfgens am fünften Mittelfußbeine (f).

— endet sich, in Verbindung mit dem vorigen (g), an dem Grundstücke des ersten Gliedes der großen Zehe. Seine Sehne verlängert sich ferner gegen den Rücken des ersten Gliedes der großen Zehe, um daselbst die fehnige Ausbreitung bilden zu helfen (T. XXX. Fig. IV. c.)

— zieht das erste Glied der großen Zehe an die übrigen; er bringt dabey aber auch das fünfte Mittelfußbein demselben näher, wodurch der Plattfuß in dieser Gegend etwas mehr gewölbet wird.

**FIG. II. unterw. III. seitw. DER KURZE BIEGER DER KLEINSTEN ZEHE** (*Flexor brevis digiti minimi pedis*) Synt. T. V. Fig. I. M. II. F. III. IV. D.

Er entstehet an dem großen Plattfußbande (a).

— endet sich an dem äußeren Winkel des fünften Mittelfußbeines (b) und an der unteren Gegend des Grundstückes am ersten Gliede der kleinsten Zehe (c).

— bieget das erste Glied, und, so viel möglich, auch das Mittelfußbein der kleinsten Zehe.

**FIG. IV. unterw. V. oberwärts. DIE ÄUSSEREN, oder ZWEY-KÖPFICHEN ZWISCHENKNOCHENMUSKEL** (*Interossei pedis externi, seu bicipites*) Synt. T. I. im linken Fusse g, im rechten z. II. im linken Fusse N. im rechten D. E. F. G. IV. im rechten Fusse D. V. Fig. I. G. H. I. II. D. I. K. III. Q. S. T. IV. F. H. K. L. V. D. E. G. I. Tab. VI. im linken Fusse x. y. z.

Die drey letzteren nehmen ihren Ursprung aus dem Grundstücke (a) und der Seitenfläche (b) beyder Mittelfußbeine, zwischen welchen sie liegen, wie die äußeren Zwischenknochenmuskel der Hand. Von diesem ihrem Ursprünge an laufen sie an dem äußeren Rande der drey ersten kleinen Zehen fort, und enden sich an dem Grundstücke des ersten Gliedes (c) derselben. Der erste äußere Zwischenknochenmuskel entstehet blos an der inneren Fläche (d) und dem Grundstücke des zweyten Mittelfußbeines (e) und an dem großen keilähnlichen Beine (f), und läuft an dem inneren Rande der ersten kleinen Zehe fort, an dessen ersten Gliede



er sich endet (*g*); alle aber senden fehnige Fasern gegen den Rücken benannter Zehen, um daselbst die fehnige Ausbreitung bilden zu helfen.

**FIG. VI.** *unterw.* DIE INNEREN ZWISCHENKNOCHENMUSKEL DES FUSSES (*Interossei pedis interni*) Synt. T. IV. im linken Fusse o. Fig. H. E. III. P. R. IV. E. G. I. V.

Der erste entstehet an der inneren Fläche (*a*) und dem Grundstücke des dritten Mittelfußbeines (*b*); auf gleiche Weise entspringet der zweyte (*c*) an dem vierten, und der dritte (*d*) an dem fünften Mittelfußbeine. Von diesem ihrem Ursprunge an laufen sie an dem inneren Rande der Zehen fort, an dessen Mittelfußbeine sie entstanden sind, und enden sich an dem Grundstücke des ersten Gliedes der besagten Zehen (*e*), wo sie aber auch Fasern zur fehnigen Ausbreitung des Rückens der Zehen senden.

Alle Zwischenknochenmuskel, wenn sie zugleich wirken, biegen das erste Glied der kleinen Zehen; einzeln aber wirken sie als Ab- und Zuzieher nachdem sie an dem äußeren, oder inneren Rande der Zehen gelagert sind.

---

## SEHNIGE MUSKELSCHIEDEN DES STAMMES, UND DER UNTEREN GLIEDMASSEN.

Außer den fehnigen Scheiden, in welchen die geraden Bauchmuskel enthalten sind, findet sich im Stamme, für den längsten Rückenmuskel und Heiligebeinlendenmuskel, noch folgende. Sie bestehet aus dem Anfange des queeren Bauchmuskels, und des hinteren unteren Sägemuskels, welche, durch ihre fehnige Ausbreitungen sowohl an den Stachelfortsätzen, als auch an den Queerfortsätzen der Lendenwirbelbeine entspringen, hernach aber miteinander durch ihre Verbindung, eine wahre Scheide bilden, in welcher der gemeinschaftliche Kopf der beyden obengenannten Rückgrathmuskel enthalten ist: von dem hintern untern Sägemuskel bis zu den hintern obern erhalten diese beyde eine eigene fehnige Haut, welche an den Stachelfortsätzen der Rückenwirbelbeine entstehet, und sich gegen die Winkel der Rippen hin verlieret. Indem sie nun diese Rückgrathmuskel übersteiget, so hindert sie, daß diese bey der Rückwärtsbiegung des Rückgrathes nicht empor steigen, und aus ihrer gehörigen Lage weichen.

Die Muskel der unteren Gliedmassen sind ebenfalls, wie die der obern, insgesamt in eine fehnige Scheide eingeschlossen, die sich deswegen von dem Becken bis zu den Knöcheln des Unterschenkels erstrecket: da diese aber, bey dem Anfange des Unterschenkels, von neuem wieder verstärkt wird; so theilet man sie in die Schenkelscheide, und in die Unterschenkel-scheide.

DIE SCHENKELSCHIEDEN (*Vagina femoris*) oder, nach einigen, auch die BREITE SCHENKELBINDE (*Fascia lata*), bestehet größtentheils aus



verlängerten Fasern der Sehnen mancher Muskel; daher sie auch ungleich stark anzutreffen ist: sie besitzt aber auch eigene, von keinen Verlängerungen der Muskel abgeleitete Fasern. Ihr Ursprung ist an dem ganzen Kamme des Darmbeines, an dem Schwanz- und Heiligenbeine, an dem Sitz- und Schaambeine, und endlich an dem Poupartischen Bande: bey diesem Ursprung erhält sie fehnige Fasern von der Ausbreitung des äußeren schiefen Bauchmuskels, von dem fehnigen Anfange des breitesten Rückenmuskels, und von dem groffen Gefäßmuskel. Sie ist stärker, theils, wo sie der Emporsteigung der Muskel wider stehen muß, theils wo die fehnigen Ausbreitungen der erstgenannten Muskel sie verstärken, nämlich unter dem Poupartischen Bande, an der äußeren Seite des Schenkels, und um die Kniekehle: auch tritt sie auf gleiche Art, wie die Armscheide, zwischen die Muskel, und unterscheidet sie von einander.

DIE UNTERSCHENKELSCHETDE (*Vagina Cruris*) ist, wie oben schon erwähnt worden, die ununterbrochene Fortsetzung der Schenkelscheide; nur wird sie, bey der Anheftung der Muskel, am obern Ende des Unterschenkels, von neuem wieder verstärkt, und zwar durch fortgesetzte Fasern der fehnigen Ende des Schneidermuskels, der ausstreckenden Unterschenkelmuskel, des halbfehnigen, halbhäutigen, und schlanken Muskels, und endlich des zweyköpfigen Unterschenkelmuskels. An der äußeren Gegend des Unterschenkels ist sie weit beträchtlicher, als an den übrigen Gegenden, indem sie da nicht nur die Muskel bedeckt, sondern auch einigen davon den Ursprung verschaffet, und zwischen sie eindringet: rückwärts schließet sie die Muskel der Wade ganz ein, und erstreckt sich zu den tiefer gelegenen Muskeln: daher wird die ganze Unterschenkelscheide von einigen auch die Wadenscheide (*Vagina suralis*) genannt.



## T A B. XXXIV.

**FIG. I.** *seitw. von aussen II. vorw. III. seitw. von innen.* DAS GEMEINSCHAFTLICHE SCHEIDEBAND (*Ligamentum vaginale commune*).

Dieses Band ist blos eine Verstärkung der fehnigen Unterschenkel-scheide, am untern Ende derselben. Seine Entstehung ist an der inneren Fläche des Schienbeines (*a*), von welchem es sich quer über alle Muskel, die an der vorderen Gegend des Unterschenkels zum Fusse laufen, erstreckt, und am vorderen Winkel des Wadenbeines endet (*b*); auch setzen sich einige Fasern desselben in die Scheide, die die Achillessehne und die Wadenbeinmuskeln bedeckt, fort (*c*).

**FIG. I.** *seitw. von aussen. II. vorw. III. seitw. von innen.* DAS KREUZBAND DES FUSSES (*Ligamentum cruciatum pedis*).

Dieses Band bestehet aus mehreren Schichten, welche, dicht aneinander liegend, an dem vordern Fortsatze des Fersenbeines entstehen (*d*). Von hier laufen sie über den Rücken des Fusses zu dessen innerem Rande hin; breiten sich, auf diesem Wege, immer mehr aus, und schliessen die Sehnen des langen Ausstreckers der Zehen (*A*), und die Sehne des dritten Wadenbeinmuskels (*B*) zwischen sich ein (*e*). Dann spaltet sich dieses Band in zwey Schenkel, in den obern, und untern. Der obere (*f*) giebt eine Schichte (*g*) über dem vorderen Schienbeinmuskel (*C*), eine zweyte (*h*) unter diesem und über dem eigenen Ausstrecker der grossen Zehe (*D*); und zuweilen auch eine dritte, die unter dem eigenen Ausstrecker der grossen Zehe läuft. Alle diese Schichten aber enden sich an der inneren Fläche des Schienbeines (*i*). Der untere Schenkel (*k*) hingegen läuft gerade über die Sehne des eigenen Ausstreckers der grossen Zehe, und endet sich, theils an dem Rücken des kahnähnlichen Beines (*l*); theils, nachdem er die Sehne des vordern Schienbeinmuskels überstiegen hat, in der Scheide des Abziehers der grossen Zehe (*m*). Zuweilen wird dieses Band, gegen seinen Anfang, durch schieflaufende Fasern an den äussern Knöchel angeheftet (*n*), weswegen es einigermaassen kreuzförmig scheint.

**FIG. II.** *vorw. III. seitw. von innen.* DAS GEFRANZTE BAND (*Ligamentum laciniatum*).

Die Bündel, aus welchen dieses Band gebildet wird, entstehen an dem ganzen Umfange des innern Knöchels (*o*) und verbreiten sich in die Scheide des Abziehers der grossen Zehe (*p*), in die Fetthaut am inneren Rande des Fusses (*q*), und in die Scheide der Achillessehne (*r*).

Dieses Band dienet blos, die unterliegenden Scheiden, nämlich des hintern Schienbeinmuskels (*E*), des langen Biegers der Zehen (*F*), und des eigenen Biegers der grossen Zehe (*G*), in etwas zu verstärken, und zu bedecken; ja es scheinen sogar die erstange- merkten Scheiden des hintern Schienbeinmuskels (*s*) und des langen Biegers der Zehen (*t*) gleichsam aus einigen Fasern des gefranzten, und des tiefer liegenden deltaförmigen Bandes gemacht zu seyn, wie die Scheiden der ausstreckenden Muskel bey dem äusseren Armbande der Hand: doch ist die für die Sehne des eigenen lan-




I.



IV.




I.




II.



IV.




II.



III.



III.







langen Biegers der grossen Zehe bestimmte Scheide, mit einem besonderen Bande versehen (*u*) welches von dem innern Fortsatze zu der Rauigkeit des Fersenbeines läuft; genannte Sehne übersteiget, und anhält.

**FIG. I. seitw. von aussen. DIE BÄNDER DER WADENBEINMUSKEL**  
(*Ligamenta Musculorum peroneorum*).

Nachdem die Sehnen des langen (*H*), und kurzen Wadenbeinmuskels (*I*) ihre gemeinschaftliche Scheide am äusseren Knöchel verlassen haben, werden sie an dem äussern Rand des Fusses durch ein eigenes Band gehalten, welches gleichsam von dem Kreuzbände verlängert zu seyn scheint, indem es ebenfalls an der obern Gegend des vordern Fortsatzes des Fersenbeines entsteht (*v*), von hier über die Sehnen beyder Muskel herabsteiget, und sich an der äusseren Gegend des Fersenbeines (*w*) und an der Scheide des Abziehers der kleinsten Zehe (*x*) endet: doch unterscheidet es diese beyden Sehnen durch eine mittlere Scheidewand (*y*) die von aussen schon zu sehen ist: auch erhält es Verstärkungsfasern von dem würfelähnlichen Beine (*z*). Die Sehne des langen Wadenbeinmuskels wird im Plattfuss noch besonders, durch einige fortgesetzte Fasern des grossen Plattfussbandes, in der Furche des würfelähnlichen Beines gehalten.

**FIG. IV. unterw. DIE SEHNIGE AUSBREITUNG DES PLATTFUSSES**  
(*Aponeurosis plantaris*).

Sie ist eben so gestaltet: wie die in der flachen Hand, und findet sich, gleich nach Abziehung der allgemeinen Bedeckungen, mit welchen sie durch viele kurze sehnige Fasern fest verwachsen ist. Ihr Ursprung ist an dem unteren Theile des Randes der Rauigkeit am Fersenbeine (*a*), von welcher sie sich, immer mehr und mehr ausbreitend, den Zehen nähert, und gegen die Köpfe der Mittelfussbeine in fünf Bündel theilet (*b*), wovon ein jedes zu seiner Zehe läuft, und sich bey dem ersten Gelenke derselben, gespalten, an den Köpfen der Mittelfussbeine endet. Diese Bündel werden auf gleiche Weise, wie die in der Hand, durch queere Streifen (*c*) aneinander gehalten.

Ganz rückwärts verbindet sie sich fest mit der sehnigen Ausbreitung, die den Abzieher der grossen Zehe (*d*) und mit der, die den Abzieher der kleinsten Zehe (*e*) bedeckt; in welcher Gegend sie auch beträchtliche Fortsätze (*f*) in die Muskel, und allgemeinen Bedeckungen schicket.

Durch ihre Anspannung, welche bey Ausstreckung der Zehen geschieht, beschützt sie alle über ihr liegende weiche Theile, damit sie beym Gehen und Stehen nicht gedrückt werden.

Die bänderigen Ringe (*g*), die Scheidebänder (*h*) und Kreuzbänder (*i*) der Sehnen der Biegemuskel der Zehen, verhalten sich eben so, nur etwas unordentlicher, wie bey den Fingern der Hand.

**FIG. IV. A. Abductor pollicis. B. Flexor brevis pollicis. C. Flexor longus pollicis. D. Lumbricales pedis. E. Transversalis pedis. F. Interossei digitorum pedis. G. Flexor digitorum brevis. H. Interossei digiti minimi. I. Flexor brevis digiti minimi. K. Abductor digiti minimi. L. Flexor longus.**



## SCHLEIMBEUTEL DER MUSKEL.

Solche häutige Säckchen findet man:

unter dem Deltamuskel, wo er von der Schulterhöhe über den Kopf des Armknochens herabläuft;

zwischen dem Ende des breitesten Rückenmuskels und des größern runden Muskels;

zwischen der Sehne des größern runden Muskels, und dem Armbeine, wo sie sich um selbes vorwärts schlinget;

zwischen der Sehne des zweyköpfigen Armmuskels und der Rauigkeit der Speiche; auch verlängert sich dieser Schleimbeutel unter dem nahe liegenden Rückwärtswender;

unter der gemeinschaftlichen Sehne des inneren Hüft- und großen Lendenmuskels, da, wo sie über das Schaambein, und den vordern Theil des Pfannengelenkes läuft.

zwischen dem Rücken des größern Umwenders, und dem großen Gefäßmuskel;

zwischen dem Ende des mittleren Gefäßmuskels und dem Ende des birnförmigen Muskels;

unter dem kleinen Gefäßmuskel, wo sich dessen Sehne nach dem vorderen Theil des größern Umwenders bieget;

Bey der Wendung der Sehne des inneren Verstopfers über das Sitzbein, und zwischen den Zwillingsmuskeln; wie auch bey dem Laufe der letztgenannten über das Pfannengelenk;

zwischen dem Ende des halbhäutigen Muskels, und der Gelenkkapsel des Kniegelenkes;

zwischen den Sehnen der ausstreckenden Muskel des Unterschenkels, und dem vordern Theile des Kniegelenkes über der Kniescheibe;

zwischen der Sehne des schlanken Muskels und den inneren Gelenkbändern, wie auch zwischen diesem und dem halbsehnigen Muskel;

zwischen dem Ende der Sehne des zweyköpfigen Unterschenkelmuskels, und den äußeren Gelenkbändern;

zwischen dem inneren Kopfe des Zwillingsmuskels der Wade, und dem inneren Gelenkknorren des Schenkelbeines;

an der Rauigkeit des Fersenbeines bey dem Ende der Achillessehne;

endlich trifft man noch einen kleinen zwischen dem Ende der Sehne des vordern Schienbeinmuskels, und dem Rücken des Fußes an.



# ALPHABETISHES VERZEICHNIS

DER KNOCHENBEWEGENDEN MUSKEL UND DER DARZU GEHÖRIGEN THEILE.

|   | Tab.    |
|---|---------|
| Der Abwärtslaufende Nackenmuskel              | XX.     |
| Abzieher des Daumens, der kurze               | VI.     |
| Abzieher des Daumens, der zweyte kurze        | VI.     |
| Abzieher des Daumens, der lange               | VII.    |
| — Abzieher des kleinsten Fingers              | VI.     |
| — Abzieher des Zeigefingers                   | X.      |
| — Abzieher der großen Zehe                    | XXIX.   |
| — Abzieher der kleinsten Zehe                 | XXXI.   |
| — Anzeiger                                    | VIII.   |
| — Armmuskel der innere                        | V.      |
| <i>Armband, das innere</i>                    | XII.    |
| <i>Armband, das äußere</i>                    | XIV.    |
| — Aufheber des Schulterblattes                | I.      |
| <i>Ausbreitung sehnige der flachen Hand</i>   | XII.    |
| <i>Ausbreitung sehnige des Plattfußes</i>     | XXXIV.  |
| Ausstrecker der Finger, der gemeinschaftliche | VII.    |
| Ausstrecker des Ohrfingers, der eigene        | VII.    |
| Ausstrecker des Daumens, der kleinere         | VII.    |
| Ausstrecker des Daumens, der größere          | VIII.   |
| Ausstrecker der großen Zehe, der eigene       | XXX.    |
| Ausstrecker der Zehen, der lange              | XXX.    |
| Ausstrecker der Zehen, der kurze              | XXX.    |
| Der Bauchring                                 | XV.     |
| Die Bänderigen Ringe der Zehen                | XXXIV.  |
| <i>Bänderigen Ringe der Finger</i>            | XIII.   |
| <i>Bänder der Wadenbeinmuskel</i>             | XXXIV.  |
| Der Bäuschchenähnliche Muskel des Kopfes      | XVIII.  |
| — Bäuschchenähnliche Muskel des Halses        | XVIII.  |
| Bieger des kleinsten Fingers, der kleine      | VI.     |
| Bieger des Daumens, der lange                 | IX.     |
| Bieger des Daumens, der kurze                 | X.      |
| Bieger der Zehen, der kurze                   | XXXI.   |
| Bieger der Zehen, der lange                   | XXXI.   |
| Bieger der großen Zehe, der lange             | XXXI.   |
| Bieger der großen Zehe, der kurze             | XXXII.  |
| Die Breite Schenkelbinde                      | XXXIII. |
| Der Birnförmige Muskel                        | XXVII.  |
| — Bieger der kleinsten Zehe                   | XXXIII. |
| — Breitester Rückenmuskel                     | II.     |
| — Brustmuskel                                 | II.     |
| — Brustschlüsselbeinwarzenmuskel              | XVIII.  |
| — Deltamuskel                                 | II.     |
| — Dicke äußere                                | XXVI.   |
| Der   |         |



|   |         |
|---|---------|
| — Dicke innere                                  | XXVI.   |
| — Dreyeckiche Brustbeinmuskel                   | XXIII.  |
| — Dreyköpfige Armmuskel                         | IV.     |
| — Durchflochtene Muskel                         | XVIII.  |
| — Ellenbogenmuskel                              | IV.     |
| — Ellenbogenbeinmuskel, der innere              | V.      |
| — Ellenbogenbeinmuskel, der äussere             | VII.    |
| — Entgegenstellende Daumenmuskel                | VI.     |
| — Flachehandmuskel, der Lange                   | VI.     |
| — Flachehandmuskel, der kurze                   | VI.     |
| — Flügelmuskel, der innere                      | XVII.   |
| — Flügelmuskel, der äussere                     | XVII.   |
| Die Gemeinschaftliche Wirkung aller Bauchmuskel | XVI.    |
| Das Gemeinschaftliche Scheideband am Fusse      | XXXIV.  |
| — Gefranzte Band                                | XXXIV.  |
| Der Gerade Bauchmuskel                          | XVI.    |
| — Gerade Kopfmuskel, der hintere grössere       | XIX.    |
| — Gerade Kopfmuskel, der hintere kleinere       | XIX.    |
| — Gerade Seitenmuskel des Kopfes                | XIX.    |
| — Gerade innere grössere des Kopfes             | XIX.    |
| — Gerade innere kleinere des Kopfes             | XIX.    |
| — Gerade des Unterschenkels                     | XXV.    |
| — Gefässmuskel, der grössere                    | XXIV.   |
| — Gefässmuskel, der mittlere                    | XXV.    |
| — Gefässmuskel, der kleinere                    | XXVI.   |
| — Hängemuskel der Hode                          | XV.     |
| Die Halbkreisförmige Linie des Douglass         | XVI.    |
| — Halbmondförmige Linie des Spiegels            | XV.     |
| Der Halbhäutige Muskel                          | XXVIII. |
| — Halbfehnige Muskel                            | XXVIII. |
| — Halbstachelmuskel des Rückens                 | XXI.    |
| — Hebemuskel der Rippen, ein langer             | XXI.    |
| — Hebemuskel der Rippen, ein kurzer             | XXI.    |
| — Heiligebeinlendenmuskel                       | XX.     |
| — Hochliegende Muskel                           | IX.     |
| — Hüftmuskel, der innere                        | XXIV.   |
| — Kammmuskel                                    | XXVI.   |
| — Kaumuskel                                     | XVII.   |
| — Kniekehlenmuskel                              | XXIX.   |
| Das Kreuzband des Fusses                        | XXXIV.  |
| Die Kreuzbänder der Finger                      | XIII.   |
| — Kreuzbänder der Zehen                         | XXXIV.  |
| Der Lange Halsmuskel                            | XIX.    |
| — Längste Rückenmuskel                          | XX.     |
| — Lendenmuskel der, kleine                      | XXIV.   |
| Das   |         |



|   |         |
|---|---------|
| Lendenmuskel, der große   | XXIV.   |
| Der Mönchkappenmuskel   | I.      |
| — Nackenwarzenmuskel  | XVIII.  |
| — Obergräthenmuskel   | III.    |
| — Plattfußmuskel  | XXIX.   |
| Das <i>Poupartische Band</i>  | XV.     |
| Der Pyramidenmuskel   | XVI.    |
| — Queere Bauchmuskel  | XVI.    |
| — Queermuskel des Nackens   | XX.     |
| — Queermuskel des Fußes   | XXXIII. |
| <i>Queerband der Handwurzel, das innere</i>                           | XIII.   |
| — Rabenarmmuskel  | III.    |
| Rautenförmige Muskel, der größere                                     | I.      |
| Rautenförmige Muskel, der kleinere                                    | I.      |
| Die Regenwurmmuskel der Hand  | IX.     |
| — Regenwurmmuskel des Fußes   | XXXI.   |
| Rückwärtswender, der Lange  | V.      |
| Rückwärtswender, der kurze  | X.      |
| Runde Muskel, der größere   | III.    |
| Runde Muskel, der kleinere  | III.    |
| Sägemuskel, der vordere   | I.      |
| Sägemuskel, der große   | I.      |
| Sägemuskel, der hintere obere   | XVIII.  |
| Sägemuskel, der hintere untere  | XV.     |
| <i>Sehnige Muskelscheiden der obern Gliedmassen</i>                   | XI.     |
| <i>Sehnige Muskelscheiden des Stammes, und der untern Gliedmassen</i> | XXXIII. |
| <i>Sehnige Ausbreitung der flachen Hand</i>                           | XII.    |
| <i>Sehnige Ausbreitung des Plattfußes</i>                             | XXXIV.  |
| <i>Schenkelscheide</i>  | XXXIII. |
| Die <i>Scheidebänder der Finger</i>                                   | XIII.   |
| <i>Scheideband des Fußes, das gemeinschaftliche</i>                   | XXXIV.  |
| — <i>Scheidebänder der Zehen</i>                                      | XXXIV.  |
| Schiefe Bauchmuskel, der äußere                                       | XV.     |
| Schiefe Bauchmuskel, der innere                                       | XV.     |
| Schiefe Kopfmuskel, der obere   | XIX.    |
| Schiefe Kopfmuskel, der untere  | XIX.    |
| Schienbeinmuskel, der vordere   | XXX.    |
| Schienbeinmuskel, der hintere   | XXXII.  |
| Der Schlafmuskel  | XVII.   |
| — Schlanke Muskel   | XXVI.   |
| <i>Schleimbeutel der Muskel</i>                                       | XXXIV.  |
| — Schneidermuskel   | XXV.    |
| — Schollenmuskel  | XXIX.   |
| — Schwanzbeinmuskel   | XXV.    |
| Speichenmuskel, der innere  | V.      |



|   |         |
|---|---------|
| Speichenmuskel, der äußere längere                    | VIII.   |
| Speichenmuskel, der äußere kürzere                    | VIII.   |
| — Spannmuskel der Schenkelscheide                     | XXIV.   |
| — Stachelmuskel des Rückens                           | XX.     |
| — Stachelmuskel des Nackens                           | XXI.    |
| — Tiefliegende Muskel                                 | IX.     |
| — Untergräthenmuskel                                  | III.    |
| Ungleichdreysseitige Muskel, der vordere              | XXI.    |
| Ungleichdreysseitige Muskel, der mittlere             | XXI.    |
| Ungleichdreysseitige Muskel, der hintere              | XXI.    |
| — Unterschlüsselbeinmuskel                            | II.     |
| — Unterschulterblattmuskel                            | III.    |
| — Unterschenkelmuskel                                 | XXVI.   |
| Die <i>Unterschenkscheide</i>                         | XXXIII. |
| Verstopfer, der innere                                | XXVII.  |
| Verstopfer, der äußere                                | XXVIII. |
| — Vieltheilige Muskel des Rückgrathes                 | XXIII.  |
| — Viereckichte Lendenmuskel                           | XXIII.  |
| — Viereckichte Schenkelmuskel                         | XXVII.  |
| Vorwärtswender, der runde                             | V.      |
| Vorwärtswender, der viereckichte                      | X.      |
| <i>Wadenscheide</i>                                   | XXXIII. |
| Wadenbeinmuskel, der dritte                           | XXX.    |
| Wadenbeinmuskel, der lange                            | XXXII.  |
| Wadenbeinmuskel, der kurze                            | XXXII.  |
| <i>Weitbrechts Querbänder der flachen Hand</i>        | XII.    |
| — Zuzieher des Mittelhandbeines des kleinsten Fingers | VI.     |
| — Zuzieher des Daumens                                | X.      |
| Zuzieher des Schenkels, der lange                     | XXVII.  |
| Zuzieher des Schenkels, der kurze                     | XXVII.  |
| Zuzieher des Schenkels, der große                     | XXVIII. |
| — Zuzieher der großen Zehe                            | XXXIII. |
| — Zweyköpfige Armmuskel                               | IV.     |
| — Zweyköpfige des Unterschenkels                      | XXVIII. |
| Die Zweyköpfigen, oder äußeren                        |         |
| Zwischenknochenmuskel der Hand                        | XI.     |
| — Zweyköpfigen, oder äußeren                          |         |
| Zwischenknochenmuskel des Fußes                       | XXXIII. |
| Der Zweybäuchige Muskel des Unterkiefers              | XVII.   |
| — Zweybäuchige Nackenmuskel                           | XVIII.  |
| — Zwillingsmuskel der Wade                            | XXIX.   |
| Die Zwillingsmuskel des Schenkels                     | XXVII.  |
| Zwischenknochenmuskel der Hand, die inneren           | XI.     |
| Zwischenknochenmuskel des Fußes, die inneren          | XXXIII. |



---

|   |        |
|---|--------|
| — <i>Zwischenmuskelbänder</i>               | XI.    |
| Zwischenqueermuskel des Halses, die vordern | XXII.  |
| Zwischenqueermuskel des Halses, die hintern | XXII.  |
| — Zwischenqueermuskel des Rückens           | XXII.  |
| — Zwischenqueermuskel der Lenden            | XXIII. |
| Zwischenrippenmuskel, die äußern            | XXII.  |
| Zwischenrippenmuskel, die innern            | XXII.  |
| — Zwischenstachelmuskel des Nackens         | XXII.  |
| — Zwischenstachelmuskel der Lenden          | XXIII. |
| — Zwischenstachelmuskel des Rückens         | XXII.  |

---

|     |     |
|-----|-----|
| 177 | ... |
| 178 | ... |
| 179 | ... |
| 180 | ... |
| 181 | ... |
| 182 | ... |
| 183 | ... |
| 184 | ... |
| 185 | ... |
| 186 | ... |
| 187 | ... |
| 188 | ... |
| 189 | ... |
| 190 | ... |



B E S C H R E I B U N G

DER

M U S K E L,

W E L C H E


W E I C H E T H E I L E B E W E G E N .









I.





II.



III.



IV.





## Syntaxis. Tab. C

**FIG. I.** A. *Epicranius*. B. *Orbicularis palpebrarum*. C. *Compressor narium*. D. *Levator labii superioris, alæque nasi*. E. *Levator labii superioris*. F. *Zygomaticus minor*. G. *Levator anguli oris*. H. *Zygomaticus major*. I. *Nasalis labii superioris*. K. *Orbicularis oris*. L. *Depressores labii inferioris*. M. *Levatores menti*. N. *Depressor anguli oris*. O. *Buccinator*. P. *Masseter*. Q. *Anterior auriculæ*. R. *Attollens auriculam*. S. *Major helcis*. T. *Tragicus*. U. *Minor helcis*. V. *Antitragicus*. W. *Biventer maxillæ*. X. *Latissimus colli*. Y. *Sternohyoideus*. Z. *Sternothyreoidei*. a. *Coracohyoideus*. b. *Hyothyreoideus*. c. *Sternocleidomastoidei*. d. *Cucullaris*. e. *Levator scapulæ*. f. *Scalenus medius*. g. *Pectoralis*. h. *Deltoides*. i. *Subclavius*. k. *Serratus anticus*. l. *Subscapularis*. m. *Serratus magnus*. n. *Intercostalis externus*. o. *Intercostales interni*. p. *Supraspinatus*. q. *Biceps brachii, cum Coracobrachiali*.

**FIG. II.** A. *Corrugatores superciliarum*. B. *Levatores palpebrarum*. C. *Ciliares*. D. *Temporalis*. E. *Masseter*. F. *Buccinator*. G. *Pterygoideus externus*. H. *Levator anguli oris*. I. *Depressor alæ nasi*. K. *Nasalis labii superioris*. L. *Orbicularis labiorum*. M. *Depressores labiorum*. N. *Levatores menti*. O. *Sternohyoideus*. P. *Biventer maxillæ*. Q. *Mylohyoideus*. R. *Stylohyoideus*. S. *Basioglossus*. T. *Ceratoglossus*. U. *Stylopharyngeus*. V. *Constrictor inferior pharyngis*. W. *Commune externum Stylopharyngei, Palatopharyngei, & Salpignopharyngei*. X. *Coracohyoideus*. Y. *Sternothyreoideus*. Z. *Rectus internus major capitis*. a. *scalenus medius*. b. *Levator scapulæ*. c. *Scalenus prior*. d. *Trachelomastoideus*. e. *Longus colli*. f. *Pleura*.







**FIG. III.** A. *Oculorum globi*. B. *Obliquus superior oculi*. C. *Rectus attollens oculi*. D. *Rectus adductor oculi*. E. *Rectus abductor oculi*. F. *Rectus depressor oculi*. G. *Obliquus inferior oculi*. H. *Depressor alæ nasi*. I. *orbicularis labiorum*. K. *Buccinator*. L. *Levatores menti*. M. *Pterygoideus externus*. N. *Pterygoideus internus*. O. *Mylohyoideus*. P. *Basioglossus*. Q. *Ceratoglossus*. R. *Cricothyreoideus*. S. *Sternothyreoideus*. T. *Hyothyreoideus*. U. *Stylopharyngeus*. V. *Constrictor inferior pharyngis*. W. *Rectus internus major capitis*. X. *Longus colli*. Y. *Levator costæ primæ*. Z. *Pleura*. a. *Scalenus prior*. b. *Scalenus medius*. c. *Trachelomastoideus*. d. *complexus*. e. *Obliquus superior capitis*.

**FIG. IV.** A. *Epicranius*. B. *Attollens auriculam*. C. *Anterior auriculæ*. D. *Retrahentes auriculam*. E. *Major helcis*. F. *Minor helcis*. G. *Tragicus*. H. *Antitragicus*. I. *Orbicularis palpebrarum*. K. *Compressor naris*. L. *Nasalis labii superioris*. M. *Orbicularis oris*. N. *Zygomaticus major*. O. *Depressor anguli oris*. P. *Buccinator*. Q. *Masseter*. R. *Pterygoideus internus*. S. *Stylohyoideus*. T. *Styloglossus*. U. *Basioglossus*. V. *Latissimus colli*. W. *Sternocleidomastoideus*. X. *Biventer cervicis*. Y. *Splenius capitis*. Z. *Splenius colli*. a. *Scalenus medius*. b. *Levator scapulæ*. c. *Cucullares*.















A. Pterygoideus externus. B. Pterygoideus internus. C. Mylohyoideus. D. Stylohyoideus. E. Biventer maxillae. F. Basioglossus. G. Ceratoglossus. H. Thyrohyoideus. I. Cricothyroideus. K. Pharyngis Constrictor inferior. L. Pharyngis Constrictor medius. M. Pharyngis Constrictor superior. N. Oesophagus truncatus.




A. Circumflexus palati molli. B. Levator palati molli. C. Lingua. D. Constrictor isthmi faucium. E. Styloglossus. F. Ceratoglossus. G. Basioglossus. H. Lingualis. I. Genioglossus. K. Geniohyoideus. L. Stylopharyngeus. M. Constrictor pharyngis superior. N. Constrictor medius pharyngis. O. Constrictor inferior pharyngis. P. Oesophagus truncatus.




A. Circumflexus palati molli. B. Levator palati molli. C. Constrictor isthmi faucium. D. Lingua. E. Styloglossus. F. Truncatus Ceratoglossus cum Basioglossus. G. Lingualis. H. Genioglossus. I. Constrictor superior pharyngis. K. Constrictor medius pharyngis. L. Constrictor pharyngis inferior. M. Oesophagus truncatus.




A. Circumflexus palati molli. B. Levator palati molli. C. Membrana pharyngis nuda. D. Stylopharyngeus. E. Palatopharyngeus. F. Constrictor isthmi faucium. G. Lingua. H. Tonsilla. I. Styloglossus truncatus. K. Basioglossus et Ceratoglossus truncati. L. Lingualis. M. Genioglossus. N. Condroglossus. O. Cricothyroideus posticus. P. Oesophagus truncatus.




A. Circumflexus palati molli. B. Levator palati molli. C. Palatum molle. D. Tonsilla. E. Constrictor isthmi faucium. F. Lingua. G. Styloglossus truncatus. H. Basioglossus et Ceratoglossus truncati. I. Lingualis. K. Genioglossus. L. Membrana interior laryngis. M. Cricothyroideus posticus. N. Oesophagus truncatus.




A. Pharyngis Constrictores inferiores. B. Stomachus truncatus. C. Aspera arteria truncata. D. Pharyngis Constrictores medii. E. Pharyngis Constrictores superiores. F. Pharyngis membrana nuda. G. Circumflexi palati molli. H. Stylopharyngei.



A. Pharyngis Constrictores medii. B. Pharyngis Constrictores superiores. C. Pharyngis Membrana nuda. D. Levatores palati molli. E. Circumflexi palati molli. F. Stylopharyngei. G. Arteria aspera truncata. H. Cricothyroideus posticus.



A. Pharyngis Constrictores superiores. B. Membrana pharyngis nuda. C. Levatores palati molli. D. Circumflexi palati molli. E. Stylopharyngei. F. Arteria aspera truncata. G. Cricothyroideus posticus.



A. Membrana pharyngis nuda. B. Levatores palati molli. C. Circumflexi palati molli. D. Palatopharyngei. E. Stylopharyngei. F. Cricothyroideus posticus. G. Aspera arteria truncata.




A. Levatores palati molli. B. Circumflexi palati molli. C. Aspera arteria truncata. D. Palatopharyngei. E. Salpingopharyngei. F. Stylopharyngei. G. Palatum molle. H. Uvula. I. Tonsilla. K. Lingua. L. Arytaenoides obliqui. M. Arytaenoides transversus. N. Cricothyroideus posticus.




A. Levatores palati molli. B. Circumflexi palati molli. C. Stylopharyngei. D. Palatopharyngei. E. Palatum molle. F. Uvula. G. Tonsilla. H. Lingua.




A. Circumflexi palati molli. B. Constrictorum pharyngis superiorum partes. C. Palatopharyngeorum partes. D. Stylopharyngei. E. Uvula. F. Palatum molle. G. Tonsilla. H. Lingua.



A. Circumflexi palati molli.



A. Tonsilla. B. Lingua. C. Palatum molle. D. Lingua. E. Constrictores isthmi faucium. F. Palatopharyngei.




A. Cricothyroideus posticus. B. Cricothyroideus lateralis. C. Thyroarytaenoides. D. Depressor epiglottidis. E. Arytaenoides obliqui. F. Arytaenoides transversus. G. Thyroarytaenoides alter.







TAB. 4.



TAB. 4.

## DIE MUSKEL DER AUGENLIEDER, UND DES AUGAPFELS.

**FIG. I. vorw. (a, b, c) DER KREISMUSKEL DER AUGENLIEDER (*Orbicularis palpebrarum*)** Synt. Tab. 4 Fig. I. B. Fig. IV. 1.

Er entsteht an dem inneren Augenwinkelfortsatze des Stirnbeines, und an dem oberen Theile des Bandes der Augenlieder (a); von da laufen seine Bündel über das obere Augenlid, und den obern Theil des Augengrubenrandes dem äußern Augenwinkel zu (b), wo sie, umgewendet, über das untere Augenlid, und den untern Theil des Augengrubenrandes, wieder zurückkehren, und an dem Nasenfortsatze, und dem unteren Theile des genannten Bandes sich enden (c): jene Bündel in dem Rande der Augenlieder werden auch zusammen **DER AUGENWIMPERNMUSKEL (*Ciliaris*)** Fig II. Synt. Tab. 4 Fig II. c. genannt.

— nähert die Ränder der Augenlieder, bey minderer Wirkung, einander nur schwach; bey heftigerer aber, drückt er sie, runzelt die Haut der Augenlieder, des äußern Augenwinkels, und der Wange, und zieht sie gegen den innern Augenwinkel; zu gleicher Zeit drückt er auch mittelbar den Augapfel rückwärts.

**FIG. I. vorw. (d, e), DER ZUSAMMENRUNZLER DER AUGENBRAUNE (*Corrugator supercilii*)** Synt. Tab. 4 Fig. II. A.

Er entsteht an der Mitte des Stirnbeines zwischen den beyden Augenbrauenhügeln (d).

— endet sich in dem obern Theile des Kreismuskels der Augenlieder (e).

— zieht die Augenbraunen aneinander, und drückt sie abwärts, wodurch die Wurzel derselben, und der glatte Zwischenraum (*Glabella*) zusammengerunzelt, und empor getrieben wird.

**FIG. III. vorw. IV. rückw. DER UEBERSCHÄDELMUSKEL (*Epicranius*)** Synt. Tab. 4 Fig. I. A. IV. A.

Dieser Muskel bestehet aus drey fleischigen Theilen, und einer mittleren sehnigen Ausbreitung; der vordere fleischige Theil wird mit dem Namen **DIE STIRNMUSKEL (*Musculi frontales*)** belegt: die hintern aber heißen **DIE HINTERHAFTMUSKEL (*Musculi occipitales*)**.



Jeder Hinterhauptmuskel entsteht an der obern bogenförmigen Linie des Hinterhauptbeines (*a*) und des Warzentheiles am Schlafbeine (*b*); steigt sodann auf- und auswärts, und verwandelt sich in eine sehnige Ausbreitung (*c*) die an der Seite und unterwärts, bey dem aufhebenden Muskel des Ohres, sich in diesem, und in der Uberschädelhaube verlieret; nach oben zu aber weiter vorwärts läuft, sich mit der ähnlichen vereinigt, und den Stirnmuskeln ihren Ursprung giebt (*d*). Diese laufen von hier über die Stirne herab, und enden sich an dem Stirnbeine (*e*) in dem Kreismuskel der Augenlieder (*f*), und in dem Aufheber des Nasenflügels und der Oberlippe (*g*); der mittlere Theil aber läuft über die Wurzel, und den Rücken der Nase, und verbreitet sich daselbst in die vereinigten Zusammendrucker der Nasenlöcher (*h*): übrigens ist dieser Muskel mit den allgemeinen Bedeckungen des Schädels, und mit der Schädelhaube fest verwachsen, welche letzte, zugleich mit der sehnigen Ausbreitung, die von den Hinterhauptmuskeln seit- und unterwärts läuft, die Schläfenmuskeln bedeckt, und diesen zur Scheide dienet.

Die Stirnmuskeln ziehen die Augenbraunen aufwärts, etwas voneinander, und spannen die Haut der Nase oben zu an, zugleich ziehen sie auch den obern, und vordern Theil der Schädeldecke vor- und abwärts, wodurch die Stirne in Querfalten gerunzelt wird: die Hinterhauptmuskeln aber ziehen die Schädeldecke rückwärts.

FIG. V. oberw. XI. (*a*) vorw. Synt. Fig. I. (*a, b*). DER AUFHEBER DES OBERN AUGENLIEDES (*Levator palpebrae superioris*) Synt. T. & Fig. II. B.

Er entsteht an dem obern Theile des Sehloches (*a*).

— endet sich an dem obern Augenknorpel (*Tarsus*) (*b*).

— zieht den Knorpel auf- und rückwärts, wodurch das Aug eröffnet wird.

FIG. VI. oberw. XI. (*b*) vorw. Synt. Fig. I. (*c, d*). DER OBERE SCHIEFE AUGENMUSKEL (*Obliquus superior oculi*) Synt. Tab. & Fig. III. B.

Er entsteht an der innern, und obern Gegend des Sehloches (*c*) neben dem vorigen, läuft nach der innern Wand der Augengrube vorwärts zu dem innern Winkel, wo seine Sehne sich über eine Rolle (*d*) wendet, die aus einem, von vorne nach hinten gebogenen, und von oben nach unten ausgehöhlten Knorpel bestehet, der durch kurze bänderige Fasern an das Rollgrübchen des Stirnbeines angeheftet ist; von hier kehrt sie wieder zurück abwärts, und endet sich oberwärts in der Mitte des Augapfels (*e*) unter dem aufhebenden Augenmuskel: von der Rolle bis zu dem Ende ist die Sehne in einer häutigen, nachgiebigen Scheide sehr locker eingeschlossen.

— drehet den Augapfel dergestalt, daß der Stern des Auges aus- und abwärts zu stehen kömmt; den ganzen Augapfel aber zieht er vorwärts gegen den innern Augenwinkel.

FIG. VII. oberw. XI. (*c*) vorw. Synt. Fig. I. (*f*) DER GERADE AUFHEBENDE AUGENMUSKEL (*Rectus attollens oculi*) Synt. Tab. & Fig. III. c.

Er entsteht an dem obern Theile des Randes des Sehloches (*f*).

— endet sich an dem obern Theile der vordern Hälfte des Augapfels (*g*).

— hebet den Augapfel gerade aufwärts.

FIG. VIII. unterw. XI. (*d*) vorw. Synt. Fig. II. III (*b*) oberw. IV. (*b*) unterw. DER GERADE NIEDERDRUECKENDE AUGENMUSKEL (*Rectus deprimens oculi*) Synt. Tab. & Fig. III. f.

Er entsteht an dem untern Theile des Sehloches (*b*).



— endet sich an dem untern Theile der vordern Hälfte des Augapfels (i)  
— zieht den Augapfel gerade abwärts.  
**FIG. IX.** *seitwärts von innen* XI. (e) *vorw.* Synt. Fig. I. II. III. (k) *oberw.*  
IV. (k) *unterw.* DER GERADE ZUZIEHENDE AUGENMUSKEL  
(*Rectus adducens oculi*) Synt. Tab. C Fig. III. D.

Er entstehet an der innern, und untern Gegend des Sehloches (k).

— endet sich innerwärts an der vorderen Hälfte des Augapfels (l).

— zieht den Augapfel gerade einwärts gegen die Nase.

**IG. X.** *seitwärts von aussen* XI. (f) *vorw.* Synt. Fig. I. II. III. (m, n) *oberw.*  
IV. (m, n) *unterw.* DER GERADE ABZIEHENDE AUGENMUSKEL  
(*Rectus abducens oculi*) Synt. Tab. C Fig. III. E.

Er entstehet an dem äußern Theile des Sehloches (m), und an dem unter demselben befindlichen Bande.

— endet sich auswärts an der vorderen Hälfte des Augapfels (n).

— zieht den Augapfel auswärts, und von der Nase gerade ab.

Alle geraden Augenmuskeln, wenn sie zugleich wirken, drücken den mittleren Theil des Augapfels, machen ihn vorwärts spitziger, und ziehen ihn gerade rückwärts zu dem Sehloche: wirkt aber einer nach dem andern, so wird der Augapfel in einem Kreis bewegt.

**FIG. XI.** (o, p) *vorw.* Synt. Fig. I. II. (p.) *oberw.* III. (o, p) *oberw.* IV. (o.) *unterw.* DER UNTERE SCHIEFE AUGENMUSKEL (*Obliquus inferior oculi*) Synt. Tab. C Fig. III. G.

Er entstehet an dem Oberkieferbeine (o) wo sich der Haken des Thränenbeines mit demselben verbindet.


— endet sich auswärts, etwas hinter der Mitte des Augapfels (p).

— rollet den Augapfel so, daß der Stern desselben auf- und auswärts gekehret wird, den ganzen Augapfel zieht er ebenfalls gegen die Nase vor- und abwärts.





TAB. Ω.



TAB. Ω

DIE MUSKEL DES ÄUSSERN OHRES.

FIG. I. vorw. II. rückw. III. seitw. von innen. (a, b, c) DER AUFHEBENDE MUSKEL DES OHRES (*Attollens auriculam*) Synt. Tab. Ω Fig. I. R. IV. B.

Er entstehet an der Scheide, die den Schlafmuskel überzieht (a), und an der fehnigen Ausbreitung des Ueberschädelmuskels (b).

— endet sich in der gewölbten Gegend des Ohres an der Gegenwindung (c).

— hebet das Ohr in die Höhe.

FIG. I. vorw. III. seitw. von innen (d, e) DER VORDERE MUSKEL DES OHRES (*Anterior auriculæ*) Synt. Tab. Ω Fig. I. o. IV. c.

Er entstehet ebenfalls an der Scheide, die den Schlafmuskel bedeckt (d), gleich über dem Jochbogen.

— endet sich an dem Rücken des Hügels der Windung, die die Muschel des Ohres theilet (e).

FIG. II. rückw. III. seitw. von innen. (f, g) DIE ZURÜCKZIEHENDEN MUSKEL DES OHRES (*Retrahentes auriculam*) Synt. Tab. Ω Fig. IV. D.

Es sind deren gewöhnlich zwey, oder drey, und alle entstehen an der hintern und äussern Gegend des Warzenfortsatzes (f).

Sie enden sich in dem obern und untern erhobenen Theil der Muschel des Ohres (g).

Sie ziehen das Ohr rückwärts. und spannen die Muschel.

FIG. IV. seitw. von aussen (a, b) DER GRÖßERE MUSKEL DER WINDUNG (*Helicis major*) Synt. Tab. Ω Fig. I. s. IV. E.

Er entstehet an dem spitzigen Fortsatze der Windung (a).



- endet sich an der Windung, wo sie sich nach oben wendet (*b*).
- drückt den Theil der Windung, an welchem er sich befindet abwärts.

**FIG. IV. seitw. von aussen. (c) DER KLEINERE MUSKEL DER WINDUNG** (*Helicis minor*) Synt. Tab. C Fig. I. a. IV. F.

- Er entstehet an dem Anfange der Windung, übersteiget dessen kleinen Einschnitt, und endet sich wieder in die Windung (*c*).
- zieht den Einschnitt zusammen.

**FIG. IV. seitw. von aussen (d) DER MUSKEL DES BOCKES** (*Tragicus*) Synt. Tab. C Fig. I. r. IV. G.

Er entstehet an der Muschel, bey der Wurzel des Bockes, und endet sich in dem obern Theile desselben (*d*).

- drückt den Theil der Muschel, wo er liegt, nieder, und ebnet ihn: auch kehret er den obern Rand des Bockes auswärts.

**FIG. IV. seitw. von aussen (e) DER MUSKEL DES GEGENBOCKES** (*Antitragicus*) Synt. Tab. C Fig. I. u. IV. H.

Er entstehet an dem Gegenbocke, und endet sich an dem Ausgange der Gegenwindung (*e*).

- zieht das Ende der Gegenwindung zu dem Gegenbocke, dessen Rand er einigermaßen auswärts wendet: den Theil der Muschel aber, welchen er übersteiget, hebt er durch seinen Druck mehr empor.

**FIG. V. innerw. DER QUEERMUSKEL DES OHRES** (*Transversus auriculæ*).

Er entstehet an der Erhabenheit des oberen Theiles der Muschel (*a*), von welcher er quer zu dem Kahn, und zu der Gegenwindung läuft, und sich da endet (*b*).

- zieht den Theil zwischen dem Kahn, und der Muschel zusammen; indem er die Muschel, und den Kahn spannet.



## DIE MUSKEL DES INNERN OHRES.

**FIG. I. (a) III. seitw. von aussen. DER ERSCHLAFER DES PAUCKENFELLES (*Laxator tympani*).**

Er entstehet an dem obern, und etwas rückwärtigen Theile der innern Oefnung des äussern Gehörganges (a); von welchem er ab- und einwärts läuft, und sich an der Wurzel des kürzern Fortsatzes am Hammer endet (b)

— zieht die Handhabe des Hammers auswärts, und in die Höhe; wodurch das mit derselben verbundene Pauckenfell ebenfalls auswärts gezogen, erschlaffet, und flacher gemacht wird.

**FIG. I. (c, d.) IV. seitw. von aussen. DER ÄUSSERE MUSKEL DES HAMMERS (*Externus mallei*).**

Er entstehet an dem Winkelfortsatze des Wespenbeines (c): läuft dann in der Glasser-Spalte fort, und endet sich an dem längeren Fortsatze des Hammers (d).

— zieht den Hammer, und vermöge dessen Verbindung mit dem Pauckenfelle auch dieses vorwärts, und auswärts.

Das Daseyn dieser ersterwähnten zwey Muskel wird von vielen Zergliedern in Zweifel gesetzt, oder gänzlich verneinet.

**FIG. I. (g) II. (e, g) und V. seitw. von aussen VI. seitw. von innen. DER SPANNER DES PAUCKENFELLES (*Tensor tympani*).**

Er entstehet an dem oberen Theile der Eustachischen Trompete (e); von welcher er durch einen eigenen über der Trompete liegenden Kanal (f) in die Pauckenhöhle dringet, alda aber seine Sehne bey dem Ende dieses Kanals, der Löffelschnabel (*Rostrum cochlearis*) genannt, umwendet, und auswärts zu dem Hammer läuft, wo er sich an der inneren Gegend der Handhabe (g) endet.

Er zieht den Hammer, samt den damit verbundenen Pauckenfell, einwärts, wodurch letzteres von aussen hohl gemacht, und gespannt wird.

Dieser Muskel ist durch seinen ganzen Verlauf mit einer sehnigen Scheide bekleidet.

**FIG. I. (k) II. (b, k) VII. seitw. von aussen DER MUSKEL DES STEGREIFES (*Stapedius*).**

Er entstehet in der Höhle der Pyramidenförmigen Erhöhung der Pauckenhöhle (b); läuft durch die runde Oefnung derselben (i) in die Pauckenhöhle, und endet sich an dem hinteren Theile des Köpfgens des Stegreifes (k).

— zieht das Köpfgen des Stegreifes rückwärts, wodurch der hintere Theil des Grundes dieses Knochens in den Vorfaal gedrückt wird.



I.



III.



IV.



V.




VI.



II.




VII.









T A B. ♂

DIE MUSKEL DER NASE.

**FIG. I. vorw. (a, c, d) DER AUFHEBER DES NASENFLÜGELS UND DER OBEREN LIPPE** (*Levator alae nasi, labii superioris*) Synt. T. ☞ Fig. I. d.

Er entstehet an dem Nasenfortsatze des Oberkieferbeines (a), und aus einigen fortgesetzten Fasern des Stirnmuskels (b), die hier abgeschnitten vorgestellt sind.

Der innere Theil desselben endet sich an dem Nasenflügel (c); der äußere aber verläuft sich in die obere Lippe (d).

— hebet den Nasenflügel, und die obere Lippe in die Höhe.

**FIG. I. vorw. (e, f) DER NASENMUSKEL DER OBEREN LIPPE** (*Nasalis labii superioris*) Synt. T. ☞ Fig. I. i. Fig. II. k. IV. l.

Er entstehet an der Spitze der Nase (e) und an der Scheidewand der Nasenlöcher.

— endet sich in dem Kreismuskel der Lippen (f).

Seine Bestimmung in Rücksicht der Nase ist, die Spitze derselben herab zu ziehen.

**FIG. II. vorw. DER ZUSAMMENDRÜCKER DER NASENLÖCHER** (*Compressor narium*) Synt. T. ☞ Fig. I. c. IV. k.

Er entstehet an dem äußeren Theile der Wurzel des Nasenflügels (a).

— endet sich, auf dem Rücken der Nase, in dem nämlichen Muskel der andern Seite (b); oben verbindet er sich mit der Fortsetzung des Stirnmuskels (c); der sich über die Nase herab senket, und von einigen den Nahmen, Pyramidenmuskel der Nase, erhält.

— drückt den Nasenflügel gegen die Scheidewand:

**FIG. III. vorw. DER NIEDERDRÜCKER DES NASENFLÜGELS** (*Depressor alae nasi*) Synt. T. ☞ Fig. II. i, III. h.

Er entstehet an den Zahnlückenhügeln der Schneidezähne (a) und des Hundszahnes (b); auch hängt er mit der oberen Lippe fest zusammen.

— endet sich an der Wurzel, und an dem untern Rande des Nasenflügels (c).

— drückt den Nasenflügel, abwärts, ein wenig an die Scheidewand, und senket dadurch die obere Lippe.





I




II



III

IV

V



VI


VII



PLATE 2

THESE ILLUSTRATIONS ARE FROM THE  
MANUSCRIPT OF THE "HISTOIRE  
NATURELLE" OF THE "MUSEUM  
NATURAL HISTORIQUE" OF  
PARIS. THE ILLUSTRATIONS  
WERE DRAWN BY THE  
ARTIST, AND THE  
TEXT IS BY THE  
AUTHOR. THE  
ILLUSTRATIONS  
ARE IN THE  
ORIGINAL  
COLORS, AND  
THE TEXT IS  
IN THE  
ORIGINAL  
LANGUAGE.

TAB. ♀.



TAB. ♀.

## DIE MUSKEL DER LIPPEN DES MUNDES.

**FIG. I. vorw. (a, c, d) DER AUFHEBER DER OBERN LIPPE, UND DES NASENFLÜGELS (*Levator labii superioris, alaeque nasi*) Synt. T. & Fig. I. D.**

Er entstehet an dem Nasenfortsatze des Oberkieferbeines (a), und aus einigen fortgesetzten Fasern des Stirnmuskels (b), die hier abgeschnitten erscheinen.

Sein innerer Theil endet sich an dem Nasenflügel (c), sein äußerer aber ist theils in der Haut der obern Lippe, theils in dem Kreismuskel der Lippen (d) befestiget.

— hebet die obere Lippe, und den Nasenflügel in die Höhe.

**FIG. I. vorw. (e, f) DER AUFHEBER DER OBERN LIPPE (*Levator labii superioris*) Synt. T. & Fig. I. E.**

Er entstehet an dem untern Augengrubenrande (e) bis zum Jochbeine hin.

— endet sich in der Haut, und in dem Kreismuskel (f), wie der vorige.

— hebet die obere Lippe in die Höhe, und schwellt daher, in Vereinigung mit dem vorigen, die Haut über der obern Lippe in dieser Gegend an.

**FIG. I. vorw. (g, h) DER KLEINERE JOCHMUSKEL (*Zygomaticus minor*) Synt. T. & Fig. I. F.**

Er entstehet an dem vordern Theile der äußern Fläche des Jochbeines (g).



- endet sich, wie der vorige, nur mehr auswärts, an der obern Lippe (*b*)
- hebet die obere Lippe auf, und ziehet sie etwas zur Seite.

**FIG. II. III. (*t, u, p*) vorw. DER AUFHEBER DES MUNDWINKELS**  
(*Levator anguli oris*) Synt. T. ☞ Fig. I. c. II. h.

Er entstehet in der Grube des Oberkiefers (*t*).

- endet sich in dem Kreismuskel an dem Mundwinkel (*u*), und ein Theil seiner Fasern läuft in den Niederdrücker des Mundwinkels fort (*p*).
- hebet den Mundwinkel in die Höhe.

**FIG. I. II. III. (*i, k, l, m, n*) vorw. DER GRÖßERE JOCHMUSKEL**  
(*Zygomaticus major*) Synt. T. ☞ Fig. I. h. IV. n.

Er entstehet an der äußern Fläche des Jochbeines (*i*) nahe an dessen unterem Rande.

Gleich am Mundwinkel scheidet er sich in zwey Theile, in den vordern, der sich in den Niederdrücker des Mundwinkels (*k*) und in den Niederdrücker der unteren Lippe (*l*) verlieret; und in den hintern, der an dem Backenmuskel liegt, und theils in den Kreismuskel der Lippen (*m*) theils in den Niederdrücker des Mundwinkels (*n*) fortgeht.

- ziehet den Mundwinkel schief auswärts in die Höhe, und erhebt daher die Haut der Wange.

**FIG. I. II. III. IV. (*o, k, p, q, r, s*) vorw. DER NIEDERDRÜCKER DES MUNDWINKELS** (*Depressor anguli oris*) Synt. T. ☞ Fig. I. n. IV. o.

Er entstehet an der äußern Lefze des untern Randes vom Unterkieferbeine (*o*) seitwärts des Kinnes.

Bey dem Mundwinkel verlängert er sich in den vordern Theil des größern Jochmuskels (*k*), in den Aufheber des Mundwinkels (*p*), und in den vordern Theil des Kreismuskels an der obern Lippe (*q*), und endlich rückwärts in den hintern Theil des größern Jochmuskels (*r*), und in den Kreismuskel (*s*).

- ziehet den Mundwinkel abwärts, und zugleich auswärts.

**FIG. I. V. VIII. (*v, w, x*) vorw. DER NIEDERDRÜCKER DER UNTERN LIPPE** (*Depressor labii inferioris*) Synt. Tab. ☞ Fig. I. l. II. m.

Er entstehet ebenfalls an der äußern Lefze des untern Randes am Unterkieferbeine (*v*), nur etwas höher, als der vorige, auch wird er zum Theil von einigen fortgesetzten Fasern des breitesten Halsmuskels gebildet (*w*).

- endet sich an dem Kreismuskel (*x*), wo dieser den rothen Theil der untern Lippe einnimmt.

- drücket die untere Lippe abwärts, und zugleich etwas zur Seite.

**FIG. IV. VI. vorw. VII. seitw. (*a, b, c, d*) DER BACKENMUSKEL**  
(*Buccinator*) Synt. Tab. ☞ Fig. I. o. II. f. III. k. IV. p.

Er entstehet an dem Hakenfortsatze des innern Gaumflügelfortsatzes (*a*), aus der Fortsetzung des obern Zusammenschnürers des Schlundes (*b*), und endlich an dem Zünglein des Unterkiefers (*c*).

- endet sich in dem Kreismuskel an der obern, und untern Lippe (*d*); in seinem Fortgange ist er fest mit der innern Haut der Backen verbunden.



— zieht den Mundwinkel zurück; wodurch sich die Backen falten, und die innere Backenhaut an die Zähne angedrückt wird.

**FIG. I. II. III. IV. VI. VIII. vorw. (q, s, d, m, u, z) DER KREISMUSKEL DES MUNDES (Orbicularis oris)** Synt. Tab. ☿ Fig. I. K. II. L. III. I. IV. M.

Dieser Muskel ist fast ganz aus den Verlängerungen vorhergenannter Muskel gebildet; so sehen wir nämlich den obern Theil aus der Fortsetzung des Niederdrückers des Mundwinkels (*q* und *s*) und des obern Theiles des Backenmuskels (*d*), wie auch zum Theil aus dem großen Jochmuskel (*m*); den unteren hingegen, aus der Fortsetzung des Aufhebers des Mundwinkels (*u*) und des unteren Theiles des Backenmuskels (*d*) gebildet. Zu diesem unteren Theile kommen auch noch einige Bündel, die an dem Zahnlückenhügel des Hundszahnes entstehen, (*z*) und bey dem Mundwinkel sich mit dem Backenmuskel verbinden.

Er zieht den Mund zusammen, runzelt die Lippen; und drückt selbe vorwärts.

**FIG. IX. vorw. DIE AUFHEBER DES KINNES (Levatores menti)** Synt. Tab. ☿ Fig. I. M. II. N. III. L.

Jeder entstehet an der äußern Fläche des Unterkiefers, nahe an dessen oberem Rande, zwischen der Vereinigung des Unterkiefers und dem Zahnlückenhügel des Hundszahnes (*a*).

Beyde mit einander vereinigt, enden sich an der allgemeinen Bedeckung des Kinnes (*b*).

Sie heben das Kinn, und dadurch zugleich die untere Lippe aufwärts.


**FIG. V. vorw. (a, b, c, d, e) DER BREITESTE HALSMUSKEL (Latissimus colli)** Synt. Tab. ☿ Fig. I. x. IV. v.

Er entstehet an der Haut der Brust (*a*), der Schulter (*b*) und des Seitentheiles des Halses (*c*).

— endet sich am untern Rande des Unterkiefers, nahe am Kinne (*d*), seine äußern Fasern verlängern sich in den Niederdrücker der untern Lippe und in den Niederdrücker des Mundwinkels (*w*); seine äußersten aber enden sich schon bey dem Winkel des Unterkiefers in der Haut (*e*).

— zieht die Haut über dem Winkel des Unterkiefers, und dem Winkel des Mundes zur Seite abwärts, und die Haut über der Brust und der Schulter aufwärts.





1818

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA  
FROM 1789 TO 1801  
BY JAMES MADISON  
VOLUME I  
CHAPTER I  
THE CONSTITUTION  
The Constitution of the United States was adopted on September 17, 1787, and is the supreme law of the land. It is a document that has shaped the course of American history and continues to guide the nation today. The Constitution is a masterpiece of political thought and design, and its principles are as relevant as ever.

CHAPTER II  
THE PRESIDENT  
The President of the United States is the head of the executive branch of the government. He is elected by the people for a four-year term and has the power to veto legislation, appoint and remove judges and other officials, and conduct foreign relations. The President is a powerful figure in the American political system, and his actions can have a significant impact on the nation.

CHAPTER III  
THE JUDICIAL BRANCH  
The Judicial Branch of the government is responsible for interpreting the Constitution and the laws of the United States. It is headed by the Supreme Court, which is composed of nine Justices. The lower courts are also part of the Judicial Branch, and they handle the vast majority of cases. The Judicial Branch is an independent branch of the government, and its decisions are final.

CHAPTER IV  
THE LEGISLATIVE BRANCH  
The Legislative Branch of the government is responsible for making the laws of the United States. It is composed of the Senate and the House of Representatives, which together form Congress. The Senate is made up of two members from each state, and the House of Representatives is made up of members from each state, with the number of members depending on the state's population. Congress has the power to pass laws, approve or reject the President's appointments and vetoes, and declare war.

CHAPTER V  
THE EXECUTIVE BRANCH  
The Executive Branch of the government is responsible for carrying out the laws of the United States. It is headed by the President, who is elected by the people. The President has the power to appoint and remove judges and other officials, and to conduct foreign relations. The Executive Branch is an independent branch of the government, and its actions are subject to the oversight of the other branches.


CHAPTER VI  
THE STATES  
The States of the United States are the building blocks of the nation. Each state has its own government, and the states are equal in power and sovereignty. The states have the right to elect members to Congress, and they have the power to pass laws. The states are an integral part of the American political system, and their actions can have a significant impact on the nation.

CHAPTER VII  
THE TERRITORIES  
The Territories of the United States are areas of land that are not yet part of a state. They are governed by the federal government, and they have the potential to become states. The Territories are an important part of the American political system, and their status is a subject of ongoing debate.

CHAPTER VIII  
THE INDIAN TRIBES  
The Indian Tribes of the United States are the original inhabitants of the land. They have a long and rich history, and they continue to play an important role in American society. The federal government has a responsibility to protect the rights of the Indian Tribes, and to work with them to improve their lives.

CHAPTER IX  
THE FUTURE  
The future of the United States is a topic of great interest and debate. There are many challenges facing the nation, and it is important to work together to address them. The Constitution is a guide to the future, and it is our duty to uphold its principles and values.

TAB. h.



T A B. h

## DIE MUSKEL DES ZUNGENBEINES UND DER ZUNGE.

**FIG. I. vorw. DER RABEZUNGENBEINMUSKEL (*Coracobyoideus*)**  
Synt. T. C Fig. I. a Fig. II. x.

Er entstehet an dem oberen Rande des Schulterblattes bey dem kleinsten Einschnitte, der an der Wurzel des rabenähnlichen Fortsatzes sich findet (a).

— endet sich an der unteren Gegend des Endtheiles am Grunde des Zungenbeines, wo dieser sich mit dem grossen Horne verbindet (b).

— zieht das Zungenbein rück- und abwärts auf seine Seite; wo er sich vorwärts um den Hals krümmt, und dann in eine Zwischensehne verwandelt, wird er durch eine etwas fehnige Haut an das Schlüsselbein angeheftet.

**FIG. II. unterw. DIE MAHLZUNGENBEINMUSKEL (*Mylohyoidei*).**  
Synt. Tab. C Fig. II. a. III. o.

Jeder entstehet an der ganzen schiefen Linie, die von dem letzten Mahlzahne bis zur Vereinigung des Unterkiefers läuft (a).

Sie enden sich größtentheils ineinander (b), der unterste Theil aber endet sich an dem Grunde des Zungenbeines, an dessen unterer und vorderer Gegend (c).

Sie drücken die über sich liegenden Theile in die Höhe, und heben zugleich das Zungenbein.

**FIG. III. seitw. DER GRIFFELZUNGENBEINMUSKEL (*Stylohyoideus*)**  
Synt. Tab. C Fig. II. r. IV. s. Tab. \* Fig. I. d,

Er entstehet an dem Griffelfortsatze (a).

— endet sich an dem Zungenbeine, wo sich dessen Grund mit dem grossen Horne verbindet (b).

— zieht das Zungenbein auf- und rückwärts zur Seite,

Sie



**FIG. IV. unterw. DER KINNZUNGENBEINMUSKEL (*Geniobyoides*)**  
Synt. T. \* Fig. II. κ.

Er entsteht an dem innern rauhen Hügel der Vereinigung des Unterkieferbeines (a).

— endet sich an der oberen vordern Gegend des Grundes am Zungenbeine (b).

— hebet das Zungenbein vor- und aufwärts.

**FIG. V. vorw. DER BRUSTBEINZUNGENBEINMUSKEL (*Sternobyoides*)**  
Synt. T. ☾ Fig. I. γ. Fig. II. ο.

Er entsteht an dem Rande der Gelenkhöhle des Brustbeines, wo das vordere Ende des Schlüsselbeines mit ihr zusammenhängt (a), an dem Knorpel der ersten Rippe (b), und an dem Bande, welches das Schlüsselbein an ihn befestiget.

— endet sich an dem unteren Theile des Grundes am Zungenbeine (c) gegen die Mitte desselben.

— zieht das Zungenbein abwärts, und etwas zur Seite.

**FIG. VI. seitw. IX. (a, b) unterw. DER GRUNDZUNGENMUSKEL (*Basioglossus*)**  
Synt. T. ☾ Fig. II. s. III. p. Tab. \* Fig. I. f. II. g. III. f. IV. κ. V. η.

Er entsteht an dem Grunde, und dem daran stossenden grossen Horne des Zungenbeines (a).

— endet sich an dem vorderen und Seitentheile der Zunge (b).

— zieht die Zunge ab- und einwärts.

**FIG. VI. seitw. IX. unterw. (c, d) DER HORNZUNGENMUSKEL (*Ceratoglossus*)**  
Synt. T. ☾ Fig. I. α. Tab. \* Fig. I. g. II. III. f. IV. κ. V. η.

Er entsteht an dem grossen Horne des Zungenbeines (c), von der Spitze bis zu dessen Grunde.

— endet sich an dem hinteren und Seitentheile der Zunge (d).

— wirkt, wie der vorige.

**FIG. VI. VII. seitw. VIII. IX. unterw. (e, f, i,) DER GRIFFELZUNGENMUSKEL (*Styloglossus*)**  
Synt. T. \* Fig. II. III. f. IV. i. V. g

Er entsteht an der Spitze des Griffelfortsatzes (e).

— endet sich an dem Seitenrande der Zunge, bis zur Spitze derselben (f): in seinem Laufe verbindet er sich mit den Zungenmuskeln, die von dem Zungenbeine herkommen, genau: auch hat er ein eigenes HÄNGEBAND (*Ligamentum suspensorium M. Styloglossi*) Fig. VIII. g. b). Dieses vierseitige Band ist an dem Winkel, und dem hinteren Rande des Astes am Unterkieferbeine befestiget (g); von da es sich ab- und einwärts verläuft, und an das Griffelzungenbeinband anhänget (b); wodurch der Griffelzungenmuskel eine andere Richtung bekommt, und in dieser erhalten wird.

— zieht die Zunge schief zur Seite, und rückwärts; wenn sie aber niedergedrückt ist, so hebet er sie in die Höhe: wirken aber beyde zusammen, so breiten sie die Zunge aus: das Zungenbein kann er ebenfalls heben, da sich einige seiner Fasern in den Hornzungenmuskel verlaufen (i).

**FIG. VII. seitw. (k, l) DER KNORPELZUNGENMUSKEL (*Chondroglossus*)**  
Synt. T. \* Fig. IV. n.

Dieser kleine Muskel, der zuweilen mangelt, entsteht an dem knorplichten Horne des Zungenbeines (k).

— endet sich an dem untern Seitentheile der Wurzel der Zunge, indem er seine Fasern mit denen des Kinnzungenmuskels vermengt (l).

— zieht die Zunge ab- und einwärts.

FIG.



**FIG. VII. seitw. VIII. IX. unterw. (*m, n, o, p, q, r*) DER KINNZUNGEN-  
MUSKEL (*Genioglossus*) Synt. T.\* Fig. II. i. III. h. IV. m. V. k.**

Er entstehet an dem inneren rauhen Hügel der Vereinigung des Unterkiefers (*m*), von welchem er sich strahlenförmig ausbreitet, und an dem ganzen untern Theile der Zunge endet; auch verlieret sich der untere Theil seiner Fasern in dem Grunde (*n*) und knorplichten Horne des Zungenbeines (*o*): bey seinem Ende vermengt er sich mit dem Zungenmuskel (*p*), mit dem Hornzungenmuskel, und mit dem obern Zusammenschnürer des Schlundes (*q*), und endlich mit dem Knorpelzungenmuskel (*r*). Wo sich beyde Kinnzungenmuskel an dem hinteren Theile der Wurzel der Zunge, miteinander verbinden; da senden sie einige Fasern zu dem Rücken des Kehldeckels, wodurch der Kehldeckel vorwärts aufgerichtet wird.


**FIG. VI. VII. seitw. IX. unterw. (*p, s*) DER ZUNGENMUSKEL (*Lingualis*) Synt. T. \* Fig. III. g. IV. l. V. i.**

Dieser Muskel läuft an der unteren Gegend der Zunge von der Wurzel (*p*) zur Spitze (*s*) derselben, indem er seine Fasern mit allen Muskeln der Zunge verschiedentlich vermengt.

— verkürzt und krümmet die Zunge abwärts, und zieht die Spitze derselben rückwärts.







TAB. Ω

DIE MUSKEL DES GAUMVORHANGES.

FIG. I. *unterw.* (*a, b,*) DER AUFHEBER DES WEICHEN GAUMS (*Levator palati mollis*) Synt. Tab. \* Fig. II. III. IV. V. B. VII. D. VIII. C. IX. B. X. XI. A.

Er entsteht an dem knöchernen, und knorplichten Theile der Eustachischen Trompete (*a*).

— endet sich in dem weichen Gaum (*b*), wo er sich mit den Fasern des nämlichen Muskels der anderen Seite verbindet.

— hebt den Gaumvorhang rückwärts in die Höhe, wodurch dieser gewölbt, und die hintern Nasenöffnungen verschlossen werden.

FIG. I. II. *unterw.* (*c, d, e*) DER UMSCHLUNGENE GAUMENMUSKEL (*Circumflexus palati*) Synt. Tab. \* Fig. II. III. IV. V. A. VI. G. VII. E. VIII. D. IX. C. X. XI. B. XII. XIII. A.

Er entsteht an dem knöchernen Theile der Eustachischen Trompete, an dem Dornfortsatze des Keilbeines, und an dem knorplichten Theile gesagter Trompete (*c*), wie auch an der äußern Fläche des innern Gaumflügelfortsatzes am Keilbeine (*d*).

— endet sich, nachdem er seine Sehne über den Haken des innern Gaumflügelfortsatzes geschlungen hat, theils an dem hinteren Rande des Gaumknochens (*e*), theils an dem Gaumvorhange in dem nämlichen Muskel der andern Seite.

— spannet den obern Theil des Gaumvorhanges vor- und abwärts; auch bewege er die Eustachische Trompete in etwas abwärts, und verengt sie dadurch.

FIG. III. *vorw.* DER ZUSAMMENSCHNÜRER DER RACHENENGE (*Constrictor istmi faucium*) Synt. Tab. \* Fig. XIV. D.

Er entsteht an dem obern Theile des Randes der Zungenwurzel (*a*): von hier steigt er bogenförmig zu dem Gaumvorhange, wo er sich mit seinem Gespanne vereinigend (*b*) endet, auch ist er mit dem Gaumschlundmuskel (*c*) fest verbunden.

Diese beyden Muskel ziehen den Gaumvorhang abwärts gegen die Zunge, und so im Gegentheile die Zunge zum Gaume, wodurch also der Eingang in den Rachen zusammengeschnüret wird.


FIG. IV. *rückw.* DER UNGEPAARTE MUSKEL DES ZÄPFLEINS (*Azygus uvulae*) Synt. Tab. \* Fig. X. C.

Er entsethet in der Mitte der sehnigen Haut, die bey den hinteren Nasenöffnungen zum Gaumvorhange herabläuft (*a*).


— endet sich in der Spitze des Zäpfleins (*b*).

— verkürzt das Zäpflein, indem er es vorwärts aufhebet.





TAB. Δ.



T A B. Δ

## DIE MUSKEL DES SCHLUNDES.

**FIG. I. seitw. II. rückw. (a, b, c) DER UNTERE ZUSAMMENSCHNÜRER DES SCHLUNDES** (*Constrictor pharyngis inferior*) Synt. T. \* Fig. I. K. II. o. III. l. VI. A.

Er entsteht an dem unteren und Seitentheile des Ringknorpels (a) wo sich auch einige Fasern des Ringschildmuskels in ihm fortsetzen, an dem kleineren Fortsatze, und an der erhobenen Linie der äußeren Fläche des Schildknorpels (b).

Seine unteren Fasern laufen quer, die oberen aber mehr aufwärts, über den hinteren Theil des Schlundes, und enden sich in der Mitte in die Fasern des nämlichen Muskels der anderen Seite (c), indem sie sich an die unterliegenden Muskel des Schlundes anheften.

Er schnüret den Schlund zusammen, und verengt daher dessen Höhle. **FIG. I. seitw. II. III. rückw. (d, e, f) DER MITTLERE ZUSAMMENSCHNÜRER DES SCHLUNDES** (*Constrictor pharyngis medius*)

Synt. T. \* Fig. I. l. II. n. III. k. VI. d. VII. A.

Er entsteht an der Spitze des größeren (d) und kleineren Hornes (e) am Zungenbeine, von welchem er sich strahlenweise nach oben und unten verbreitet, daher auch die unteren Fasern abwärts, die mittleren quer, und die oberen aufwärts laufen, und sich in der Mitte des hinteren Theiles des Schlundes mit denen der anderen Seite verbinden (f); ganz oben befestiget er sich fehnig an den Grundfortsatz des Hinterhauptbeines (g).

— verengt den Schlund, hebet ihn und die Kehle in die Höhe, wodurch der erstere kürzer gemacht wird.

**FIG. I. seitw. II. IV. rückw. (b, i, k, l, m, n, o, p) DER OBERE ZUSAMMENSCHNÜRER DES SCHLUNDES** (*Constrictor pharyngis superior*) Synt. T. \* Fig. I. II. m. III. i. VI. e. VII. B. VIII. A.

Er entsteht aus dem umschlungenen Gaummuskel (b), an dem Häkchen und einem kleinen Theile des inneren Gaumflügelfortsatzes des Keilbeines (i),  
dann



dann aus der Fortsetzung des Backenmuskels (*k*) und des Kinnzungenmuskels (*l*), an der inneren Fläche des Unterkiefers, gleich unter dem hinteren Loche des Kanal im Unterkiefer (*m*), und endlich aus dem Seitentheile der Zunge (*n*).

Seine Fasern, die gekrümmt aufwärts steigen, enden sich ebenfalls in die nämlichen des zur anderen Seite gelegenen (*o*), und an dem Grundfortsatze des Hinterhauptbeines (*p*).

— schnüret den oberen Theil des Schlundes zusammen, und zieht ihn vor- und aufwärts.

**FIG. VI. VII. rückw. (*a, b*) DER TROMPETENSCHLUNDMUSKEL**  
(*Salpingopharyngeus*) Synt. T. \* Fig. X. E.

Er entstehet an dem unteren und vorderen Theile des knorplichten Theiles der Eustachischen Trompete (*a*) von welcher er abwärts läuft, und sich in dem Gaumenschlundmuskel (*b*) verlieret.

— zieht den Schlund vorwärts in die Höhe, und verkürzt ihn.

**FIG. V. vorw. VI. VII. VIII. rückw. IX. seitw. DER GAUMSCHLUNDMUSKEL**  
(*Palatopharyngeus*). Synt. Tab. \* Fig IV, E. IX. X. XI. D. XII. C. XIV. F.

Er entstehet mit seinem hinteren oder oberen Theile an dem hinteren Rande der Gaumknochen, aus der sehnigen Haut (*c*), die bey den hinteren Nasenöffnungen über den Gaumvorhang läuft, und aus der sehnigen Ausbreitung des umschlungenen Gaummuskels (*d*); mit seinem vorderen oder unteren Theile aber entstehet er vorwärts an der sehnigen Ausbreitung des umschlungenen Gaummuskels (*e*), und endlich verbinden sich seine Fasern in der Mitte des Gaumvorhanges mit dem nämlichen Muskel der anderen Seite (*f*). Der ganze Muskel wendet sich rück- und abwärts, wo er sich mit dem Griffelschlundmuskel vereinigt (*g*) und theils an dem Seitenrande des Kehldeckels (*h*) und an dem oberen Rande des Schildknorpels (*i*) endet, theils rückwärts über den Schlund laufend sich mit seinem Gespanne verbindet (*k*) und nach unten in der Haut des Schlundes verlieret (*l*).

Wenn beyde zugleich wirken ziehen sie den weichen Gaum abwärts, und den Schlund aufwärts, wodurch der Schlund kürzer, und schlaffer gemacht wird, auch schürren sie den letzteren zusammen.

**FIG. VI. VII. rückw. IX. seitw. DER GRIFFELSCHLUNDMUSKEL**  
(*Stylopharyngeus*) Synt. Tab. \* Fig. II. L. VII. F. VIII. IX. E. X. F. XI. C. XII. D.

Er entstehet an dem inneren und unteren Theile des Griffelfortsatzes (*m*).

— endet sich, vereinigt mit dem Gaumenschlundmuskel (*g*), an dem Schlunde (*n*) und an dem hinteren Rande des Schildknorpels (*o*).


— zieht den Schlund samt der Kehle rückwärts in die Höhe, wodurch der Schlund kürzer wird; wenn aber beyde zugleich wirken, so erweitern sie denselben.

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text appears to be organized into several paragraphs or sections, but the characters are too light to transcribe accurately.]*





TAB. ♂.



T A B. ♂

### DIE MUSKEL DER KEHLE.

**FIG. I. vorw. DER BRUSTBEINSCHILDMUSKEL (Sternothyroideus)**  
Synt. T. ☿ Fig. I. z. II. y. III. s.

Er entsteht an der inneren Fläche des oberen Stückes des Brustbeines (*a*) und an dem daranstoßenden Knorpel der ersten Rippe (*b*).

— endet sich an der erhobenen Linie der äußeren Fläche (*c*) und über dem unteren Rande des Schildknorpels (*d*).

— zieht den Schildknorpel, und also die ganze Kehle, abwärts und zur Seite.

**FIG. II. vorw. DER ZUNGENBEINSCHILDMUSKEL (Hyothyroideus)**  
Synt. T. ☿ I. b. III. T.

Er entsteht an dem unteren Theile des Grundes (*a*), und der vorderen Hälfte des großen Hornes am Zungenbeine (*b*).

— endet sich an eben dieser erhobenen Linie der äußeren Fläche des Schildknorpels (*c*) gleich über dem vorigen.

— zieht entweder den Schildknorpel in die Höhe, oder das Zungenbein herab, nachdem der eine, oder der andere Theil festgehalten wird.

**FIG. III. vorw. IV. V. seitw. DER RINGSCHILDMUSKEL (Cricothyroideus)** Synt. T. ☿ Fig. III. R.

Dieser Muskel bestehet gewöhnlich aus zwey Theilen, dem vorderen, und hinteren: beyde entstehen an der Seite des vorderen Theiles des Ringknorpels (*a*).

Der vordere endet sich an dem unteren Rande des Schildknorpels (*b*); der hintere aber sendet einige Fasern zu dem unteren Zusammenschnürer des Schlundes (*c*), die hier abgeschnitten sind, und endet sich, etwas höher, an dem kleineren Fortsatze (*d*) des Schildknorpels.



Er nähert den Schildknorpel dem Ringknorpel entweder durch Auf- und Rückwärtsziehen des Ringknorpels, oder durch Ab- und Vorwärtsziehen des Schildknorpels.

**FIG. VII. rückw. X. seitw. (a, b) DER HINTERE RINGGIESSKANNENMUSKEL** (*Cricoarytænoideus posticus*) Synt. T. \* Fig. X. N. XV. A.

Er entstehet an dem Seitentheile der hinteren Fläche des Ringknorpels (a). — endet sich an dem hinteren Hügel des Grundes des Giefskannenknorpels (b).

— zieht den Giefskannenknorpel aus und rückwärts, wendet zugleich die innere Gegend desselben etwas vorwärts, wodurch die Stimmritze erweitert wird.

**FIG. VII. vorw. IX. seitw. (c, d, e) DER SCHIEFE GIESSKANNENMUSKEL** (*Arytænoideus obliquus*) Synt. T. \*. F. X. E.

Er entstehet an dem hinteren und äußeren Theile des Grundes des Giefskannenknorpels (c): von hier läuft er schief über den anderen Giefskannenknorpel, und theilet sich alsdann in zwey Schenkel, von welchen der obere Theil sich an dem Seitenrande des Kehldeckels endet (d), der untere aber in den Schildgiefskannenmuskel verlieret (e).

— nähert die Giefskannenknorpel einander, wodurch die Stimmritze verengert wird.

**FIG. VI. rückw. DER QUEERE GIESSKANNENMUSKEL** (*Arytænoideus transversus*) Synt. T. \*. F. X. M.

Dieser ungepaarte Muskel entstehet an der hinteren Gegend des einen Giefskannenknorpels (a), und endet sich an der nämlichen Gegend des anderen (b).

— wirkt, wie der vorige.

**FIG. VIII. seitw. DER SEITWÆRTIGE RINGGIESSKANNENMUSKEL** (*Cricoarytænoideus lateralis*) Synt. T. \* Fig. XV. B.

Er entstehet an dem schiefaufsteigenden Rande des Seitentheiles des Ringknorpels (a).

— endet sich an der Seite des Grundes des Giefskannenknorpels (b).

— zieht den Giefskannenknorpel aus und vorwärts: wodurch die innere Stimmritze etwas verengert, die äußere aber etwas erweitert wird.

**FIG. IX. X. seitw. (f, g, h) DER SCHILDGIESSKANNENMUSKEL** (*Thyrearytænoideus*) Synt. T. \* Fig. XV. c.

Er entstehet an dem unteren Theile der inneren Fläche des Schildknorpels (f) nahe an dessen Mitte, und an dem Bande, welches den Schildknorpel an den Ringknorpel vorwärts bindet (g).

— endet sich an dem vorderen Rande des Giefskannenknorpels (h).

Beide wirkend, drücken die innere Stimmritze stärker, als der vorhergehende, zusammen.

**FIG. XI. XII. seitw. (i, k, l) DER ZWEYTE, ODER KLEINERE SCHILDGIESSKANNENMUSKEL** (*Thyrearytænoideus alter, minor*) Synt. T. \* Fig. XV. G.

Er entstehet an dem inneren und oberen Theile des Schildknorpels (i) gleich neben dem herzförmigen Einschnitte desselben.



— endet sich an der äusseren Gegend des Giefskannenknorpels (*k*), und wird zuweilen von einem Bündel des Schildkehldeckelmuskels durchbohret, wie in der XII. Fig. (*l*) zu sehen ist.

**FIG. IX. XII. seitw. (*m, n, o*) DER GRÖSSERE SCHILDKEHLDECKELMUSKEL (*Thyreopiglotticus major*) Synt. T. \* Fig. XV. D.**

Er entsteht an dem unteren Theile der inneren Fläche des Schildknorpels (*m*) gleich neben dem grösseren Schildgiefskannenmuskel; auch findet man zuweilen ein Nebenbündel, welches an dem äusseren Theile des schiefauft steigenden Seitenrandes des Ringknorpels (*n*) entspringt.

— endet sich an dem Seitenrande des Kehldeckels (*o*).

— drückt den Kehldeckel nieder.

**FIG. XI. seitw. (*p, q*) DER KLEINERE SCHILDKEHLDEKELMUSKEL (*Thyreopiglotticus minor*) Synt. T. \* Fig. XV. D.**

Er entsteht oben an der Mitte der inneren Fläche des Schildknorpels (*p*)




— endet sich ebenfalls an dem Seitenrande des Kehldeckels (*q*)

— wirkt, wie der vorige.

---









## T A B.    ⓪

### DAS ZWERCHFELL (*Diaphragma*)

*FIG. I. vorw. B, C, G. der vordere Theil der oberen Fläche. A, A der hintere Theil der unteren Fläche. FIG. II. vorw. der ganze hintere Theil der unteren Fläche. FIG. III. rückw. der ganze hintere Theil der oberen Fläche. FIG. IV. seitw. die obere Fläche des Seitentheiles, FIG. V. die ganze untere Fläche; nach Hallers Fascikeln.*

Dieser ungepaarte Muskel ist so gelagert, daß er quer zwischen der Brust- und Bauchhöhle eine Scheidewand bildet, welche diese beyden Höhlen von einander absondert; und deswegen ist er rings an dem untern Rande der knöchernen Brusthöhle befestiget. Man pfleget ihn in zwey Theile abzuthellen: in den hinteren, den man den Lendentheil, oder auch den kleineren Muskel, nennet (A); und in den vorderen (B), der sich auch nach beyden Seiten erstrecket (C), und der Rippentheil, oder der grössere Muskel des Zwerchfelles, genannt wird.

Der Lendentheil entsteht gewöhnlich durch acht, oder sechs Schenkel, wovon vier oder drey an einer, und eben soviel an der andern Seite sich befinden. Die mittleren zwey sind die stärksten und längsten von allen; doch ist der rechte etwas grösser, als der linke: beyde mit einander vereinigt, entstehen an dem untern Rande des Körpers des dritten Lendenwirbelbeines (a), und vermittelst einer dünnen Sehne an der vorderen langen Binde der Wirbelbeine (d), auch befestigen sie sich an das Zwischenwirbelband des dritten und vierten Wirbelbeines. Die zwey folgenden Schenkel entspringen, bey dem untern Rande des Körpers des zweyten Lendenwirbelbeines, aus dem daselbst befindlichen Zwischenwirbelbeinbande (b). Andere zwey erhalten ihren Ursprung, an den Seiten der erstgenannten, aus dem Körper des zweyten Lendenwirbelbeines (e). Die äußersten zwey endlich entstehen an den Wurzeln der Queerfortsätze des zweyten Lendenwirbelbeines (c). Zu diesen Ursprüngen kömmt zuweilen, an einer oder auch an beyden Seiten, ein bogenförmiges Bündel, welches den unteren Rand des Zwerchfelles bildet, an dem Queerfortsatze des zweyten und ersten Lendenwirbelbeines (b) entstehet, von hier gekrümmt zum Knorpel der zwölften Rippe (12) läuft; und sich daselbst endet. Bisweilen entspringt auch in Theil aus dem viereckichten Lendenmuskel (e).

Von diesen Ursprüngen steigen die Fleischfasern auf und vorwärts, indem sich zugleich die mittleren Schenkel miteinander verbinden, und ihre Fasern so vermengen, daß einige des rechten Schenkels links, einige des linken aber rechts laufen, und dadurch nach unten eine Oefnung bilden, die man die Spalte, oder die untere Oefnung des Zwerchfelles (E), nennet. Durch diese Verbindung, neue Trennung, und abermahlige Vereinigung, wird sodann eine zweyte Oefnung hervorgebracht, die das fleischige, länglichte, oder linke Loch des Zwerchfelles (F) heisst: zuletzt verlieren sie sich in der sehnigen Ausbreitung.



Der Rippentheil entsteht vorwärts an der hinteren Fläche des Schwertknorpels (*f*) an dem siebenten und achten Rippenknorpel (7. 8) und an den vordern Enden und Knorpeln der vier untersten Rippen (9—12), wo sich diese zackichten Ursprünge in die Zacken der queeren Bauchmuskeln fügen.


Alle diese Fleischbündel, die das Zwerchfell bilden, steigen von allen Seiten gegen die Brusthöhle aufwärts, und neigen sich gegen die Mitte derselben, um eine Wölbung (*D*) zu machen, die rechts höher, als links, gegen die Brusthöhle emporragt, und in der Mitte von einer Seite nach der andern etwas ausgehöhlet ist. Hier werden sie alle fehnig, und bilden, durch ihre Verwebung, die fehnige Ausbreitung (*G*), die deswegen der fehnige Mittelpunkt (*Centrum tendineum*), oder, ihres besondern Glanzes wegen, der Helmontische Spiegel (*Speculum Helmontii*) genannt wird: die Seitentheile dieser Ausbreitung bekommen noch den besondern Namen der fehnigen Flügel des Zwerchfelles (*g*). Ferner findet man, gegen die rechte Seite, im fehnigen Mittelpunkte die dritte Oefnung, welche das fehnige, rechte, oder viereckichte Loch (*H*) genannt wird.

Wenn die Fleischfasern des Zwerchfelles sich zusammenziehen, so spannen sie den fehnigen Mittelpunkt an, wodurch die Wölbung flacher, die Brusthöhle erweitert, und das Einathmen bewirkt wird: eben dadurch werden aber auch die Baueingeweide gedrückt, und alle Verrichtungen derselben befördert. Endlich ist es auch bey dem Niederschlucken der Speisen wirksam.





TAB. ♂.



TAB. ♀

## DIE MUSKEL DER MÄNNLICHEN ZEUGUNGSTHEILE, UND DES AFTERS.

FIG. I. *vorw.* (a) DIE BESCHLEUNIGER (*Acceleratores*).

Jeder entsteht an der obern Gegend der Seite der Harnröhre, wo diese sich mit den schwammichten Körpern der Ruthe verbindet, daher man ihren Ursprung in der Figur nicht sehen kann: sie laufen alsdann vor- und abwärts, und vereinigen sich in der Mitte mit einander (a), wodurch sie die Zwiebel sammt den schwammichten Körper der Harnröhre einschliessen. Rückwärts verbinden sie sich genau mit dem äußeren Schließmuskel des Afters, von dem sie auch zuweilen einige Fasern erhalten.

Sie spannen, bey aufgerichteter Ruthe, den schwammichten Körper der Harnröhre, wodurch diese gedrückt, und der Ausfluß des Harns und Saamens beschleuniget wird.

FIG. I. *vorw.* II. *rückw.* (b, c) DER AUFRICHTER DER RUTHE (*Erektor penis*).

Er entsteht an der inneren Fläche der Wurzel des aufsteigenden Afters des Sitzbeines (b), wendet sich bey dem vorderen Rande desselben vorwärts, und endet sich an dem Anfange des schwammichten Körpers der Ruthe (c).

— zieht den schwammichten Körper rück- und abwärts, und drückt ihn, wodurch er kürzer, mit Blut strotzend mehr gespannt, und daher die Ruthe aufgerichtet wird.

FIG. I. *vorw.* III. *rückw.* (d, e) DER QUEERE MUSKEL DES DAMMES (*Transversus perinaei*).

Er entsteht an der inneren Gegend der Rauigkeit des Sitzbeines (d).

— endet sich theils an dem Beschleuniger, theils in dem äußeren Schließmuskel des Afters, und in dem nämlichen der anderen Seite (e).



— zieht den Damm, sammt dem After, rückwärts: beyde zugleich wirkend, drücken das Ende des Mastdarmes.

**FIG. I. vorw. IV. rückw. (f, g) DER ZWEYTE QUEERE MUSKEL DES DAMMES** (*Transversus perinei alter*).

Er entstehet an der inneren Fläche des Sitzbeines (f) etwas höher, als der vorige.

— endet sich zwischen dem schwammichten Körper der Ruthe, und dem Beschleuniger (g). und wirkt wie der vorige.

**FIG. V. vorw. DER HÆNGEMUSKEL DER HODE** (*Cremaster*).

Er entstehet aus einigen Fasern des äußeren schiefen und queeren Bauchmuskels (a).

— endet sich, ausgebreitet, an der Scheidehaut der Hode (b), welche er hängend erhält, und gegen den Bauchring aufwärts hebet.

**FIG. VI. rückw. VII. vorw. DER ÄUSSERE SCHLIESSMUSKEL DES AFTERS** (*Sphincter externus ani*).

Dieser ungepaarte Muskel windet sich um die Oefnung des Afters von hinten, zu beyden Seiten, nach vorne. Die Gestalt dieses Muskels steht mit der Oefnung, welche rundlich ist, in gleichem Verhältniß; nur sind die äußeren Bündel rück- und vorwärts zugespitzt. Die hintere Spitze ist an dem Schwanzbeine (a), die vordere aber an den Beschleunigern und queeren Dammuskeln befestiget (b): übrigens aber ist er, in seinem ganzem Laufe, an die Haut des Afters angeheftet.

— zieht die Haut des Afters zusammen, und den Damm rückwärts, wodurch die Beschleuniger befestiget, und der Theil der Harnröhre im Damme zusammengedrückt wird.

**FIG. VIII. vorw. IX. rückw. (a) DER INNERE SCHLIESSMUSKEL DES AFTERS** (*Sphincter internus ani*).

Dieser Muskel bestehet nur aus einem fleischigen Ringe (a), dessen Fasern um das Ende des Mastdarmes (b) und die Afteröffnung (c) laufen, wodurch letztere zusammengeknüpft werden.

**FIG. VIII. vorw. IX. rückw. X. seitw. von außen an der linken Seite XI. seitw. von innen an der rechten Seite (c, d, e, f, g, h, i) DIE AUFHEBER DES AFTERS** (*Levatores ani*).

Diese beyden Muskel bilden einigermaßen einen Trichter, der, mit seinem engeren Theile, den Mastdarm und die Zwiebel der Harnröhre einschlieset. Jeder entstehet an der inneren Fläche des queeren (d) und des absteigenden Schenkels des Schaambeines (e), von welchem seine Sehne bis zu dem Stachel des Sitzbeines (f) läuft, und endlich in dem Winkel (g), der sich zwischen dem schwammichten Körper der Harnröhre und Ruthe findet.

Von diesem seinem Ursprunge läuft er abwärts und rückwärts, so daß er sich mit seinem untern Rande an den Mastdarm fest anheftet. Einige seiner Fasern enden sich an der vorderen Fläche des untersten Stückes des Schwanzbeines (h); die anderen hingegen verbinden sich mit den nämlichen Fasern des, von der anderen Seite kommenden, Aufhebers (i).

Beyde zugleich ziehen das Ende des Mastdarmes vor- und aufwärts, und pressen es zusammen.

**FIG.**

---

**FIG. XII. seitw. von der linken Seite DER MUSKEL DER HARNBLASE**  
(*Musculus vesicae*)

Dieser Muskel findet sich sehr selten; wenn er aber zugegen ist, so entsteht er an der inneren Fläche des Schaambeines, nahe an der Knorpelvereinigung (*a*); läuft sodann an der Seite der Harnblase, und verlieret sich, gegen die hintere Fläche, in die Fasern der Muskelhaut an der Harnblase (*b*).

— drückt die Harnblase an die Schaambeine, wodurch sie des in ihr enthaltenen Harnes entleeret wird.

---





T A B. 5

DIE MUSKEL DER WEIBLICHEN ZEUGUNGSTHEILE, UND DES AFTERS.

**FIG. I. vorw. (a, b, c, d) DER ZUSAMMSCHNÜRER DER WEIBLICHEN SCHAAM (Constrictor cunni).**

Er entsteht an dem unteren und hinteren Theile des schwammichten Wefens der Schaam (a), dann aus einigen Bündeln des äußeren Schließmuskels des Afters (b); läuft sodann aufwärts an der Seite der Scheide zur weiblichen Ruthe, wo er sich theils an dem Körper (c), und theils an dem Schenkel (d) derselben endet.

— zieht die weibliche Schaam zusammen, drückt das schwammichte Wefen derselben, und zieht die Ruthe abwärts.

**FIG. I. vorw. (e, f,) DER AUFRICHTER DER WEIBLICHEN RUTHE (Erector Clitoridis).**

Er entsteht, gleich dem männlichen, an der inneren Fläche des aufsteigenden Afters des Sitzbeines (e); und endet sich an dem schwammichten Körper der weiblichen Ruthe (f).

— drückt den schwammichten Körper der Ruthe ab- und rückwärts, wodurch derselbe, wenn er mit Blut strotzet, gespannt, und kürzer gemacht wird.

**FIG. I. vorw. (g) DER QUEERMUSKEL DES MITTELFLEISCHES (Transversus perinaei).**

Er entsteht an der inneren Fläche des Sitzbeines, neben dem Aufrichter der Ruthe, und endet sich da, wo der Zusammenschnürer einige Bündel aus dem äußeren Schließmuskeln des Afters erhält, in das Mittelfleisch (g).

— drückt das Mittelfleisch nieder; beyde aber spannen dasselbe.

**FIG. II. seitw. von aussen an der linken Seite. III. seitw. von innen an der rechten Seite. DER AUFHEBER DES AFTERS (Levator ani).**

Er entsteht, so, wie der männliche, an der inneren Fläche des queeren, und absteigenden Schenkels des Schaambeines (a), dann aus der Sehne, welche von dem Schaambeine (b) bis zu dem Stachel des Sitzbeines (c) läuft, und aus dem Stachel selbst; läuft sodann an der Seite der Mutterscheide (d), an welcher er festhängt, zu der Afteröffnung (e), verbindet sich daselbst mit dem inneren Schließmuskeln des Afters, und endet sich an dem Schwanzbeine (g), und in dem nämlichen Muskel der andern Seite (f).

— zieht das Ende des Mastdarmes vor- und aufwärts, und preßet sowohl die Mutterscheide, als den Mastdarm, zusammen,





# ALPHABETISCHES VERZEICHNIS

## DER MUSKEL

### DIE WEICHE THEILE BEWEGEN.

Tab.

|   |   |         |
|---|---|---------|
| Der Aeufsere Muskel des Hammers                 | <i>Externus mallei</i>                        | ♂       |
| — Aufheber der obern Lippe                      | <i>Levator labii superioris</i>               | ♀       |
| — Aufheber des Mundwinkels                      | <i>Levator anguli oris</i>                    | ♀       |
| — Aufheber des Kinnes                           | <i>Levator menti</i>                          | ♀       |
| — Aufheber des obern Augenlides                 | <i>Levator palpebrae superioris</i>           | ⌘       |
| — Aufheber des weichen Gaums                    | <i>Levator palati mollis</i>                  | Ω       |
| — Aufheber des Nasenflügels und der obern Lippe | <i>Levator alae nasi, labiique superioris</i> | ♀ und ♂ |
| — Aufheber des Afters                           | <i>Levator ani</i>                            | ♂ und ♂ |
| — Aufrichter der männlichen Ruthe               | <i>Erector penis</i>                          | ♂       |
| — Aufrichter der weiblichen Ruthe               | <i>Erector Clitoridis</i>                     | ♂       |
| — Aufhebende Muskel des Ohres                   | <i>Attollens auriculam</i>                    | ⌘       |
| — Augenwimpernmuskel                            | <i>Ciliaris</i>                               | ⌘       |
| — Backenmuskel                                  | <i>Buccinator</i>                             | ♀       |
| Die Beschleuniger                               | <i>Acceleratores</i>                          | ♂       |
| Der Breitesten Halsmuskel                       | <i>Latissimus colli</i>                       | ♀       |
| — Brustbeinschildmuskel                         | <i>Sternothyreoides</i>                       | ∞       |
| — Brustbeinzungenbeinmuskel                     | <i>Sternohyoideus</i>                         | h       |
| — Erschlaffer des Paukenfelles                  | <i>Laxator tympani</i>                        | ♂       |
| — Gaumenschlundmuskel                           | <i>Palatopharyngeus</i>                       | △       |
| — Gerade aufhebende Augenmuskel                 | <i>Rectus attollens oculi</i>                 | ⌘       |
| — Gerade niederdrückende Augenmuskel            | <i>Rectus deprimens oculi</i>                 | ⌘       |
| — Gerade zuziehende Augenmuskel                 | <i>Rectus adducens oculi</i>                  | ⌘       |
| — Gerade abziehende Augenmuskel                 | <i>Rectus abducens oculi</i>                  | ⌘       |
| — Giefskannenmuskel, der schiefe                | <i>Arytanoideus obliquus</i>                  | ∞       |
| — Giefskannenmuskel, der queere                 | <i>Arytanoideus transversus</i>               | ∞       |
| — Griffelzungenbeinmuskel                       | <i>Stylohyoideus</i>                          | h       |
| — Griffelzungenmuskel                           | <i>Styloglossus</i>                           | h       |
| — Griffelschlundmuskel                          | <i>Stylopharyngeus</i>                        | △       |
| — Grössere Muskel der Windung                   | <i>Helicis major</i>                          | ⌘       |
| — Grundzungenmuskel                             | <i>Basioglossus</i>                           | h       |
| — Hängemuskel der Hode                          | <i>Cremaster</i>                              | ♂       |
| Die Hinterhauptmuskel                           | <i>Occipitales</i>                            | ⌘       |
| Der Hornzungenmuskel                            | <i>Ceratoglossus</i>                          | h       |
| — Jochmuskel, der grössere                      | <i>Zygomaticus major</i>                      | ♀       |
| — Jochmuskel, der kleinere                      | <i>Zygomaticus minor</i>                      | ♀       |
| — kleinere Muskel der Windung                   | <i>Helicis minor</i>                          | ⌘       |
| — Kinnzungenmuskel                              | <i>Genioglossus</i>                           | h       |
| — Kinnzungenbeinmuskel                          | <i>Geniohyoideus</i>                          | h       |
| — Knorpelzungenmuskel                           | <i>Chondroglossus</i>                         | h       |
| — Kreismuskel der Augenlider                    | <i>Orbicularis palpebrarum</i>                | ⌘       |



|  |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| Der Kreismuskel des Mundes             | <i>Orbicularis oris</i>           | ♀ |
| Die Mahlzeitenbeinmuskel               | <i>Mylohyoidei</i>                | h |
| Der Muskel des Bockes                  | <i>Tragicus</i>                   | ♂ |
| — Muskel des Gegenbockes               | <i>Antitragicus</i>               | ♂ |
| — Muskel der Harnblase                 | <i>Musculus Vesicae</i>           | ♀ |
| — Muskel des Stegreifes                | <i>Stapedius</i>                  | ♂ |
| Der Nasenmuskel der oberen Lippe       | <i>Nasalis labii superioris</i>   | ♂ |
| — Niederdrücker des Nasenflügels       | <i>Depressor alae nasi</i>        | ♂ |
| — Niederdrücker der unteren Lippe      | <i>Depressor labii inferioris</i> | ♀ |
| — Niederdrücker des Mundwinkels        | <i>Depressor anguli oris</i>      | ♀ |
| — Quermuskel des Damms                 | <i>Transversus perinaei</i>       | ♀ |
| — Quermuskel des Mittelfleisches       | <i>Transversus perinaei</i>       | ♂ |
| Quermuskel des Damms, der zweyte       | <i>Transversus perinaei alter</i> | ♀ |
| — Quermuskel des Ohres                 | <i>Transversus auriculæ</i>       | ♂ |
| — Rabenzungenbeinmuskel                | <i>Coracohyoideus</i>             | h |
| Ringgiefskannenmuskel, der hintere     | <i>Cricothyroideus posticus</i>   | ♂ |
| Ringgiefskannenmuskel, der seitwärtige | <i>Cricothyroideus lateralis</i>  | ♂ |
| — Ringschildmuskel                     | <i>Cricothyroideus</i>            | ♂ |
| — Spanner des Paukenfelles             | <i>Tensor tympani</i>             | ♂ |
| Schiefe Augenmuskel, der obere         | <i>Obliquus superior oculi</i>    | ♂ |
| Schiefe Augenmuskel, der untere        | <i>Obliquus inferior oculi</i>    | ♂ |
| Schließmuskel des Afters, der äußere   | <i>Sphincter ani externus</i>     | ♀ |
| Schließmuskel des Afters, der innere   | <i>Sphincter ani internus</i>     | ♀ |
| — Schildgiefskannenmuskel              | <i>Thyroarythænoideus</i>         | ♂ |
| Schildgiefskannenmuskel, der zweyte    | <i>Thyroarythænoideus alter</i>   | ♂ |
| Schildkehldeckelmuskel, der größere    | <i>Thyroepiglotticus major</i>    | ♂ |
| Schildkehldeckelmuskel, der kleinere   | <i>Thyroepiglotticus minor</i>    | ♂ |
| Die Stirnmuskel                        | <i>Frontales</i>                  | ♂ |
| Der Trompetenschlundmuskel             | <i>Salpingopharyngeus</i>         | ♂ |
| — Ungepaarte Muskel des Zäpfleins      | <i>Azygus uvulae</i>              | ♂ |
| — Umschlungene Gaummuskel              | <i>Circumflexus palati</i>        | ♂ |
| — Ueberschädelmuskel                   | <i>Epicranius</i>                 | ♂ |
| — Vordere Muskel des Ohres             | <i>Anterior auriculæ</i>          | ♂ |
| — Zungenmuskel                         | <i>Lingualis</i>                  | h |
| — Zungenbeinschildmuskel               | <i>Hyothyroideus</i>              | ♂ |
| Die Zurückziehenden Muskel des Ohres   | <i>Retrahentes auriculam</i>      | ♂ |



---

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| Der Zusammenschnürer der Rachen-<br>enge          | <i>Constrictor istmi faucium</i>      | Ω |
| Zusammenschnürer des Schlun-<br>des, der obere    | <i>Constrictor pharyngis superior</i> | Δ |
| Zusammenschnürer des Schlun-<br>des, der mittlere | <i>Constrictor pharyngis medius</i>   | Δ |
| Zusammenschnürer des Schlun-<br>des, der untere   | <i>Constrictor pharyngis inferior</i> | Δ |
| — Zusammenschnürer der weibli-<br>chen Schaam     | <i>Constrictor cuni</i>               | Ω |
| — Zusammendrucker der Nasen-<br>löcher            | <i>Compressor narium</i>              | ♂ |
| — Zusammenrunzler der Augen-<br>braune            | <i>Corrugator supercili</i>           | 4 |
| Das Zwerchfell                                    | <i>Diaphragma</i>                     | ⊙ |

---

## Z U S Ä T Z E

Bey Tab.  $\underline{\omega}$  FIG. I. DER VORDERE MUSKEL DES OHRES. Er zieht das Ohr vor- und aufwärts.

Bey Tab.  $\mathfrak{h}$  FIG. VII. DER KINNZUNGENMUSKEL. Die Zunge sammt dem Zungenbeine zieht der ganze Muskel vorwärts, und drückt die Haut des Schlundes zusammen.

Bey Tab.  $\mathfrak{z}$  FIG. V. statt des æußern schiefen, lis: des innern schiefen.

1. The first part of the paper is devoted to a general  
2. description of the country and its resources.  
3. The second part is a detailed account of the  
4. various industries and occupations of the people.  
5. The third part is a description of the climate and  
6. the various seasons of the year.  
7. The fourth part is a description of the various  
8. kinds of animals and plants which are found in the  
9. country.  
10. The fifth part is a description of the various  
11. kinds of minerals and metals which are found in the  
12. country.

### THE HISTORY OF THE COUNTRY

1. The history of the country is a very interesting  
2. and important subject. It is a subject which  
3. has attracted the attention of many writers and  
4. historians. The history of the country is a  
5. subject which is full of interest and  
6. importance. It is a subject which is full of  
7. interest and importance. It is a subject which  
8. is full of interest and importance. It is a  
9. subject which is full of interest and importance.  
10. It is a subject which is full of interest and  
11. importance. It is a subject which is full of  
12. interest and importance.











